Revue systématique des décès associés aux infections nosocomiales en court séjour

Etude multicentrique dans l'inter-région Nord-Ouest de la France

2007-2008

CH de Beauvais, Béthune, Lens, Cambrai, Dunkerque, Fourmies, Seclin, Douai, Boulogne, Tourcoing, arrondissement de Montreuil, St Philibert /La Mitterie Lomme, St Vincent de Paul Lille, Clinique du Bois Lille, CHRU Rouen.

Travail coordonné par Anne Decoster, MF Demory et B. Grandbastien et soutenu par la HAS (2006-016) / PHRC 2006.

OBJECTIFS et METHODE

OBJECTIFS

- Mettre en place dans les ES des revues de mortalité pluridisciplinaires
- Quantifier les décès associés à une IN chez les patients dont le pronostic vital n'est pas engagé à court terme
- Statuer sur l'évitabilité des décès « nosocomiaux »
- Proposer des actions correctives

METHODE d'épidémiologie descriptive

EXPERTISE

par la commission de revue des décès liés aux IN (phase 3)

MEMBRES PERMANENTS

- CLIN : Pdt ou un représentant médical
- S.I : 1 ou plusieurs représentants
- Praticien hygiéniste
- Microbiologiste
- Infectiologue
- Représentant du DIM
- Médecins

Instruisent à tour de rôle les dossiers

1 réunion / mois à laquelle sont invités les médecins et soignants en charge du patient

INCLUSIONS

2007-2008

13537 fiches, dont 2355 éligibles

17 % éligibles

- Mac Cabe 0 ou 1
- Durée de séjour > 2 j

1 - SELECTION

Fiches 1 : SELECTION

13537 fiches, dont 2355 éligibles
(Mac Cabe 0 ou 1 et durée de séjour > 2 j)

2355 inclusions
1884 instructions
285 expertises

2355 inclusions / 13537 décès, soit 17 %

Fiche 1 : délai médian de remplissage / décès

24 j (moyenne : 48, quartiles : 14-53)

Fiche 1 : SELECTION

Caractéristique des patients éligibles

- Sex ratio : 1.13 (H 1250 / F 1105)
- Age médian : 78 ans (moyenne : 75, quartiles : 68-85)
 - H 76 ans (moyenne : 72, quartiles : 64-82)
 - F 81 ans (moyenne : 78, quartiles : 74-86)
- Mac Cabe
 - 0 11 %
 - 1 89 %
- Durée de séjour méd. : 12 j (moyenne : 18, quart. : 6-23)

Spécialités

Chir Ortho	121
Chir dig & géné	95
Chir card/vasc	23
Chir autres	12

Méd géné	249
Med neuro	231
Med cardio	191
Med pneu	181
Med HGE	94
Med géria	79
Med neph	59
Med autres	107

n = 2355

1 - SELECTION

Inclusion (n = 2355)

Éléments de suspicion d'infection

	n	%
■ Température	1396	59 %
■ Mention /lettre	1067	46
■ Prescr. ATB	1552	66
■ Prescr. microbio	1594	68
■ Résultat microbio	1565	71

Au moins 1 critère d'infection dans 1884 dossiers (80%) → phase 2

Avec les critères **microbio et courrier** :

92 % des suspicions d'infection, 98% des IN, 100% des IN évitables

Avec les critères **ATB et microbio** :

98 % des suspicions d'infection, >99% des IN, 100% des IN évitables

2 - INSTRUCTION

Fiches 2 : INSTRUCTION

1884 fiches avec au moins 1 critère d'infection

- 1884 fiches / 13537 décès, soit 14 %
- **Fiche 2** : délai médian de remplissage / décès
- **30 jours** (moyenne : 46, quartiles : 16-57)

2 - INSTRUCTION

Site de l'infection

1243 sites infectieux identifiés (66%)

Répartition par site anatomique

Autres :
ILC, cutanée,
digestive,
osseuse,
ORL, SNC,
systémique

Mention de l'infection
dans la lettre de DC

Mention courrier	N	%
ELIGIBLES	2355	46%
Critères d'infection	1884	57%
IN	552	77%
DC imputable à l'IN	182	87%
IN évitable	61	79%
DC évitable	35	86%

2 - INSTRUCTION

Germes signalés le plus fréquemment

926 dossiers, 1276 germes

	n	%
■ <i>Staphylococcus aureus</i> (dont 99 SARM)	210	16 %
■ Entérobactéries (dont 39 BLSE)	400	31 %
■ <i>Escherichia coli</i> , <i>Enterobacter aerogenes</i> , <i>Klebsiella pneumoniae</i> , <i>Enterobacter cloacae</i> , <i>Proteus mirabilis</i> , <i>Klebsiella oxytoca</i>		
■ <i>Pseudomonas aeruginosa</i> (dont 59 Caz-R)	156	12
■ <i>Candida albicans</i>	122	10
■ <i>Enterococcus faecalis</i>	33	3
■ <i>Streptococcus pneumoniae</i>	33	3
■ <i>Acinetobacter baumannii</i> (dont 17 Tic-R)	33	2
■ <i>Clostridium difficile</i>	32	2
■ <i>Stenotrophomonas maltophilia</i>	20	2
■ ...		
	1276	

BMR = 12% des inclusions, 31% des IN, 40% des IN et DC évitables

Gestes invasifs

1863 oui (99%)

	n	%	Ch	Med	Rea (%)
■ Chirurgie	443	24 %	86	7	29
■ Endoscopie	370	20	10	18	25
■ Intubation	838	44	33	7	91
■ KT périphérique	1356	72	82	90	48
■ K T central	866	46	36	15	85
■ KT autre	559	30	9	3	66
■ Sondage vésical	1385	74	72	54	96
■ Drain	482	26	56	13	34

Conclusions fiche 2

- Inf. nosocomiale :
 - OUI (ou ?) 596 31 %
 - NON 1332 69 %
- Décès imputable si diagnostic d'IN :
 - NON 311 52 %
 - Autre réponse 285 48 %

Fiches 3 : EXPERTISE

285 expertises en RMM

= 15% des 1884 fiches instruites

2355 inclusions
1884 instructions
285 expertises

- 285 expertises / 13537 décès, soit 2.1 %
- **Fiche 3** : délai médian de remplissage / décès
 - **86 jours** (moyenne : 111, quartiles : 47-158)

Imputabilité des IN expertisées

- 237 IN confirmées → imputables ?

1 non imputable à 6 imputabilité certaine

1-non 2-très peu probable 3-peu probable
4-assez probable 5-très probable 6-certaine

Evitabilité des IN et DC

Les 182 IN auxquelles le DC est au moins partiellement imputable

61/552 = 11 % des IN sont « imputables »
 61/182 = 34 % des IN auxquelles un DC est au moins partiellement imputable sont évitables
 35/552 = 6.3 % des IN se soldent par un DC évitable

Non-conformités identifiées

Catégorie	Non-conformité exprimée dans 94 dossiers (1 ou plusieurs non-conformités par dossier)	DC imputable à l'IN
MEDICAL	Absence de prescription	14
	Prescription antibiotique inadaptée	21
	Défaut d'antibioprophylaxie	1
	Retard à la prise en charge thérapeutique	25
	Méconnaissance des protocoles	5
	Supervision inadaptée des médecins	13
	Autre : Limitation prématurée des soins, pb technique chirurgicale	3
	Soins ne relevant pas du champ d'expertise du service	7
	Charge de travail trop importante	4
	Conditions de travail difficiles (travaux)	3
ORGANISATION	Service kiné insuffisant le week-end	1
	Présence médicale insuffisante le Week-end	1
	Planification des tâches mal adaptée	1
	Défaut de coordination entre les services	6
	Défaut de coordination dans le service	3
	Absence de culture de signalement des situations dangereuses	1
	Défaut de surveillance des voies veineuses périphériques	4
SOINS	Non respect des protocoles	15
	Absence d'informations dans les transmissions ciblées	9
	Faute d'asepsie (dont défaut de pose de cathéters, sondes gastriques...)	15
	Total citations	152

54%

17%

28%

Actions d'amélioration proposées

- Améliorer les transmissions médicales et les transmissions ciblées en soins infirmiers
- Programmer des formations complémentaires à l'antibiothérapie
- Protocoler la préparation pré-opératoire
 - BU, antibioprofylaxie
- Améliorer la prise en charge médicale
 - en chirurgie
 - en soins continus
- Remotiver l'équipe et augmenter le personnel
- Prévenir la pneumopathie d'inhalation
- Diffuser les protocoles mal connus :
 - Protocoles pose, maintenance, surveillance cathéters
 - Protocoles pose sonde naso-gastrique
 - Protocoles d'hygiène spécifiques en cas de travaux
- Améliorer la traçabilité de la décision de limitation de soins
- ...

SYNTHESE

➤ Analyse des 13537 dossiers :
 ✓ temps cumulé = 2400 heures
 ✓ soit 18 h pour 100 décès
 ✓ soit 11 mn pour 1 décès

IN 4 % des décès
 IN évitables 0,5 % des décès
 11 % des IN
 Mortalité imputable 1.3 % des décès
 34 % des IN
 Mortalité évitable 0.3 % des décès
 6.3 % des IN

10 000 DC associés à IN
 3500 DC imputables à IN (dont 1300 IN évitables)
 800 DC évitables (dont 180 DC inattendus)

Extrapolation France/an

CONCLUSION

■ Commission associant médecins et représentants des soins infirmiers :

- Rôle pédagogique +++
- Possibilité d'actions correctives immédiates
- Rentre dans la démarche de certification
→ prise en compte par les ES dans leur EPP

■ Difficultés

- Sélection des dossiers
 - Critères pertinents et facilement disponibles :
 - lettre de décès, microbio (informatique labo)
 - antibio (informatique pharmacie) et microbio (informatique labo)
- Implication et motivation variables des instructeurs
- Réactions parfois vives des protagonistes

Ont très activement participé à ce travail :

- **CH Tournai (59)** : Alfandari S., Caillaux M., D'Escrivain T., Georges H., Lefebvre V., Mesnard B., Thirard L., Legout L.
- **CH Lens (62)** : Balquet MH, Courouble C., Danjou P., Klosowski S., Morisot C., Le Joubioux E., Trivier D., West A., Tronchon L.
- **CH Béthune (62)** : Descamps D., Nycz M., Delplace M., Belletante D., Dufosse F., Beclin E., Bourdon F., Brelinski M., Foulon C., Dubart AE.
- **CH Boulogne / mer (62)** : Paul JG, Brunin G., Pouilly A., Brossier T.
- **CH Douai (59)** : Visticot F., Hendricx S., Nuttens MC, Soula F., Desurmont S.
- **CH Cambrai (59)** : Szapiro T., Degremont J., Dumoulaud B.
- **CH Dunkerque (59)** : Moulront S., Joly I.
- **CH Beauvais (80)** : Vallet D., Heurte J., Delamare N.
- **CH Seclin (59)** : Markiewicz A., Rolland C., Laurier C.
- **CH arrondissement de Montreuil (62)** : Forget B., Menouar M., Taleb D., Boisselet V., Michault JM, Daumal M.
- **CH Fourmies (59)** : Gontier P., Collet M.
- **Clinique du Bois, Lille (59)** : Arimane O.
- **CHRU Rouen (76)** : Damm C., Girault C., Freborg N., Pestel-Caron M., Merle V.
- **CH St Philibert, St Vincent, la Mitterie (59)** : Decoster A., Demory MF, Baumelou E., Leclercq V., Dombrowski D, Bulckaen H, Cabaret P., Alsberghe M.
- *et Bruno Grandbastien (épidémiologiste, CHRU Lille)*