

Nouveauté 2026 !

19 mars 2026

1ère journée régionale de prévention du risque infectieux sur les dispositifs intravasculaires



1ère journée KT - le 19 mars

une collaboration CPias / Gifav


GIFAV →

RéPIA
SPIADI


Faits marquants en 2025
pour la  Région
île de France

Mathilde FARIZON, Nathalie VAN DER MEE-MARQUET pour l'équipe SPIADI

Surveillance



Observations des pratiques



En région IDF, la campagne de surveillance 2025 et celle des évaluations de pratiques ont été menées respectivement par 38 % et 19% des établissements prioritaires (CHU, CH, CLCC, HA, CL-MCO, E-DIA).

Les faits marquants pour la surveillance


TABLEAU 10. Indicateurs de la Stratégie Nationale 2022-2027 pour la surveillance des infections (2025).

Cibles nationales	Incidence des bactériémies liées à un cathéter (CVC, PICC, CCI, cathéter de dialyse) / 1000 JH					(CVP court) / 1000 JH
	(CVC, PICC, cathéter de dialyse) / 1000 j-cathéter					
	1	2		0,1		0,1
Moyenne pondérée (nombre d'établissements participants)						
	Réanimation	Hématologie	Cancérologie	Médecine	Chirurgie	Tous services
FRANCE	0,989 (110)	1,664 (45)	1,041 (123)	0,140 (359)	0,136 (278)	0,039 (576)
ARA	0,980 (10)	0,939 (2)	0,961 (17)	0,146 (57)	0,125 (41)	0,019 (80)
BFC	0,631 (3)	0,716 (1)	0,938 (6)	0,107 (19)	0,161 (11)	0,024 (26)
BRETAGNE	0,455 (4)	1,178 (3)	0,683 (6)	0,109 (16)	0,059 (12)	0,018 (24)
CVDL	0,906 (5)	2,010 (4)	1,180 (9)	0,167 (15)	0,110 (13)	0,032 (24)
GRAND EST	0,616 (8)	1,795 (1)	0,997 (5)	0,159 (26)	0,095 (25)	0,031 (57)
GUYANE	-	-	-	-	-	-
HDF	0,667 (13)	1,308 (7)	0,831 (8)	0,096 (25)	0,052 (19)	0,032 (45)
IDF	1,290 (24)	1,748 (9)	1,217 (29)	0,099 (60)	0,164 (45)	0,061 (86)
NORMANDIE	0,515 (8)	2,004 (2)	1,237 (5)	0,115 (17)	0,212 (14)	0,026 (27)
N AQUITAINE	1,306 (7)	0,860 (7)	0,835 (10)	0,162 (24)	0,093 (23)	0,045 (41)
OCCITANIE	0,738 (14)	4,248 (2)	0,873 (10)	0,156 (34)	0,166 (27)	0,049 (58)
PDL	3,390 (3)	2,723 (2)	0,628 (5)	0,176 (19)	0,187 (12)	0,035 (30)
PACA	1,214 (10)	1,608 (3)	1,499 (11)	0,177 (35)	0,109 (27)	0,056 (63)
CORSE	-	-	0,980 (1)	0,171 (3)	0,260 (2)	0,034 (3)
GUADELOUPE	-	-	-	0,529 (2)	-	0 (3)
MARTINIQUE	-	0 (1)	-	0,266 (2)	0 (2)	0,114 (3)
REUNION	2,479 (2)	2,304 (1)	2,611 (1)	0,127 (3)	0,407 (3)	0,074 (4)

En région IDF, les résultats sont comparables aux résultats nationaux.


Incidence des BLC (CVC, PICC, cathéter de dialyse) / 1000 J-cathéter

% services de réanimation dans la cible



Incidence des BLC (CVC, PICC, CCI, cathéter de dialyse) / 1000 JH

% des services de chirurgie dans la cible



En région IDF, 58% des services de réanimation et 78% des services de chirurgie ont une incidence des bactériémies liées à un cathéter central dans la cible nationale.


TABLEAU 13. Indicateurs SPIADI selon les régions, pour 2025.

Cibles nationales	(CVC, PICC, cathéter de dialyse)	Incidence des bactériémies liées à un site d'accès vasculaire (midline)					(cathéter de dialyse, fistules native et prothèse)	(CVP court)	
	/ 1000 JH	/ 1000 JH			/ 1000 JH	/ 1000 séances	/ 1000 JH		
	1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1			
Moyenne pondérée (nombre d'établissements participants)									
Disciplines	<u>réanimation</u>	<u>hématologie</u>	<u>cancérologie</u>	<u>médecine</u>	<u>chirurgie</u>	HDC	UDM	<u>médecine</u>	<u>chirurgie</u>
FRANCE	0,665 (173)	0,127 (45)	0,029 (123)	0,037 (359)	0,046 (278)	0,180 (67)	0,127 (59)	0,087 (359)	0,054 (278)
ARA	0,755 (17)	0 (2)	0,027 (17)	0,043 (57)	0,026 (41)	0,030 (7)	0,206 (6)	0,049 (57)	0,020 (41)
BFC	0,381 (5)	0 (1)	0,104 (6)	0,006 (19)	0,032 (11)	0,190 (2)	0,234 (15)	0,065 (19)	0,048 (11)
BRETAGNE	0,486 (6)	0,196 (3)	0 (6)	0,024 (16)	0 (12)	0 (3)	0 (2)	0,066 (16)	0 (12)
CVDL	0,811 (7)	0 (4)	0,069 (9)	0,050 (15)	0,047 (13)	0,578 (4)	0,172 (3)	0,099 (15)	0,031 (13)
GRAND EST	0,603 (15)	0 (1)	0 (5)	0,030 (26)	0,053 (25)	0 (3)	0,043 (5)	0,078 (26)	0,042 (25)
GUYANE	2,230 (1)	-	-	-	-	2,404 (1)	0 (1)	-	-
HDF	0,674 (16)	0,093 (7)	0 (8)	0,046 (25)	0,066 (19)	0,151 (7)	0,095 (5)	0,089 (25)	0,026 (19)
IDF	0,566 (37)	0,169 (9)	0,024 (29)	0,041 (60)	0,03 (45)	0,182 (11)	0,092 (6)	0,081 (60)	0,132 (45)
NORMANDIE	0,337 (9)	0,134 (2)	0 (5)	0,031 (17)	0,053 (14)	0,252 (4)	0,187 (3)	0,092 (17)	0,018 (14)
N AQUITAINE	0,626 (9)	0 (7)	0,042 (10)	0,036 (24)	0,019 (23)	0,787 (2)	0,679 (2)	0,114 (24)	0,037 (23)
OCCITANIE	0,896 (18)	0 (2)	0 (10)	0,029 (34)	0,039 (27)	0,177 (5)	0,031 (4)	0,110 (34)	0,039 (27)
PDL	0,714 (5)	0,248 (2)	0 (5)	0,019 (19)	0,016 (12)	0 (4)	0,275 (1)	0,085 (19)	0,031 (12)
PACA	0,826 (22)	0 (3)	0,034 (11)	0,026 (35)	0,039 (27)	0 (3)	0,100 (2)	0,112 (35)	0,049 (27)
CORSE	0 (2)	-	0,490 (1)	0,043 (3)	0 (2)	0 (2)	1,567 (1)	0,043 (3)	0,087 (2)
GUADELOUPE	-	-	-	0 (2)	-	0,161 (1)	-	0 (2)	-
MARTINIQUE	1,592 (1)	0 (1)	-	0,027 (2)	0,252 (2)	0,478 (1)	-	0,186 (2)	0,063 (2)
REUNION	0,599 (3)	3,072 (1)	0 (1)	0,163 (3)	0,153 (3)	0,115 (5)	0,088 (5)	0,109 (3)	0,153 (3)


En région IDF, l'incidence des bactériémies liées à un CVP court est au dessus de la cible.

Incidence des BLC (CVP court) / 1000 JH

% des services de chirurgie dans la cible





Microorganismes impliqués dans les BLC(CVP court)



BADICAUSE

Analyse des causes d'une bactériémie liée à un cathéter


En région IDF, 16% des services de chirurgie sont au dessus de la cible pour l'incidence des B-cvp court.

 $P < 0,001$


En région IDF, l'incidence des bactériémies liées à un midline progresse depuis 2023 ($p = 0,028$).

Bactériémies liées à un cathéter veineux périphérique (3 081; secteur adulte; SPIADI 2020-2025)

Distribution des BLC selon le cathéter





midline CVP court




La part des bactériémies liées à un midline progresse au sein des bactériémies liées à un cathéter veineux périphérique (36% en 2025).

Progression de l'incidence des bactériémies liées à un midline

Données nationales, services de médecine, 2020-2025





Possible
flore cutanée
transitoire du
patient ou du
professionnel

Flore cutanée
résidente du
patient ou du
professionnel

Les microorganismes impliqués dans le B-midlines appartiennent majoritairement à la flore cutanée.

Les faits marquants pour les évaluations des pratiques


Région
île de France

31 observations


Hygiène de
l'opérateur

Hygiène du
patient
Masque chirurgical ou
visage tourné du côté
opposé ou couvert par
champ stérile

Préparation
cutanée



87%




DÉSINFECTION CHIRURGICALE
DES MAINS PAR FRICTION
AVANT LA POSE, AVANT D'ENFILER
LES GANTS


GANTS STÉRILES
CASAQUE STÉRILE
MASQUE CHIRURGICAL
COIFFE



- SI PEAU SALE OU SOUILLÉE
NETTOYAGE AVEC DU SAVON
DOUX STÉRILE
- APPLICATEUR OU COMPRESSES
STÉRILES
- CHLORHEXIDINE ALCOOLIQUE 2%
- SÉCHAGE SPONTANÉ DE
L'ANTISEPTIQUE



85%



La désinfection chirurgicale des mains par friction permet d'obtenir un niveau d'asepsie élevé et durable.



201 observations

Hygiène de
l'opérateur

40%

59%

74%

99%

93%

Hygiène du
patient

86%

Préparation
du site de
branchement

24%

88%

97%

32%

51%

DEUX FRICTIONS
LA 1^{ÈRE} AVANT LA PRÉPARATION DU MATÉRIEL
LA 2^{ÈME} AVANT D'ENFILER LES GANTS

GANTS STÉRILES
TENUE PROPRE
MASQUE CHIRURGICAL

- DÉSINFECTION DE LA CONNECTIQUE ET DE LA VALVE AVANT UTILISATION
- COMPRESSES STÉRILES
- ALCOOL À 70%
- FRICTION DE LA VALVE PENDANT 15 SECONDES

71%

78%

99%

88%

896
observations

54%

87%

42%

89%

95%

47%

73%

Il est nécessaire de rappeler que manipuler en proximal nécessite de porter des gants stériles pour assurer un haut niveau d'asepsie.

Hygiène de l'opérateur

Hygiène du patient

Masque chirurgical
ou visage tourné du
côté opposé couvert
par champ stérile

Préparation cutanée

DÉSINFECTION CHIRURGICALE
DES MAINS PAR FRICTION
AVANT LA POSE, AVANT D'ENFILER
LES GANTS

GANTS STÉRILES
CASAQUE STÉRILE
MASQUE CHIRURGICAL
COIFFE



- SI PEAU SALE OU SOUILLÉE
NETTOYAGE AVEC DU SAVON
DOUX STÉRILE
- APPLICATEUR OU COMPRESSES
STÉRILES
- CHLORHEXIDINE ALCOOLIQUE 2%
- SÉCHAGE SPONTANÉ DE
L'ANTISEPTIQUE

43%

98%

92%

90%

94%

51 observations

37%

69%

94%

98%

78%

96%

71%

La désinfection chirurgicale des mains par friction permet d'obtenir un niveau d'asepsie élevé et durable.



139 observations

Hygiène de
l'opérateur

34%

50%

80%

98%

97%

88%

Hygiène du
patientMasque chirurgical
ou visage tourné du
côté opposé couvert
par champ stérile

94%

Préparation
cutanée

17%

77%

96%

40%

83%

DEUX FRICTIONS
LA 1^{ÈRE} AVANT LA PRÉPARATION DU MATÉRIEL
LA 2^{ÈME} AVANT D'ENFILER LES GANTSGANTS STÉRILES
TENUE PROPRE
MASQUE CHIRURGICAL
COIFFE• NETTOYAGE AVEC DU SAVON
DOUX STÉRILE

SYSTÉMATIQUE *

• APPLICATEUR OU COMPRESSES
STÉRILES• CHLORHEXIDINE
ALCOOLIQUE 2%• SÉCHAGE SPONTANÉ DE
L'ANTISEPTIQUE

65%

69%

98%

97%

85%

79%

97%

44%

90%

625 observations

39%

93%

23%

Il est nécessaire de rappeler l'utilisation de la chlorhexidine alc. 2%
sur une peau systématiquement nettoyée.

420 observations

Hygiène de
l'opérateur

36%

41%

DEUX FRICTIONS
LA 1^{ÈRE} AVANT LA PRÉPARATION DU MATÉRIEL
LA 2^{ÈME} AVANT D'ENFILER LES GANTS

5 %

GANTS STÉRILES DANS 2 SITUATIONS :
• SI PALPATION APRÈS L'ANTISEPSIE
• SI POSE AVEC ÉCHOGUIDAGE

98%

TENUE PROPRE

37%

11%

98%

2740 observations

31%

Préparation
cutanée

60%

93%

• SI PEAU SALE OU SOUILLÉE NETTOYAGE AVEC
DU SAVON DOUX STÉRILE

94%

• APPLICATEUR OU COMPRESSES STÉRILES

89%

• ANTISEPTIQUE ALCOOLIQUE MAJEUR

76%

SECHAGE SPONTANÉ

79%

95%


85%

79%

63%

Il est nécessaire de rappeler que repalper le site d'insertion après la phase d'antiseptie
nécessite de porter des gants stériles.

$P < 0,001$



	2020	2025	P 2020- 2025	2020	2025	P 2020- 2025
Taux de conformité du port du masque						
Manip. proximales						
CVC	94%	83%	<0,001	87%	91%	0,002
PICC	90%	83%	<0,001	100%	91%	0,562
MID PI	95%	73%	<0,001	86%	86%	0,142
CCI	88%	79%	<0,001	100%	93%	0,163
Pose d'aiguille	98%	96%	<0,001	97%	93%	<0,001

Le taux conformité du port du masque chirurgical diminue pour les manipulations proximales des lignes des cathéters centraux et midline PI, et pour la pose d'aiguille sur CCI.

- **Des résultats pour piloter votre stratégie de PRI lié aux dispositifs invasifs**
- **Points de vigilance / indicateurs pour la surveillance**
 - **Services de chirurgie (cathéters centraux, CVP courts)**
 - **Pose et utilisation des Midlines**
- **Points de vigilance / indicateurs pour les pratiques**
 - **DCMF pour la pose des cathéters centraux et des Midlines PI**
 - **Le nettoyage systématique de la peau lors de la réfection des pansements des cathéters centraux**
 - **Gants stériles pour les manipulations proximales des lignes des cathéters centraux**
 - **Gants stériles pour la pose difficile des CVP courts**
 - **Recul du port du masque pour les manipulations proximales des lignes des cathéters centraux et les poses d'aiguille sur CCI**



contact@spiadi.fr