

Précautions complémentaires contact spécifiques *Clostridioides difficile* (PCC - Cd) En complément des précautions standard



Pourquoi des précautions complémentaires contact spécifiques?

Le *Clostridioides (Clostridium) difficile* (Cd) est une bactérie sporulée, responsable de diarrhée post antibiotique, qui est très résistante dans l'environnement. Seules les souches toxigènes de *C. difficile* sont pathogènes. Le mode de transmission est principalement par contact direct (manuportage) avec un patient infecté ou par contact indirect avec l'environnement contaminé (surfaces ou matériel). Du fait de la présence de spores pouvant résister plusieurs mois dans l'environnement, les mesures d'hygiène à mettre en place sont des précautions complémentaires contact spécifiques, en complément des précautions standard.

- **Information** du patient et des professionnels
- **Signalisation** : affiches, alerte dans le dossier patient, unité mobile de protection devant la porte de chambre
- **Chambre individuelle / restriction des déplacements**
- **Matériel dédié** au patient ou à usage unique (à privilégier). Ne pas stocker de matériel dans la chambre
- Application du principe de **la marche en avant** lors de la réalisation des soins (patient en PCC en dernier)

Précautions complémentaires contact spécifiques : quelles mesures ?



PCC-Cd jusqu'à 48 à 72 h
après la fin des diarrhées

Pas de prélèvement de contrôle pour lever l'isolement

• HYGIÈNE DES MAINS

- à l'entrée dans la chambre : friction hydroalcoolique (FHA)
- avant de sortir de la chambre : lavage des mains au savon (action mécanique) pour éliminer les spores, suivi d'un rinçage et d'un séchage soigneux, puis d'une FHA



• PORT DE GANTS

- en systématique à l'entrée dans la chambre : FHA et port de gants
- à changer entre 2 soins



• PROTECTION DE LA TENUE

- par une surblouse à manches longues dès l'entrée dans la chambre



• GESTION DES EXCRETA

- Bassin dédié et sacs protecteurs de bassins à privilégier
- Élimination des protections et sacs protecteurs en Dasri

• ÉLIMINATION DES DÉCHETS

- Tous les déchets contenant des selles en Dasri



• BIONETTOYAGE DE L'ENVIRONNEMENT DU PATIENT ET ENTRETIEN DES DISPOSITIFS MÉDICAUX

- avec un détergent-désinfectant sporicide OU nettoyage avec un détergent suivi d'un rinçage et d'une désinfection (temps de contact : 10min) avec de l'eau de Javel à 0.5% (1l d'eau de javel à 2.6% + 4l d'eau)
- lavettes/bandeaux à usage unique à privilégier



Pour les visiteurs

- Hygiène des mains au savon doux avant de sortir de la chambre
- Pas de gants, ni de protection de la tenue
- Ne pas utiliser les WC du patient
- Ne pas s'asseoir sur le lit

Et
sans oublier

Précautions standard

- Surblouse imperméable ou surblouse + tablier si geste/soin mouillant ou souillant
- Port de lunettes de protection/visière si le patient présente une symptomatologie respiratoire ou si soins à risque de projections ou d'aérosolisation
- Gestion du linge du patient : circuit habituel. Ne pas le stocker dans la chambre

Pour plus de détails ou pour les cas particuliers, n'hésitez pas à vous référer à votre équipe d'hygiène EOH/EPRI/IMH