

Acte de chirurgie

... ET SI ON PARLAIT D'ANTISEPSIE ? (MAJ 2025)

L'antiseptie est **identique** qu'elle soit réalisée pour un acte de chirurgie fait dans un bloc opératoire, en secteur interventionnel ou hors bloc opératoire (salle technique, en consultation...)

Quel antiseptique choisir ?

Vérifier l'absence de bijoux, vernis et piercing avant toute antiseptie

	Peau sèche et propre	Peau souillée, grasse, sueurs, avec cosmétique	Peau lésée	Muqueuse
Antiseptique alcoolique <i>Recommandé</i>	À appliquer directement	À appliquer après un nettoyage, rinçage et séchage	✗	✗
Antiseptique aqueux		À appliquer après un nettoyage, rinçage et séchage	À appliquer directement ou après un nettoyage, rinçage +/- séchage en fonction du site	

Recommandations SF2H Antiseptie de la peau saine avant un geste invasif chez l'adulte - 2016

➔ Pour la pose des **dispositifs invasifs vasculaires centraux** : **chlorexidine alcoolique 2%** en 1^{ère} intention
Pour les **autres actes de chirurgie** : **chlorexidine ou povidone iodée** au choix

➔ **Adapter** le choix de l'antiseptique en fonction de l'**âge** du patient (Choix limité pour les prématurés et enfant jusqu'à 30 mois), des **situations particulières** (grossesse...) et du **site** (œil, oreille, neurochirurgie)

Le patient me dit être allergique à...

➔ L'iode

- 1 **L'allergie ne provient pas de l'iode** mais des adjuvants des produits iodés
- 2 **L'allergie au produit de contraste iodé (radio) est due au produit de contraste** et non à l'iode
- 3 **L'allergie aux crustacés** est due aux protéines spécifiques de ces animaux et non à l'iode
- 4 La **povidone iodée** peut être utilisée chez les patients allergiques aux crustacés ou aux produits de contraste

Seuls les patients intolérants ou allergiques aux adjuvants de la povidone iodée doivent faire l'objet d'une attention particulière

➔ La chlorexidine

Dans de rares cas, des réactions allergiques **immédiates et graves** ont été décrites **dans l'heure** suivant l'utilisation de la Chlorhexidine. *ANSM décembre 2023*

Quel conditionnement choisir ?

En pratique, pour limiter le risque de contamination du produit :

- **Privilégier le plus petit conditionnement adapté à l'activité** (unidose, flacon 125ml, 250ml, 500ml) et noter la date d'ouverture
- **Manipuler le flacon sans contaminer le bec verseur**
- **Reboucher le flacon après chaque utilisation**
- **Conserver le produit après ouverture :**
 - **8 jours** si antiseptique reconstitué avec un colorant
 - **1 mois**, communément admis, pour les autres antiseptiques(Pour plus de précision se référer à la notice)




L'antiseptie, le "badigeon"

SUR PEAU SAIN
Partir de la ligne
d'incision
vers l'extérieur




**SUR PEAU LÉSÉE
OU INFECTÉE**
Partir de l'extérieur
vers la zone d'incision



MATÉRIELS DE
BADIGEONNAGE
STÉRILES

- Utiliser une dose d'antiseptique adaptée à la surface pour éviter les coulures



- Si utilisation d'un applicateur intégré : le volume contenu dans le (ou les) dispositif(s) doit être adapté à la surface à désinfecter. Suivre les recommandations d'application du fabricant

- Au bloc opératoire/secteur interventionnel, l'unique ou le dernier badigeonnage doit être réalisé en stérile

- Un antiseptique est efficace seulement si le séchage est spontané et complet (aspect mat)
Ne jamais le tamponner/l'essuyer


!

Pour éviter les risques de brûlures cutanées, vérifier l'absence de quantité résiduelle d'antiseptique alcoolique :

- > Dans les plis cutanés (dont ombilic)
- > Sous le patient
- > Dans les replis des champs opératoires


Vérification impérative avant toute utilisation d'un bistouri électrique

HAS Novembre 2018



Les crayons dermographiques

- Utilisation d'un crayon **dermographique STÉRILE** et à **USAGE UNIQUE** juste après l'antiseptie



Ce flyer est le fruit du travail du groupe régional "bloc opératoire" constitué de professionnels hygiénistes (IDE et praticiens) et du bloc opératoire (IBODE et cadres) et est à destination des établissements des PDL et ne se substitue pas aux protocoles internes

CPias PDL : Bâtiment le Tourville - CHU - 5 rue du Pr Boquien - 44093 NANTES

Document mis à jour en Avril 2025

En complément de ce flyer, le Cpias PDL édite des fiches réflexes par spécialité "Antiseptie en pratique"