

Equipements de Protection Individuelle recommandés pour la prise en charge de résident suspect/confirmé COVID-19

| Etablissements | Contexte d'entrée en chambre | Tablier plastique jetable | Surblouse à usage unique | Masque chirurgical | Masque FFP2 | Lunettes/visière de protection | Gants à usage unique | Exemples |
|--|--|---------------------------|--------------------------|--------------------|-------------|---|----------------------|--|
| Etablissements et services médico-sociaux EHPAD, FAM, MAS, SSIAD... | Sans contact avec le résident <i>Précautions standard et gouttelettes</i> | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | Distribution des repas, Distribution des médicaments... |
| | Avec contact mais SANS risque d'exposition aux liquides biologiques <i>Précautions standard, contact et gouttelettes</i> | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ <i>Si signes resp. importants</i> | ✗ | Lever, mise au fauteuil, Retournement, Conduite aux toilettes, Prise des constantes... |
| | Avec contact ET risque d'exposition aux liquides biologiques <i>Précautions standard, contact et gouttelettes</i> | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ <i>Si signes resp. importants ou risque projection</i> | ✓ | Mettre ou enlever une prothèse dentaires, Soins de bouche, Toilette, change, Prise de sang, Vomissements... |
| | Procédures à risque d'aérosolisation <i>Précautions standard, contact + aérosolisation</i> | ✗ * | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | Prélèvement nasopharyngé, Kinésithérapie respiratoire générant des aérosols, Soins de trachéotomie Oxygénothérapie à haut débit (> 6 L/min). |

* Tablier si surblouse à usage unique non disponible ou non déperlante

L'utilisation des équipements de protection individuelle doit être impérativement associée à une **observance stricte de l'hygiène des mains.**

