

Quizz Mise en situation Hygiène des mains

- R é p o n s e s -

1

Adapté

Dans le cadre des précautions standard, on fait une hygiène des mains avant un soin, et on porte des gants pour éviter l'exposition aux liquides biologiques.

R30 du guide « surveiller et prévenir les IAS »

2

Non adapté

Le port des gants est adapté, mais ils devaient être retirés pour la manipulation de l'aérosol : contamination du matériel risque de transmission croisée.

3

Non adapté

Pas d'hygiène des mains entre 2 soins, et pas de port de gants : PS risque AES

4

Non adapté

Le port de gants est correct, mais sur l'agent responsable de la gale, les PHA sont inefficaces, un lavage simple des mains est donc requis.

5

Non adapté

Acte invasif donc désinfection des mains (FHA), et risque AES donc port de gants (PS)

6

Adapté

Le médecin intervient sur peau saine (pas de gant), après un soin une FHA est recommandée, d'autant plus dans ce cas où le résident est connu porteur de BMR.

Recommandation 92 « transmission croisée » du Guide hygiène des mains

7

Adapté

Port de gants adapté pour manipulation linge souillé, hygiène des mains adaptée au retrait des gants. Une FHA aurait été plus simple, plus rapide, plus efficace qu'un lavage simple.

8

Adapté / Non adapté

Un lavage simple est suffisant dans ce type d'activité. Les PHA posent le problème du contact alimentaire.

9

Adapté

Cependant un lavage simple est acceptable.

10

Adapté

Dans le cadre des précautions standard le port de gants est indiqué lors de contact avec la peau lésée du résident. (sur peau saine les gants sont recommandés si contact avec des liquides biologiques et muqueuse : toilette intime)