



Précautions complémentaires

Quiz Établissements sanitaires

Bonnes réponses ... et explications.

01

Pour un patient atteint d'une tuberculose pulmonaire :

- ☒ J'applique les précautions standard
- ☒ Je mets en place les précautions complémentaires contact (PCC)
- ☒ Je mets en place les précautions complémentaires gouttelettes (PCG)
- ☒ Je mets en place les précautions complémentaires air (PCA)



La tuberculose peut atteindre différents organes mais seules les formes respiratoires sont contagieuses. Le bacille de Koch se transmet par voie aérienne lors de l'inhalation d'aérosols contaminés émis par une personne atteinte de tuberculose pulmonaire notamment en toussant, crachant et éternuant. Les précautions complémentaires à mettre en place sont donc les précautions complémentaires air (PCA) en complément des précautions standard qui s'appliquent pour tout patient,

Les professionnels et les visiteurs doivent porter un masque de protection respiratoire (FFP2) pour se protéger du risque d'inhalation de particules infectieuses.

Le patient atteint d'une tuberculose doit porter un masque chirurgical dès qu'il sort de sa chambre.

02

A l'hôpital, lors de soins auprès d'un patient porteur d'une BHRé,

- ☒ J'applique les précautions standard
- ☒ Je mets en place les précautions complémentaires contact (PCC)
- ☒ Je mets en place les précautions complémentaires gouttelettes (PCG)
- ☒ Je mets en place les précautions complémentaires air (PCA)



Les bactéries hautement résistantes aux antibiotiques émergentes (EPC et ERV) sont des bactéries du tube digestif et la transmission se fait par contact. **Les précautions complémentaires à mettre en place sont donc des précautions complémentaires contact (PCC) en complément des précautions standard qui s'appliquent pour tout patient.**

Je protège ma tenue avec un tablier lors de contact avec le patient ou son environnement et respecte l'ensemble des précautions standard dont **l'hygiène des mains (FHA++++)** et le **bionettoyage des surfaces et des dispositifs médicaux.**

Attention, on ne porte pas des gants lors des soins sur la peau saine. La gestion des excréta nécessite une vigilance accrue car il y a un risque d'éclaboussures et d'aérosols lors de la manipulation du matériel et donc un risque de contamination des mains, de la tenue, de l'environnement et des patients.

03

Pour un patient ayant une légionellose,

- ☒ J'applique les précautions standard
- ☒ Je mets en place les précautions complémentaires contact (PCC)
- ☒ Je mets en place les précautions complémentaires gouttelettes (PCG)
- ☒ Je mets en place les précautions complémentaires air (PCA)



Legionella pneumophila est une bactérie hydrique et il n'y a pas de transmission inter-humaine. Il n'y a pas lieu de mettre en place des précautions complémentaires et il faut respecter **les précautions standard comme pour tout patient.**

04 A l'hôpital, lorsqu'un patient Covid-19 est admis dans le service,

- ✓ J'applique les précautions standard
- ✓ Je mets en place les précautions complémentaires contact (PCC)
- ✓ Je mets en place les précautions complémentaires gouttelettes (PCG)
- ✗ Je mets en place les précautions complémentaires air (PCA)



La transmission se fait principalement par l'intermédiaire de gouttelettes infectieuses provenant des voies aériennes supérieures générées par la toux, les éternuements ou la parole d'un patient infecté et possiblement par des aérosols lors de soins à risque d'aérosolisation (kinésithérapie respiratoire, intubation, ...) et dans des espaces clos mal ventilés.

La transmission est également possible par contact des muqueuses nasales, buccales et conjonctivales avec des mains ou des objets fraîchement souillés par des sécrétions oropharyngées d'un sujet infecté. A l'hôpital, les précautions complémentaires à mettre en place sont des précautions complémentaires gouttelettes et contact en complément de précautions standard.

05 Pour un patient ayant une gastro-entérite,

- ✓ J'applique les précautions standard
- ✓ Je mets en place les précautions complémentaires contact (PCC)
- ✗ Je mets en place les précautions complémentaires gouttelettes (PCG)
- ✗ Je mets en place les précautions complémentaires air (PCA)



La transmission des bactéries ou virus du tube digestif se fait par contact direct ou indirect. Les précautions à mettre en place sont **des précautions complémentaires de type contact en complément des précautions standard**. Il y a un risque majeur de transmission lors de la gestion des excréta et lors de l'entretien des bassins. Le respect des opportunités de l'hygiène des mains par friction hydro-alcoolique après les soins et le bionettoyage du matériel utilisé sont essentiels pour lutter contre les transmissions croisées.

06 Pour un patient présentant une diarrhée à *Clostridioides difficile* ou atteint de la gale,

- ✓ Je mets en place les précautions complémentaires contact spécifiques (PCC)
- ✗ Je mets en place les précautions complémentaires gouttelettes spécifiques (PCG)
- ✗ Je mets en place les précautions complémentaires air spécifiques (PCA)



Le *Clostridioides difficile* est une bactérie bacille à Gram positif sporulée qui est très résistante dans l'environnement. La transmission est féco-orale à partir des mains des soignants ou de l'environnement contaminé.

Les précautions à mettre en place sont des **précautions complémentaires contact spécifiques** avec des particularités par rapport aux PCC qui sont :

- La protection de la tenue en systématique avec une surblouse et le port des gants dès l'entrée dans la chambre,
- Après soin, lavage des mains au savon suivi d'une FHA,
- Le bionettoyage avec un désinfectant sporicide.

La gale est une infection cutanée contagieuse, liée à la colonisation de la couche cornée de l'épiderme par un parasite acarien : le *Sarcoptes scabiei hominis*. La transmission de personne à personne se fait par contact direct et prolongé, peau à peau, ou par contact indirect (litière, linge de corps).

Les précautions à mettre en place sont des **précautions complémentaires contact spécifiques** avec des particularités par rapport aux PCC qui sont :

- La protection de la tenue en systématique avec une surblouse et le port des gants dès l'entrée dans la chambre,
- Après soin, lavage des mains au savon suivi d'une FHA,
- Le bionettoyage des tissus et des matériaux absorbants avec des produits acaricides.