



Audit de connaissance des Précautions « Standard » par les professionnels de santé de Haute Normandie

Denis THILLARD
Antenne Haute Normandie du C.CLIN

Contexte

- Plan d'action 2007-2008 du GRIHHN * et des praticiens en hygiène de la région
 - ✿ réaliser un état des lieux régional du niveau de connaissance des PS
- Coordonnée par l'Antenne Régionale du CCLIN Paris-Nord

*GRIHHN : groupe régional des infirmiers hygiénistes de Haute Normandie

Journée des Clin interrégion Paris Nord du 12/03/2009

2

Objectifs

- Évaluer les connaissances des professionnels de santé sur les PS
- Mettre en place
 - ✿ des actions de sensibilisation
 - ✿ des informations ciblées

Journée des Clin interrégion Paris Nord du 12/03/2009

3

Méthodologie (1)

- auto-évaluation par questionnaire anonyme
- octobre 2007 à juin 2008
- établissements volontaires de la région
- échantillon ou tous les services de soins et médico-techniques
- échantillon ou tous les professionnels de santé réalisant des soins auprès des patients
- enquête réalisée par le CLIN et/ou EOH

Journée des Clin interrégion Paris Nord du 12/03/2009

4

Méthodologie (2)


- masque de saisie fourni par ARLIN (Excel®)
- programme d'analyse
 - édition automatisée des résultats
 - calcul d'un score sur 100 pour chaque questionnaire
 - pondération : 0 à 3 points selon les items
- aide à la saisie des petits établissements par l'ARLIN
- rapport régional

Participation


- 79% des établissements (n=52)
(84% pour les ES publics et 74% pour les ES privés)
- 8 149 fiches exploitées pour les établissements de santé

Description population


- age médian = 36 ans
- répartition des répondants selon le sexe



Répartition selon la catégorie professionnelle



Répartition selon le service d'activité




Journée des Clin interrégion Paris Nord du 12/03/2009

9

La formation

graphique 4 : Moment de la formation




■ 65% ont déclaré avoir déjà reçu une formation sur les PS

Journée des Clin interrégion Paris Nord du 12/03/2009

10

1) Connaissez-vous les précautions standard ?




Journée des Clin interrégion Paris Nord du 12/03/2009

11

2) Selon vous les précautions standard :

1. Visent à protéger essentiellement les patients
2. Visent à protéger essentiellement les soignants
3. Visent à protéger les patients et les soignants
4. S'appliquent pour tous les patients
5. Sont nécessaires en cas de contact prévisible avec les liquides biologiques

graphique 6 : Objectifs des précautions standard - % de personnes ayant choisi chaque item




Journée des Clin interrégion Paris Nord du 12/03/2009

12

3) L'hygiène des mains doit être réalisée systématiquement

1. Avant un contact avec un patient
2. Après un contact avec un patient
3. Entre deux patients
4. Après le retrait des gants


graphique 8 : Indications de l'hygiène des mains - % de personnes ayant choisi chaque item



4) Les gants doivent être portés systématiquement :

1. Pour chaque soin
2. Si risque de contact avec le sang ou autre liquide biologique
3. Si risque de coupure
4. Lors des soins si les mains du soignant avec lésions cutanées


graphique 10 : Indications du port des gants - % des personnes ayant choisi chaque item



5) Lorsqu'il y a un risque de projection ou d'aérosolisation de sang, ou tout autre produit d'origine humaine (aspiration trachéo-bronchique, endoscopie, intubation,...) le soignant doit porter :


- | | |
|-------------------------------|----------------------|
| 1. Un masque | 4. Des surchaussures |
| 2. Des lunettes de protection | 5. Une charlotte |
| 3. Une surblouse ou tablier | 6. Autre chose |

graphique 12 : Protection du personnel si risque de projection
% de personnes ayant choisi chaque item




7) Concernant le matériel souillé :

1. Le matériel piquant/tranchant doit être posé dans un plateau, dans la chambre du patient, aussitôt après le soin.
2. Le matériel piquant/tranchant doit être recapuchonné avec précaution aussitôt après le soin.
3. Le matériel piquant/tranchant doit, systématiquement, être jeté immédiatement sans recapuchonnage dans un conteneur adapté, résistant aux perforations
4. Le transport de prélèvements biologiques, de linge souillé et de matériels souillés se fait dans des emballages étanches et fermés
5. Le matériel souillé doit être évacué de la chambre aussitôt après le soin.



8) En cas d'AES, les gestes à réaliser sont :

1. Faire saigner
2. Laver la plaie cutanée au savon
3. Désinfecter au Dakin ou à l'eau de javel
4. Désinfecter à l'alcool
5. Consulter le médecin référent dans les 4 heures suivant l'accident




Journée des Clin interrégion Paris Nord du 12/03/2009

17

Score des questionnaires

- score médian = 77
 - 80 pour les personnes pensant bien connaître les PS / 65 ne connaissant pas
 - 77 pour les personnes avec formation / 68 sans formation
 - 85 étudiants / 83 IDE / 72 médecins / 72 AS / 59 ASH



Journée des Clin interrégion Paris Nord du 12/03/2009

18

Conclusion

- Taux de participation élevé (ES et personnel)
- 1/3 des agents n'ont jamais eu de formation sur les PS
- 1/3 connaissent très bien les objectifs des PS
- Hygiène des mains connue à 61%
 - mais 28% pas d'HDM après port de gant
- 33% port de gant systématique
- 54% mauvaise connaissance des indications du port des gants
- 15% recapuchonnage avant élimination (AS et ASH +++)
- CAT complète en cas AES connue pour 38% (12% font saigner)

Journée des Clin interrégion Paris Nord du 12/03/2009

19

Perspectives

- Élaboration d'un diaporama de formation PS (GRIHNN)
- Réflexion concernant la réalisation d'un outil de sensibilisation au bon usage des gants
- Enquête auprès des IFSI et des EHPAD

Journée des Clin interrégion Paris Nord du 12/03/2009

20