


*Coordonnées de l'établissement
Infirmière de coordination
Consultation « pansement »
Soins externes*

Evolution normale de la cicatrice



Fils en points
séparés

Fils en surjet

Agrafes
séparés

- Soit aucune rougeur
- Soit rougeurs mais uniquement autour des agrafes ou des fils (images ci-dessus) avec une peau normale par ailleurs


Éléments à surveiller, dans l'attente de la prochaine consultation chirurgicale :

Réactions de la peau

1-INFLAMMATION au niveau de la cicatrice

(souvent le 1^{er} signe, image ci-contre)

- Rougeur étendue (au-delà des fils ou agrafes)
- Gonflement
- Chaleur
- Douleur



2-ÉCOULEMENT avec ou sans odeur

(sang, liquide clair ou pus)

3-RÉOUVERTURE de la cicatrice

(après le retrait des fils ou agrafes)

4-Peau D'ASPECT INHABITUEL

(changement de couleur, cloques...)

Etat général modifié

1-FIÈVRE à 38-38,5°C

2-DOULEUR qui s'étend au-delà de la cicatrice

Si vous
constatez un
de ces signes

Parlez-en à un professionnel
de santé :

- votre équipe chirurgicale
(si des consignes vous ont été données en ce sens)
- l'infirmière libérale en charge de vos soins
- votre médecin traitant
- votre pharmacien

Les patients ont un rôle à jouer dans la détection précoce des infections superficielles. Patients, usagers, professionnels : tous concernés !