



Semaine Sécurité des patients 2025

La sécurité des patients dès le départ !

Quiz de sensibilisation des professionnels de santé
au risque infectieux et sa prévention chez les tous petits

✓ **Bonnes réponses ... et explications** ✓

01

La désinfection des mains par friction hydroalcoolique est :

- ✓ La technique de référence pour les professionnels dans tous les secteurs de soins, y compris dans les services de néonatalogie
- ✗ Réalisable par tous les enfants hospitalisés en pédiatrie
- ✓ Sans danger pour les femmes enceintes



L'alcool présent dans les produits hydroalcooliques s'évapore rapidement lors de la friction qui doit être réalisée jusqu'au séchage complet. Il n'y a donc pas de toxicité pour le nouveau-né lors des soins avec des mains correctement désinfectées par friction.

L'absorption d'alcool par exposition cutanée est négligeable. De plus, les produits hydroalcooliques sont de biocides réglementés, par exemple la présence de bisphénol A est interdite dans ces produits. Il n'y a donc pas de contre-indication chez la femme enceinte.

Pour les patients, un lavage des mains est suffisant mais peut être remplacé par une désinfection des mains par friction hydroalcoolique pour plus de praticité. Toutefois, chez les jeunes enfants, il faut rester vigilant face au risque d'ingestion ou de projection oculaire. Ils doivent être utilisés sous le contrôle d'un adulte.

Réf : Solutions hydro-alcooliques : attention aux projections accidentelles dans les yeux des jeunes enfants, 31 août 2020 (Anses) / Rapport relatif à l'innocuité des PHA à base d'éthanol, mars 2011 (Afssaps) / Hygiène des mains et soins : du choix du produit à son utilisation et à sa promotion, mars 2018 (SF2H)

02

Lors de la prise en charge de nouveau-nés, pour quels soins doit-on porter systématiquement des gants ?

- ✓ Lors du change du nouveau-né
- ✓ Lors du test de succion dans les premiers jours de vie d'un nouveau-né
- ✗ Lors de la préparation d'un biberon en biberonnerie



Le port de gants protège les professionnels lors de soins à risque de contact avec des liquides biologiques (change de couches, contact avec la bouche du bébé), mais il n'est pas indiqué pour la préparation des biberons. En effet, le port systématique de gants est un frein à l'hygiène des mains et augmente le risque de transmission croisée. En revanche, il est essentiel de réaliser une désinfection des mains par friction hydroalcoolique avant toute manipulation du matériel.

Réf : Actualisation des précautions standard, juin 2017 (SF2H)

03

Je peux réutiliser une surblouse en néonatalogie pour tous les soins de la journée pour un même nouveau-né

- ✗ Vrai
- ✓ Faux



Les équipements de protection individuelle (EPI) sont des dispositifs essentiels pour protéger les professionnels de santé du risque d'exposition à des micro-organismes. Ils sont utilisés lors de contacts avec les muqueuses, la peau lésée, ou en cas de contact ou risque de contact, projection ou aérosolisation de produits biologiques d'origine humaine. En néonatalogie, la protection de la tenue est également recommandée pour tout contact direct avec le bébé. L'usage unique avec élimination immédiate après utilisation, est une mesure pour éviter toute transmission croisée. La réutilisation d'une surblouse génère un risque de contamination des mains ou de la tenue du professionnel.

Réf : Actualisation des précautions standard, juin 2017 (SF2H)



04

Que faut-il faire pour les soins de cordon prodigués à un nouveau-né ?

- ✓ Réaliser une hygiène des mains au préalable
- ✗ Désinfecter quotidiennement avec un antiseptique
- ✓ Laisser le cordon à l'air libre, en dehors de la couche
- ✓ Informer les parents sur les signes infectieux devant alerter



En France, où la naissance s'effectue dans de bonnes conditions d'asepsie, un nettoyage avec du savon est suffisant pour les soins de cordon. Ceux-ci doivent être effectués quotidiennement avec du savon doux liquide à pH neutre, avec des compresses non-stériles en non-tissé. Après séchage minutieux, le cordon est laissé hors de la couche. Un aspect inhabituel, un cordon malodorant, des sécrétions purulentes ou un érythème péri-ombilical sont des signes d'alerte qui doivent conduire les parents à consulter dans la journée.

Réf : Avis du 18 janvier 2023 relatif aux bonnes pratiques d'hygiène pour les soins du cordon pour les nouveau-nés en maternité et après la sortie de maternité (SF2H)

05

Quel(s) antiseptique(s) peut-on utiliser chez le nouveau-né prématuré ?

- ✓ Biseptine®
- ✗ Bétadine® dermique
- ✓ Dakin®
- ✗ Chlorhexidine alcoolique 2%
- ✗ Alcool éthylique 70°



Les dérivés iodés et l'alcool éthylique sont contre-indiqués chez les nouveau-nés (risque d'irritations et de passage systémique). La chlorhexidine peut être utilisée à de faibles concentrations comme dans la formulation de la Biseptine® (0,25%). Les dérivés chlorés (Dakin®, Amukine®) sont autorisés quel que soit le terme. La Biseptine® et le Dakin® sont donc les 2 antiseptiques à privilégier lors de la réalisation d'un acte invasif chez le nouveau-né, prématuré ou non.

Réf : Avis du 13 juin 2022 relatif à l'Antisepsie de la peau saine avant un acte invasif en néonatalogie (SF2H)

06

Concernant la gestion des jouets dans une unité de soins pédiatriques, quelle affirmation est correcte ?

- ✗ Les jouets doivent être entretenus régulièrement à l'eau et au savon
- ✓ Les jouets difficilement nettoyables doivent être évités lorsqu'ils sont partagés par plusieurs enfants



Pour garantir l'hygiène en collectivité, il faut définir des procédures claires d'entretien des jouets, incluant produit, technique et fréquence. Éviter les jouets difficiles à entretenir et éliminer les jouets abîmés. Ne pas partager les jouets portés à la bouche, sauf s'ils sont désinfectés immédiatement après utilisation. Choisir un détergent-désinfectant adapté à un usage alimentaire, avec rinçage à l'eau claire suivi d'un séchage. Nettoyer sans délai tous les jouets et les peluches souillés. Ces mesures limitent la transmission des micro-organismes pouvant être responsables d'infections et assurent la sécurité des enfants.

Réf : Actualisation des précautions standard, juin 2017 (SF2H)





07

Parmi les propositions suivantes, laquelle est correcte concernant le bionettoyage des incubateurs ?

- ✗ *L'entretien interne de l'incubateur avec un produit détergent-désinfectant est interdit en présence de l'enfant ; seules les surfaces externes peuvent être désinfectées*
- ✓ L'entretien interne et externe de l'incubateur suit des procédures strictes, même en présence de l'enfant



Les incubateurs permettent de maintenir le nouveau-né dans une ambiance thermique et hygrométrique satisfaisante. Ils permettent la surveillance du nouveau-né et la réalisation de soins. Ce dispositif, complexe et sensible, nécessite un entretien quotidien des surfaces internes et externes à l'aide de détergents-désinfectants adaptés à la présence de nouveau-nés.

Un nettoyage complet de l'incubateur doit être aussi effectué régulièrement en l'absence de l'enfant. Enfin, la traçabilité de chaque entretien doit être assurée pour garantir la sécurité et limiter le risque infectieux.

Réf : Avis du 15 juillet 2022 relatif aux bonnes pratiques de soins aux nouveau-nés pour prévenir les infections sur dispositifs invasifs et la transmission croisée en secteurs de soins de néonatalogie (SF2H)

08

Quelles sont les propositions vraies concernant le bionettoyage du matériel ?

- ✓ Les dispositifs médicaux partagés comme le tire-lait, le biliflash, l'échographe sont systématiquement nettoyés et désinfectés après chaque utilisation
- ✗ *Les accessoires textiles sont préférentiellement traités par une machine à laver dans le service de soin*
- ✓ Les téléphones portables des parents d'enfants hospitalisés comme ceux des soignants doivent être désinfectés régulièrement avec un produit adapté



Le matériel et l'environnement peuvent constituer des réservoirs de micro-organismes. C'est pourquoi il est nécessaire de désinfecter le matériel après chaque utilisation d'autant plus lorsqu'il est partagé entre plusieurs enfants. Les téléphones portables sont souvent présents dans les services, leur utilisation doit être suivie d'une friction hydroalcoolique et d'une désinfection régulière.

Pour les textiles, un entretien préférentiel en blanchisserie est recommandé afin de s'assurer du respect de la méthode RABC (identification, évaluation et maîtrise des risques de contamination microbiologique tout au long du processus de traitement du linge).

Réf : Avis du 15 juillet 2022 relatif aux bonnes pratiques de soins aux nouveau-nés pour prévenir les infections sur dispositifs invasifs et la transmission croisée en secteurs de soins de néonatalogie (SF2H)

09

La prévention des infections passe aussi par la vaccination. Quels vaccins sont recommandés pendant la grossesse pour protéger la mère et l'enfant ?

- ✓ Contre le Covid-19
- ✓ Contre la grippe
- ✗ *Contre la rougeole*
- ✓ Contre le VRS
- ✓ Contre la coqueluche



Le vaccin contre la rougeole (ROR) étant un vaccin vivant, il est contre-indiqué pendant la grossesse. Une mise à jour du calendrier vaccinal sera proposée pendant la période post-natale le cas échéant. La vaccination contre les infections à VRS, nouveauté du calendrier vaccinal 2025, doit intervenir entre 32 et 36 semaines d'aménorrhée, juste avant ou pendant la période épidémique afin de protéger l'enfant à naître.

Réf : Calendrier des vaccinations et recommandations vaccinales 2025 (Ministère)

