

Réseau de surveillance des consommations antibiotiques 2015



Détail des consommations d'antifongiques

Région Hauts-de-France

Consommations d'antifongiques - Ensemble de l'établissement (N=22)
(Réseau de surveillance des consommations 2015)

| Molécule | Médiane | P25 | P75 | Minimum | Maximum |
|---------------------------------------|----------------|------------|------------|----------------|----------------|
| Amphotéricines B | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 10.7 |
| amphotéricine B non lipidique | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 |
| amphotéricine B liposomale | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 9.9 |
| amphotéricine B complexes phospholip. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Triazolés | 8.5 | 2.1 | 17.9 | 0.0 | 26.3 |
| fluconazole | 5.7 | 2.1 | 12.8 | 0.0 | 24.3 |
| itraconazole | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 9.8 |
| voriconazole | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 2.8 |
| posaconazole | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 |
| Flucytosine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 |
| Echinocandines | 0.6 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 7.5 |
| caspofungine | 0.5 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 5.5 |
| micafungine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 |
| anidulafungine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| CONSOMMATION TOTALE ATF | 8.8 | 2.2 | 18.4 | 0.4 | 40.1 |

Consommations d'antifongiques - Services de réanimation (N=14)
(Réseau de surveillance des consommations 2015)

| Molécule | Médiane | P25 | P75 | Minimum | Maximum |
|---------------------------------------|----------------|------------|------------|----------------|----------------|
| Amphotéricines B | 0.6 | 0.0 | 7.7 | 0.0 | 115.4 |
| amphotéricine B non lipidique | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 7.7 |
| amphotéricine B liposomale | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 114.8 |
| amphotéricine B complexes phospholip. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Triazolés | 72.6 | 49.1 | 147.4 | 18.9 | 401.4 |
| fluconazole | 65.9 | 48.4 | 100.2 | 10.0 | 365.8 |
| itraconazole | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 7.9 |
| voriconazole | 9.2 | 5.3 | 22.2 | 0.0 | 54.4 |
| posaconazole | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.8 |
| Flucytosine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.1 |
| Echinocandines | 25.3 | 21.6 | 43.8 | 2.8 | 80.2 |
| caspofungine | 23.9 | 17.1 | 39.8 | 0.8 | 76.0 |
| micafungine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 79.4 |
| anidulafungine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.7 |
| CONSOMMATION TOTALE ATF | 136.7 | 92.0 | 220.0 | 59.8 | 438.5 |

Consommations d'antifongiques - Services d'hématologie (N=5)
(Réseau de surveillance des consommations 2015)

| Molécule | Médiane | P25 | P75 | Minimum | Maximum |
|---------------------------------------|----------------|------------|------------|----------------|----------------|
| Amphotéricines B | 49.3 | 39.5 | 60.6 | 8.8 | 187.0 |
| amphotéricine B non lipidique | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 0.0 | 60.6 |
| amphotéricine B liposomale | 39.5 | 8.8 | 49.3 | 0.0 | 184.3 |
| amphotéricine B complexes phospholip. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Triazolés | 138.8 | 99.9 | 181.2 | 16.6 | 209.9 |
| fluconazole | 85.3 | 49.7 | 108.8 | 16.5 | 143.0 |
| itraconazole | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| voriconazole | 9.0 | 8.8 | 18.0 | 0.1 | 84.1 |
| posaconazole | 5.6 | 5.0 | 54.4 | 0.0 | 58.1 |
| Flucytosine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.2 |
| Echinocandines | 10.6 | 10.0 | 37.7 | 5.4 | 105.2 |
| caspofungine | 10.6 | 10.0 | 37.7 | 5.4 | 69.3 |
| micafungine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.9 |
| anidulafungine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| CONSOMMATION TOTALE ATF | 185.4 | 159.8 | 259.4 | 82.7 | 484.6 |