

Réseau de surveillance des consommations antibiotiques 2016



Détail des consommations d'antibiotiques
par molécule et par type d'activité

Région Ile-de-France

Consommations d'antibiotiques - Ensemble de l'établissement (N=188)

(Réseau de surveillance des consommations 2016)

| Molécule | Médiane | P25 | P75 | Minimum | Maximum |
|--|---------|-------|-------|---------|---------|
| B-lactamines | 246.4 | 110.2 | 390.8 | 13.8 | 1010.9 |
| Penicillines | 173.8 | 90.0 | 286.3 | 13.3 | 566.6 |
| Penicillines G | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 12.4 |
| benzylpenicilline | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 12.4 |
| benzathine benzylpenicilline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| Penicilline V (phenoxyethylpenicilline) | 0.3 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 41.4 |
| Penicillines M | 1.9 | 0.3 | 5.8 | 0.0 | 42.1 |
| cloxacilline | 1.3 | 0.2 | 4.7 | 0.0 | 29.0 |
| oxacilline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.7 |
| Penicillines A | 57.2 | 31.6 | 100.8 | 0.0 | 389.8 |
| ampicilline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.7 |
| amoxicilline | 57.2 | 31.6 | 100.8 | 0.0 | 389.8 |
| Penicillines + inhibiteur | 96.9 | 50.8 | 173.6 | 2.0 | 478.6 |
| penicillines A + inh. | 90.9 | 50.7 | 156.4 | 2.0 | 447.7 |
| amoxicilline ac clavulanique | 90.9 | 50.7 | 156.4 | 2.0 | 447.7 |
| ampicilline sulbactam | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ureido-penicilline + inh. (piperacilline tazobactam) | 3.1 | 0.3 | 10.0 | 0.0 | 90.8 |
| carboxypenicillines + inh. (ticarcilline ac clavulanique) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 |
| Aminido-penicilline (pivmecillinam) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 |
| Ureidopenicillines | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 4.2 |
| piperacilline | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 4.2 |
| Carboxypenicillines | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 |
| ticarcilline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| temocilline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 |
| Cephalosporines, Penemes, Monobactams | 39.7 | 12.8 | 98.7 | 0.4 | 859.0 |
| Cephalosporines | 37.8 | 12.0 | 89.1 | 0.4 | 859.0 |
| C1G+C2G | 3.2 | 0.0 | 43.6 | 0.0 | 851.4 |
| C1G (dont J01DC04) | 2.2 | 0.0 | 37.6 | 0.0 | 652.3 |
| cefalexine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 |
| cefazoline | 2.2 | 0.0 | 36.9 | 0.0 | 652.3 |
| cefadroxil | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |

| Molécule | Médiane | P25 | P75 | Minimum | Maximum |
|---|---------|-----|------|---------|---------|
| cefaclor | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| C2G (sauf J01DC04 et J01DC07) | 0.2 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 271.7 |
| cefoxitine | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 14.9 |
| cefuroxime | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 271.7 |
| cefamandole | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
| C3G (dont J01DC07 et J01DE) | 19.6 | 8.3 | 39.8 | 0.0 | 175.0 |
| C3G Orales (dont J01DC07) | 1.9 | 0.6 | 4.0 | 0.0 | 18.6 |
| cefixime | 1.7 | 0.5 | 3.9 | 0.0 | 18.4 |
| cefpodoxime | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.2 |
| cefotiam | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| C3G Injectables | 16.2 | 4.7 | 36.0 | 0.0 | 175.0 |
| C3G Inj. inactives sur P. aeruginosa | 14.3 | 4.3 | 32.5 | 0.0 | 174.7 |
| cefotaxime | 1.3 | 0.0 | 5.8 | 0.0 | 42.3 |
| ceftriaxone | 10.4 | 3.3 | 22.7 | 0.0 | 174.0 |
| C3G Inj. actives sur P. aeruginosa | 0.9 | 0.0 | 3.4 | 0.0 | 40.9 |
| ceftazidime | 0.5 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 20.2 |
| cefepime | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 23.1 |
| ceftazidimeavibactam | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 |
| ceftolozanetazobactam | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.3 |
| Autres céphalosporines | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 |
| ceftobiprole | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
| ceftaroline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 |
| ceftobiprole+ceftaroline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 |
| Penemes | 1.3 | 0.2 | 5.0 | 0.0 | 63.6 |
| ertapenem | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 3.9 |
| Penemes actives sur P. aeruginosa | 1.1 | 0.1 | 4.0 | 0.0 | 62.4 |
| imipenem | 1.0 | 0.0 | 3.9 | 0.0 | 58.6 |
| meropenem | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 31.8 |
| Monobactams (aztreonam) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
| Tetracyclines | 1.4 | 0.0 | 4.4 | 0.0 | 47.1 |
| demeclocycline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9 |
| doxycycline | 1.1 | 0.0 | 4.2 | 0.0 | 34.6 |
| lymecycline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.4 |

| Molécule | Médiane | P25 | P75 | Minimum | Maximum |
|---|---------|------|------|---------|---------|
| metacycline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| minocycline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.9 |
| tigecycline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 |
| Sulfamides | 5.2 | 2.3 | 10.2 | 0.0 | 104.7 |
| cotrimoxazole | 5.2 | 2.3 | 9.9 | 0.0 | 104.7 |
| sulfadiazine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.3 |
| sulfamethizole | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| sulfafurazole (erythromycine+sulfafurazole) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| MLS | 14.2 | 6.8 | 22.0 | 0.0 | 52.2 |
| Macrolides | 4.4 | 1.5 | 11.9 | 0.0 | 39.9 |
| erythromycine seule | 0.5 | 0.0 | 2.3 | 0.0 | 9.7 |
| erythromycine (erythromycine+sulfafurazole) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| erythromycine | 0.5 | 0.0 | 2.3 | 0.0 | 9.7 |
| spiramycine seule | 0.5 | 0.0 | 3.5 | 0.0 | 31.9 |
| spiramycine (spiramycine+ métronidazole) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 |
| spiramycine | 0.6 | 0.1 | 3.6 | 0.0 | 31.9 |
| roxithromycine | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 11.6 |
| josamycine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.2 |
| clarithromycine | 0.4 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 24.7 |
| azithromycine | 0.4 | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 27.1 |
| midecamycine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| telithromycine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| Lincosamides | 2.5 | 0.6 | 5.1 | 0.0 | 29.1 |
| clindamycine | 2.5 | 0.6 | 5.1 | 0.0 | 29.1 |
| lincomycine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.7 |
| Streptogramines | 3.4 | 1.8 | 5.7 | 0.0 | 31.8 |
| pristinamycine | 3.4 | 1.8 | 5.7 | 0.0 | 31.8 |
| Aminosides | 4.9 | 0.6 | 16.0 | 0.0 | 121.4 |
| amikacine | 0.9 | 0.0 | 3.7 | 0.0 | 52.2 |
| gentamicine | 2.5 | 0.1 | 10.4 | 0.0 | 121.4 |
| tobramycine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.7 |
| streptomycine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| Quinolones | 30.4 | 19.8 | 47.0 | 0.0 | 405.8 |

| Molécule | Médiane | P25 | P75 | Minimum | Maximum |
|--|---------|------|------|---------|---------|
| Quinolones 1 G | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| acide pipemidique | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| flumequine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Fluoroquinolones | 30.4 | 19.8 | 47.0 | 0.0 | 405.8 |
| Fluoroquinolones orales | 26.5 | 15.9 | 37.3 | 0.0 | 380.3 |
| Fluoroquinolones injectables | 3.6 | 0.7 | 11.3 | 0.0 | 67.8 |
| norfloxacin | 1.1 | 0.2 | 2.8 | 0.0 | 27.8 |
| enoxacin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| pefloxacin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 |
| ofloxacin | 10.3 | 5.2 | 19.6 | 0.0 | 96.5 |
| ciprofloxacin | 8.0 | 3.9 | 14.1 | 0.0 | 64.1 |
| levofloxacin | 4.4 | 1.8 | 9.7 | 0.0 | 372.3 |
| moxifloxacin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.3 |
| lomefloxacin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| Phénicoles (thiamphenicol) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| Glycopeptides | 2.1 | 0.3 | 6.4 | 0.0 | 47.6 |
| vancomycine | 1.8 | 0.3 | 6.0 | 0.0 | 46.2 |
| teicoplanine | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 8.6 |
| Imidazoles | 8.8 | 2.0 | 19.3 | 0.0 | 103.2 |
| Imidazolés O | 3.4 | 0.5 | 6.6 | 0.0 | 32.6 |
| Imidazolés I | 5.0 | 0.4 | 13.5 | 0.0 | 70.6 |
| metronidazole seul | 8.4 | 2.0 | 19.0 | 0.0 | 103.2 |
| metronidazole (spiramycine+ metronidazole) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
| metronidazole | 8.4 | 2.0 | 19.1 | 0.0 | 103.2 |
| ornidazole | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.3 |
| tinidazole | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
| "Autres ATB" (J01X + imidazoles oraux: P01AB) | 17.0 | 8.3 | 33.7 | 0.0 | 117.8 |
| J01X | 12.8 | 5.5 | 27.9 | 0.0 | 104.0 |
| acide fusidique | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 20.9 |
| fosfomycine | 0.2 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 7.6 |
| linezolid | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 15.0 |
| colistine | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 37.4 |
| nitrofurantoïne | 0.7 | 0.0 | 2.1 | 0.0 | 11.5 |

| Molécule | Médiane | P25 | P75 | Minimum | Maximum |
|---|---------|-------|-------|---------|---------|
| daptomycine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39.8 |
| Antistaphylococciques | 2.8 | 0.5 | 7.6 | 0.0 | 63.9 |
| rifampicine | 4.2 | 0.5 | 8.3 | 0.0 | 48.4 |
| fidaxomicine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 |
| Consommation antibactériens à usage systémique (J01) | 330.2 | 150.0 | 527.7 | 41.3 | 1191.2 |
| CONSOMMATION TOTALE | 334.5 | 159.6 | 538.3 | 42.6 | 1196.7 |

*Antistaphylococcique: glycopeptides, linézolide, daptomycine.

Consommations d'antibiotiques - Ensemble de l'établissement - Etablissements groupe 1
(>66% lits MCO) et >300 lits (N=19)
(Réseau de surveillance des consommations 2016)

| Molécule | Médiane | P25 | P75 | Minimum | Maximum |
|--|---------|-------|-------|---------|---------|
| B-lactamines | 395.8 | 326.0 | 492.3 | 291.8 | 681.1 |
| Penicillines | 293.0 | 267.9 | 373.2 | 237.6 | 529.0 |
| Penicillines G | 0.4 | 0.1 | 2.0 | 0.0 | 6.6 |
| benzylpenicilline | 0.4 | 0.1 | 1.9 | 0.0 | 6.6 |
| benzathine benzylpenicilline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| Penicilline V (phenoxyethylpenicilline) | 1.9 | 1.1 | 3.3 | 0.4 | 21.4 |
| Penicillines M | 8.0 | 6.4 | 14.9 | 1.3 | 24.0 |
| cloxacilline | 8.0 | 5.6 | 14.9 | 1.3 | 24.0 |
| oxacilline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 |
| Penicillines A | 129.0 | 116.9 | 151.6 | 34.9 | 204.6 |
| ampicilline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| amoxicilline | 129.0 | 116.9 | 151.6 | 34.9 | 204.6 |
| Penicillines + inhibiteur | 168.6 | 133.5 | 212.9 | 84.8 | 319.5 |
| penicillines A + inh. | 153.9 | 115.8 | 191.4 | 56.9 | 302.3 |
| amoxicilline ac clavulanique | 153.9 | 115.8 | 191.4 | 56.9 | 302.3 |
| ampicilline sulbactam | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ureido-penicilline + inh. (piperacilline tazobactam) | 22.6 | 12.7 | 31.9 | 6.3 | 90.8 |
| carboxypenicillines + inh. (ticarcilline ac clavulanique) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| Aminido-penicilline (pivmecillinam) | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 2.2 |
| Ureidopenicillines | 1.3 | 0.9 | 2.2 | 0.0 | 4.2 |
| piperacilline | 1.3 | 0.9 | 2.2 | 0.0 | 4.2 |
| Carboxypenicillines | 0.3 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 3.6 |
| ticarcilline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| temocilline | 0.1 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 3.6 |
| Cephalosporines, Penemes, Monobactams | 83.8 | 71.3 | 121.3 | 53.0 | 152.1 |
| Cephalosporines | 75.1 | 59.1 | 87.4 | 45.7 | 114.3 |
| C1G+C2G | 17.9 | 12.9 | 22.7 | 4.1 | 68.6 |
| C1G (dont J01DC04) | 14.2 | 8.9 | 20.5 | 3.8 | 47.4 |
| cefalexine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
| cefazoline | 14.0 | 8.9 | 20.5 | 3.8 | 47.4 |

| Molécule | Médiane | P25 | P75 | Minimum | Maximum |
|---|---------|------|------|---------|---------|
| cefadroxil | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| cefaclor | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
| C2G (sauf J01DC04 et J01DC07) | 2.2 | 1.2 | 6.7 | 0.0 | 21.2 |
| cefoxitine | 1.3 | 0.6 | 2.2 | 0.0 | 4.9 |
| cefuroxime | 0.2 | 0.0 | 2.4 | 0.0 | 16.2 |
| cefamandole | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 2.5 |
| C3G (dont J01DC07 et J01DE) | 46.1 | 43.6 | 67.8 | 31.9 | 82.8 |
| C3G Orales (dont J01DC07) | 2.5 | 1.8 | 3.7 | 0.1 | 6.1 |
| cefixime | 2.5 | 1.6 | 3.5 | 0.1 | 5.8 |
| cefopodoxime | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.3 |
| cefotiam | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| C3G Injectables | 43.5 | 40.1 | 61.7 | 31.0 | 82.4 |
| C3G Inj. inactives sur P. aeruginosa | 36.2 | 25.6 | 42.4 | 19.3 | 49.3 |
| cefotaxime | 13.7 | 7.4 | 26.9 | 3.0 | 41.8 |
| ceftriaxone | 19.3 | 10.8 | 22.7 | 4.7 | 29.4 |
| C3G Inj. actives sur P. aeruginosa | 15.3 | 5.5 | 19.2 | 2.9 | 40.9 |
| ceftazidime | 2.9 | 1.9 | 11.8 | 1.6 | 20.2 |
| cefepime | 6.2 | 3.1 | 15.6 | 0.4 | 23.1 |
| ceftazidimeavibactam | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| ceftolozanetazobactam | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 1.0 |
| Autres céphalosporines | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| ceftobiprole | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
| ceftaroline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| ceftobiprole+ceftaroline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 |
| Penemes | 11.4 | 6.3 | 26.8 | 3.8 | 63.6 |
| ertapenem | 0.6 | 0.1 | 1.2 | 0.0 | 3.0 |
| Penemes actives sur P. aeruginosa | 10.0 | 6.1 | 26.0 | 2.0 | 62.4 |
| imipenem | 5.4 | 4.5 | 8.0 | 1.9 | 38.1 |
| meropenem | 3.3 | 1.6 | 13.4 | 0.0 | 31.8 |
| Monobactams (aztreonam) | 0.5 | 0.1 | 1.1 | 0.0 | 3.5 |
| Tetracyclines | 5.9 | 3.2 | 8.2 | 0.0 | 21.8 |
| demeclocycline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
| doxycycline | 5.4 | 2.8 | 7.3 | 0.0 | 21.8 |

| Molécule | Médiane | P25 | P75 | Minimum | Maximum |
|---|---------|------|------|---------|---------|
| lymecycline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| metacycline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| minocycline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 |
| tigecycline | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 1.4 |
| Sulfamides | 17.7 | 8.0 | 25.6 | 6.7 | 62.8 |
| cotrimoxazole | 13.7 | 7.4 | 19.7 | 6.7 | 62.8 |
| sulfadiazine | 0.6 | 0.0 | 3.1 | 0.0 | 11.9 |
| sulfamethizole | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| sulfafurazole (erythromycine+sulfafurazole) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| MLS | 25.4 | 21.3 | 36.7 | 12.2 | 47.9 |
| Macrolides | 14.4 | 11.2 | 22.4 | 4.3 | 39.9 |
| erythromycine seule | 2.1 | 1.2 | 4.3 | 0.1 | 8.7 |
| erythromycine (erythromycine+sulfafurazole) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| erythromycine | 2.1 | 1.2 | 4.3 | 0.1 | 8.7 |
| spiramycine seule | 4.3 | 2.3 | 6.2 | 0.0 | 9.1 |
| spiramycine (spiramycine+ métronidazole) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| spiramycine | 4.4 | 2.3 | 6.2 | 0.0 | 9.1 |
| roxithromycine | 0.2 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 11.6 |
| josamycine | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 1.3 |
| clarithromycine | 2.9 | 1.1 | 4.2 | 0.0 | 5.2 |
| azithromycine | 2.7 | 1.7 | 8.0 | 0.5 | 24.9 |
| midecamycine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| telithromycine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| Lincosamides | 5.8 | 3.9 | 9.3 | 2.1 | 17.5 |
| clindamycine | 5.8 | 3.9 | 9.3 | 2.1 | 17.5 |
| lincomycine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
| Streptogramines | 3.1 | 1.7 | 4.1 | 0.5 | 13.9 |
| pristinamycine | 3.1 | 1.7 | 4.1 | 0.5 | 13.9 |
| Aminosides | 15.6 | 12.3 | 21.5 | 6.2 | 38.1 |
| amikacine | 5.3 | 4.3 | 8.1 | 3.1 | 12.9 |
| gentamicine | 6.7 | 6.1 | 10.2 | 2.5 | 17.2 |
| tobramycine | 0.7 | 0.1 | 4.1 | 0.0 | 19.7 |
| streptomycine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |

| Molécule | Médiane | P25 | P75 | Minimum | Maximum |
|--|---------|------|------|---------|---------|
| Quinolones | 37.6 | 26.0 | 49.5 | 21.0 | 61.4 |
| Quinolones 1 G | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| acide pipemidique | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| flumequine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Fluoroquinolones | 37.6 | 26.0 | 49.5 | 21.0 | 61.4 |
| Fluoroquinolones orales | 31.0 | 21.0 | 39.6 | 14.3 | 53.3 |
| Fluoroquinolones injectables | 6.5 | 3.9 | 10.5 | 2.8 | 20.5 |
| norfloxacin | 1.0 | 0.5 | 1.7 | 0.0 | 9.0 |
| enoxacin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| pefloxacin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| ofloxacin | 10.6 | 7.4 | 15.7 | 0.8 | 24.5 |
| ciprofloxacin | 14.1 | 8.1 | 19.5 | 6.8 | 27.4 |
| levofloxacin | 8.2 | 4.1 | 13.0 | 1.9 | 33.6 |
| moxifloxacin | 0.2 | 0.1 | 1.3 | 0.0 | 5.2 |
| lomefloxacin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Phénicoles (thiamphenicol) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| Glycopeptides | 10.2 | 5.9 | 21.0 | 2.5 | 47.6 |
| vancomycine | 9.4 | 5.8 | 19.7 | 2.2 | 43.5 |
| teicoplanine | 1.3 | 0.2 | 3.4 | 0.0 | 8.6 |
| Imidazoles | 19.5 | 16.6 | 27.3 | 11.8 | 43.6 |
| Imidazolés O | 6.5 | 4.7 | 9.1 | 0.0 | 13.7 |
| Imidazolés I | 14.7 | 10.5 | 21.6 | 7.2 | 29.8 |
| metronidazole seul | 18.7 | 15.9 | 27.2 | 4.7 | 39.7 |
| metronidazole (spiramycine+ metronidazole) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| metronidazole | 18.7 | 15.9 | 27.2 | 4.7 | 39.7 |
| ornidazole | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 22.3 |
| tinidazole | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| "Autres ATB" (J01X + imidazoles oraux: P01AB) | 44.1 | 33.6 | 58.7 | 22.0 | 117.8 |
| J01X | 34.7 | 26.6 | 54.0 | 18.6 | 104.0 |
| acide fusidique | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.8 |
| fosfomycine | 1.2 | 0.7 | 1.5 | 0.4 | 2.7 |
| linezolid | 2.0 | 0.7 | 2.6 | 0.0 | 5.4 |
| colistine | 1.3 | 0.6 | 3.3 | 0.4 | 37.4 |

| Molécule | Médiane | P25 | P75 | Minimum | Maximum |
|---|---------|-------|-------|---------|---------|
| nitrofurantoïne | 0.7 | 0.2 | 1.3 | 0.0 | 2.3 |
| daptomycine | 0.5 | 0.3 | 9.4 | 0.0 | 39.8 |
| Antistaphylococciques | 14.9 | 6.8 | 32.6 | 3.5 | 63.9 |
| rifampicine | 10.4 | 5.8 | 13.3 | 3.6 | 30.8 |
| fidaxomicine | 0.1 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.7 |
| Consommation antibactériens à usage systémique (J01) | 530.2 | 476.7 | 648.0 | 370.3 | 943.0 |
| CONSOMMATION TOTALE | 541.6 | 481.9 | 673.4 | 389.6 | 964.3 |

*Antistaphylococciques: glycopeptides, linézolide, daptomycine.

Consommations d'antibiotiques - Ensemble de l'établissement - Etablissements groupe 1
(>66% lits MCO) et <=300 lits (N=65)
(Réseau de surveillance des consommations 2016)

| Molécule | Médiane | P25 | P75 | Minimum | Maximum |
|--|---------|-------|-------|---------|---------|
| B-lactamines | 398.4 | 317.2 | 538.2 | 90.2 | 1010.9 |
| Penicillines | 286.6 | 203.2 | 356.5 | 35.2 | 566.6 |
| Penicillines G | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.6 |
| benzylpenicilline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.6 |
| benzathine benzylpenicilline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| Penicilline V (phenoxyethylpenicilline) | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 8.7 |
| Penicillines M | 3.2 | 0.7 | 6.7 | 0.0 | 42.1 |
| cloxacilline | 1.2 | 0.0 | 5.1 | 0.0 | 29.0 |
| oxacilline | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 17.7 |
| Penicillines A | 87.4 | 62.5 | 121.9 | 3.0 | 389.8 |
| ampicilline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| amoxicilline | 87.4 | 62.5 | 121.9 | 3.0 | 389.8 |
| Penicillines + inhibiteur | 150.3 | 122.6 | 233.8 | 18.4 | 478.6 |
| penicillines A + inh. | 141.9 | 95.1 | 220.4 | 16.3 | 447.7 |
| amoxicilline ac clavulanique | 141.9 | 95.1 | 220.4 | 16.3 | 447.7 |
| ampicilline sulbactam | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ureido-penicilline + inh. (piperacilline tazobactam) | 3.9 | 1.2 | 12.7 | 0.0 | 70.3 |
| carboxypenicillines + inh. (ticarcilline ac clavulanique) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 |
| Aminido-penicilline (pivmecillinam) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
| Ureidopenicillines | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 2.8 |
| piperacilline | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 2.8 |
| Carboxypenicillines | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 |
| ticarcilline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| temocilline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 |
| Cephalosporines, Penemes, Monobactams | 115.8 | 82.4 | 178.9 | 8.3 | 859.0 |
| Cephalosporines | 108.6 | 75.7 | 169.2 | 8.3 | 859.0 |
| C1G+C2G | 72.8 | 29.1 | 131.2 | 0.0 | 851.4 |
| C1G (dont J01DC04) | 56.6 | 24.6 | 116.5 | 0.0 | 652.3 |
| cefalexine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
| cefazoline | 56.6 | 24.6 | 116.5 | 0.0 | 652.3 |

| Molécule | Médiane | P25 | P75 | Minimum | Maximum |
|---|---------|------|------|---------|---------|
| cefadroxil | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
| cefaclor | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| C2G (sauf J01DC04 et J01DC07) | 1.8 | 0.1 | 7.0 | 0.0 | 271.7 |
| cefoxitine | 0.3 | 0.0 | 2.8 | 0.0 | 14.9 |
| cefuroxime | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 271.7 |
| cefamandole | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 |
| C3G (dont J01DC07 et J01DE) | 31.7 | 12.8 | 47.0 | 0.0 | 175.0 |
| C3G Orales (dont J01DC07) | 1.8 | 0.4 | 4.4 | 0.0 | 11.7 |
| cefixime | 1.8 | 0.4 | 4.4 | 0.0 | 11.7 |
| cefopodoxime | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 |
| cefotiam | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| C3G Injectables | 29.1 | 9.7 | 45.5 | 0.0 | 175.0 |
| C3G Inj. inactives sur P. aeruginosa | 22.7 | 9.5 | 39.0 | 0.0 | 174.7 |
| cefotaxime | 2.0 | 0.7 | 6.9 | 0.0 | 42.3 |
| ceftriaxone | 13.9 | 5.1 | 30.3 | 0.0 | 174.0 |
| C3G Inj. actives sur P. aeruginosa | 1.1 | 0.1 | 3.0 | 0.0 | 16.3 |
| ceftazidime | 0.8 | 0.1 | 1.7 | 0.0 | 13.0 |
| cefepime | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 15.5 |
| ceftazidimeavibactam | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 |
| ceftolozanetazobactam | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 |
| Autres céphalosporines | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 |
| ceftobiprole | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ceftaroline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 |
| ceftobiprole+ceftaroline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 |
| Penemes | 1.7 | 0.2 | 6.6 | 0.0 | 59.5 |
| ertapenem | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 3.9 |
| Penemes actives sur P. aeruginosa | 1.7 | 0.2 | 5.9 | 0.0 | 59.5 |
| imipenem | 1.7 | 0.2 | 4.3 | 0.0 | 58.6 |
| meropenem | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.2 |
| Monobactams (aztreonam) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 |
| Tetracyclines | 0.4 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 12.2 |
| demeclocycline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| doxycycline | 0.4 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 12.2 |

| Molécule | Médiane | P25 | P75 | Minimum | Maximum |
|---|---------|------|------|---------|---------|
| lymecycline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 |
| metacycline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| minocycline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.9 |
| tigecycline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| Sulfamides | 4.5 | 1.2 | 8.4 | 0.0 | 104.7 |
| cotrimoxazole | 4.5 | 1.2 | 7.7 | 0.0 | 104.7 |
| sulfadiazine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
| sulfamethizole | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| sulfafurazole (erythromycine+sulfafurazole) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| MLS | 17.3 | 10.4 | 24.9 | 0.0 | 47.0 |
| Macrolides | 5.7 | 1.4 | 12.4 | 0.0 | 35.9 |
| erythromycine seule | 2.6 | 0.4 | 4.4 | 0.0 | 9.7 |
| erythromycine (erythromycine+sulfafurazole) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| erythromycine | 2.6 | 0.4 | 4.4 | 0.0 | 9.7 |
| spiramycine seule | 0.2 | 0.0 | 3.3 | 0.0 | 31.9 |
| spiramycine (spiramycine+ métronidazole) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 |
| spiramycine | 0.2 | 0.0 | 3.3 | 0.0 | 31.9 |
| roxithromycine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.2 |
| josamycine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
| clarithromycine | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 18.2 |
| azithromycine | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 7.0 |
| midecamycine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| telithromycine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lincosamides | 3.9 | 1.8 | 7.7 | 0.0 | 29.1 |
| clindamycine | 3.4 | 1.5 | 7.4 | 0.0 | 29.1 |
| lincomycine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.7 |
| Streptogramines | 3.5 | 1.6 | 5.7 | 0.0 | 31.8 |
| pristinamycine | 3.5 | 1.6 | 5.7 | 0.0 | 31.8 |
| Aminosides | 17.6 | 7.9 | 28.4 | 0.0 | 121.4 |
| amikacine | 2.0 | 0.1 | 4.9 | 0.0 | 52.2 |
| gentamicine | 12.2 | 5.5 | 23.0 | 0.0 | 121.4 |
| tobramycine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 |
| streptomycine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

| Molécule | Médiane | P25 | P75 | Minimum | Maximum |
|--|---------|------|------|---------|---------|
| Quinolones | 50.3 | 30.9 | 68.6 | 1.0 | 405.8 |
| Quinolones 1 G | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| acide pipemidique | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| flumequine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Fluoroquinolones | 50.3 | 30.9 | 68.6 | 1.0 | 405.8 |
| Fluoroquinolones orales | 32.9 | 24.2 | 44.2 | 0.6 | 380.3 |
| Fluoroquinolones injectables | 13.8 | 4.4 | 23.9 | 0.0 | 67.8 |
| norfloxacin | 1.8 | 0.2 | 4.8 | 0.0 | 27.8 |
| enoxacin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| pefloxacin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 |
| ofloxacin | 19.3 | 6.6 | 32.0 | 0.0 | 96.5 |
| ciprofloxacin | 10.1 | 4.0 | 17.7 | 0.0 | 64.1 |
| levofloxacin | 4.3 | 1.2 | 12.9 | 0.0 | 372.3 |
| moxifloxacin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.7 |
| lomefloxacin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Phénicoles (thiamphenicol) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Glycopeptides | 5.5 | 1.8 | 10.3 | 0.0 | 46.2 |
| vancomycine | 5.4 | 1.8 | 10.0 | 0.0 | 46.2 |
| teicoplanine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.3 |
| Imidazoles | 16.4 | 8.0 | 29.4 | 0.0 | 103.2 |
| Imidazolés O | 5.1 | 2.3 | 8.0 | 0.0 | 32.6 |
| Imidazolés I | 10.3 | 4.4 | 22.3 | 0.0 | 70.6 |
| metronidazole seul | 16.4 | 8.0 | 29.2 | 0.0 | 103.2 |
| metronidazole (spiramycine+ metronidazole) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
| metronidazole | 16.4 | 8.0 | 29.4 | 0.0 | 103.2 |
| ornidazole | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 |
| tinidazole | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| "Autres ATB" (J01X + imidazoles oraux: P01AB) | 28.9 | 16.5 | 45.4 | 1.1 | 103.2 |
| J01X | 23.0 | 12.3 | 38.4 | 0.5 | 89.1 |
| acide fusidique | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.7 |
| fosfomycine | 0.1 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 7.6 |
| linezolid | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 15.0 |
| colistine | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 26.9 |

| Molécule | Médiane | P25 | P75 | Minimum | Maximum |
|---|---------|-------|-------|---------|---------|
| nitrofurantoïne | 0.5 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 11.5 |
| daptomycine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.2 |
| Antistaphylococciques | 5.9 | 2.0 | 11.2 | 0.0 | 61.3 |
| rifampicine | 3.0 | 0.0 | 6.3 | 0.0 | 31.2 |
| fidaxomicine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| Consommation antibactériens à usage systémique (J01) | 542.4 | 454.2 | 685.6 | 120.3 | 1191.2 |
| CONSOMMATION TOTALE | 552.5 | 460.2 | 710.9 | 123.7 | 1196.7 |

*Antistaphylococciques: glycopeptides, linézolide, daptomycine.

Consommations d'antibiotiques - Ensemble de l'établissement - Etablissements groupe 2
 (>33% et <=66% lits MCO) (N=23)
 (Réseau de surveillance des consommations 2016)

| Molécule | Médiane | P25 | P75 | Minimum | Maximum |
|--|---------|-------|-------|---------|---------|
| B-lactamines | 280.7 | 201.5 | 340.0 | 147.2 | 386.8 |
| Penicillines | 240.5 | 170.6 | 261.6 | 85.6 | 334.6 |
| Penicillines G | 0.2 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 8.2 |
| benzylpenicilline | 0.2 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 8.2 |
| benzathine benzylpenicilline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Penicilline V (phenoxyethylpenicilline) | 0.6 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | 13.6 |
| Penicillines M | 4.3 | 2.7 | 6.4 | 0.0 | 10.6 |
| cloxacilline | 4.3 | 2.3 | 6.4 | 0.0 | 10.6 |
| oxacilline | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 2.1 |
| Penicillines A | 74.6 | 48.0 | 94.4 | 0.0 | 129.1 |
| ampicilline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| amoxicilline | 74.6 | 48.0 | 94.4 | 0.0 | 129.1 |
| Penicillines + inhibiteur | 120.8 | 113.0 | 171.5 | 53.5 | 221.4 |
| penicillines A + inh. | 117.3 | 104.9 | 160.9 | 53.5 | 216.5 |
| amoxicilline ac clavulanique | 117.3 | 104.9 | 160.9 | 53.5 | 216.5 |
| ampicilline sulbactam | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ureido-penicilline + inh. (piperacilline tazobactam) | 5.6 | 3.7 | 10.6 | 0.0 | 28.5 |
| carboxypenicillines + inh. (ticarcilline ac clavulanique) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Aminido-penicilline (pivmecillinam) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
| Ureidopenicillines | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 1.2 |
| piperacilline | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 1.2 |
| Carboxypenicillines | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ticarcilline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| temocilline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Cephalosporines, Penemes, Monobactams | 52.2 | 36.4 | 77.5 | 19.3 | 96.2 |
| Cephalosporines | 48.3 | 31.4 | 75.1 | 18.6 | 95.1 |
| C1G+C2G | 6.7 | 0.2 | 10.5 | 0.0 | 73.2 |
| C1G (dont J01DC04) | 2.2 | 0.1 | 9.0 | 0.0 | 67.1 |
| cefalexine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| cefazoline | 2.2 | 0.1 | 9.0 | 0.0 | 67.1 |

| Molécule | Médiane | P25 | P75 | Minimum | Maximum |
|---|---------|------|------|---------|---------|
| cefadroxil | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| cefaclor | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| C2G (sauf J01DC04 et J01DC07) | 0.5 | 0.1 | 2.4 | 0.0 | 6.0 |
| cefoxitine | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 2.8 |
| cefuroxime | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 0.0 | 6.0 |
| cefamandole | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| C3G (dont J01DC07 et J01DE) | 39.5 | 28.6 | 51.6 | 4.3 | 70.1 |
| C3G Orales (dont J01DC07) | 2.6 | 0.7 | 4.8 | 0.0 | 18.6 |
| cefixime | 2.4 | 0.5 | 4.8 | 0.0 | 18.4 |
| cefopodoxime | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.7 |
| cefotiam | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| C3G Injectables | 35.7 | 26.2 | 51.1 | 4.3 | 61.6 |
| C3G Inj. inactives sur P. aeruginosa | 32.7 | 25.9 | 49.5 | 4.3 | 61.1 |
| cefotaxime | 5.6 | 3.4 | 11.4 | 0.1 | 18.2 |
| ceftriaxone | 25.1 | 19.5 | 37.7 | 3.4 | 56.1 |
| C3G Inj. actives sur P. aeruginosa | 1.1 | 0.4 | 2.9 | 0.0 | 7.6 |
| ceftazidime | 0.6 | 0.3 | 1.8 | 0.0 | 3.3 |
| cefepime | 0.1 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 5.6 |
| ceftazidimeavibactam | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| ceftolozanetazobactam | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Autres céphalosporines | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ceftobiprole | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ceftaroline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ceftobiprole+ceftaroline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Penemes | 3.1 | 0.7 | 4.0 | 0.0 | 6.7 |
| ertapenem | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 1.8 |
| Penemes actives sur P. aeruginosa | 2.8 | 0.7 | 3.8 | 0.0 | 6.7 |
| imipenem | 1.9 | 0.7 | 3.3 | 0.0 | 6.7 |
| meropenem | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.7 |
| Monobactams (aztreonam) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| Tetracyclines | 1.5 | 0.1 | 3.0 | 0.0 | 7.2 |
| demeclocycline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9 |
| doxycycline | 1.2 | 0.1 | 2.8 | 0.0 | 7.1 |

| Molécule | Médiane | P25 | P75 | Minimum | Maximum |
|---|---------|------|------|---------|---------|
| lymecycline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| metacycline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| minocycline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| tigecycline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| Sulfamides | 5.2 | 3.5 | 6.7 | 0.0 | 16.6 |
| cotrimoxazole | 5.2 | 3.5 | 6.5 | 0.0 | 16.6 |
| sulfadiazine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 |
| sulfamethizole | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| sulfafurazole (erythromycine+sulfafurazole) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| MLS | 17.9 | 12.9 | 22.9 | 0.0 | 29.4 |
| Macrolides | 10.5 | 5.0 | 14.2 | 0.0 | 19.4 |
| erythromycine seule | 1.0 | 0.1 | 1.7 | 0.0 | 8.1 |
| erythromycine (erythromycine+sulfafurazole) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| erythromycine | 1.0 | 0.1 | 1.7 | 0.0 | 8.1 |
| spiramycine seule | 3.9 | 2.0 | 6.0 | 0.0 | 14.9 |
| spiramycine (spiramycine+ métronidazole) | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.4 |
| spiramycine | 4.0 | 2.0 | 6.1 | 0.0 | 14.9 |
| roxithromycine | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 3.5 |
| josamycine | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 2.9 |
| clarithromycine | 0.7 | 0.1 | 1.1 | 0.0 | 3.5 |
| azithromycine | 1.0 | 0.2 | 2.5 | 0.0 | 5.0 |
| midecamycine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| telithromycine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| Lincosamides | 2.2 | 0.8 | 2.8 | 0.0 | 5.2 |
| clindamycine | 2.2 | 0.8 | 2.8 | 0.0 | 5.2 |
| lincomycine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Streptogramines | 5.8 | 3.1 | 7.7 | 0.0 | 9.1 |
| pristinamycine | 5.8 | 3.1 | 7.7 | 0.0 | 9.1 |
| Aminosides | 7.9 | 3.6 | 11.5 | 0.0 | 25.2 |
| amikacine | 1.8 | 0.7 | 3.5 | 0.0 | 14.6 |
| gentamicine | 4.4 | 1.9 | 9.9 | 0.0 | 18.4 |
| tobramycine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
| streptomycine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

| Molécule | Médiane | P25 | P75 | Minimum | Maximum |
|--|---------|------|------|---------|---------|
| Quinolones | 34.9 | 24.8 | 38.9 | 6.3 | 46.9 |
| Quinolones 1 G | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| acide pipemidique | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| flumequine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Fluoroquinolones | 34.9 | 24.8 | 38.9 | 6.3 | 46.9 |
| Fluoroquinolones orales | 26.4 | 18.5 | 30.0 | 0.0 | 34.6 |
| Fluoroquinolones injectables | 6.3 | 4.3 | 9.2 | 1.4 | 20.0 |
| norfloxacin | 1.3 | 0.6 | 2.6 | 0.0 | 6.9 |
| enoxacin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| pefloxacin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ofloxacin | 15.2 | 9.4 | 20.3 | 0.0 | 26.3 |
| ciprofloxacin | 6.6 | 5.5 | 11.2 | 2.4 | 20.0 |
| levofloxacin | 4.5 | 3.0 | 9.1 | 0.0 | 21.5 |
| moxifloxacin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 |
| lomefloxacin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Phénicoles (thiamphenicol) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Glycopeptides | 1.9 | 1.2 | 3.9 | 0.0 | 9.3 |
| vancomycine | 1.9 | 1.0 | 3.9 | 0.0 | 9.0 |
| teicoplanine | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.8 |
| Imidazoles | 15.3 | 9.0 | 26.6 | 0.0 | 63.7 |
| Imidazolés O | 4.9 | 0.0 | 8.2 | 0.0 | 10.1 |
| Imidazolés I | 11.5 | 5.6 | 21.5 | 0.0 | 55.4 |
| metronidazole seul | 15.3 | 8.7 | 26.6 | 0.0 | 63.7 |
| metronidazole (spiramycine+ metronidazole) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| metronidazole | 15.3 | 8.7 | 26.6 | 0.0 | 63.7 |
| ornidazole | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.3 |
| tinidazole | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
| "Autres ATB" (J01X + imidazoles oraux: P01AB) | 22.4 | 11.2 | 37.1 | 3.8 | 66.2 |
| J01X | 14.9 | 11.2 | 30.5 | 3.8 | 58.0 |
| acide fusidique | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.5 |
| fosfomycine | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 5.8 |
| linezolid | 0.1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.2 |
| colistine | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 3.5 |

| Molécule | Médiane | P25 | P75 | Minimum | Maximum |
|---|---------|-------|-------|---------|---------|
| nitrofurantoïne | 0.6 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 5.4 |
| daptomycine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 |
| Antistaphylococciques | 2.9 | 1.2 | 5.0 | 0.0 | 12.6 |
| rifampicine | 5.5 | 1.1 | 6.8 | 0.0 | 9.7 |
| fidaxomicine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| Consommation antibactériens à usage systémique (J01) | 370.4 | 266.9 | 464.8 | 157.3 | 495.7 |
| CONSOMMATION TOTALE | 384.8 | 274.3 | 472.2 | 157.3 | 506.1 |

*Antistaphylococciques: glycopeptides, linézolide, daptomycine.

Consommations d'antibiotiques - Ensemble de l'établissement - Etablissements groupe 3 (>66% lits MCO) (N=81)

(Réseau de surveillance des consommations 2016)

| Molécule | Médiane | P25 | P75 | Minimum | Maximum |
|--|---------|------|-------|---------|---------|
| B-lactamines | 98.6 | 73.0 | 133.3 | 13.8 | 279.4 |
| Penicillines | 89.7 | 62.3 | 123.9 | 13.3 | 256.6 |
| Penicillines G | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.4 |
| benzylpenicilline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.4 |
| benzathine benzylpenicilline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| Penicilline V (phenoxyethylpenicilline) | 0.3 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 41.4 |
| Penicillines M | 0.7 | 0.1 | 1.8 | 0.0 | 17.3 |
| cloxacilline | 0.5 | 0.1 | 1.6 | 0.0 | 17.3 |
| oxacilline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| Penicillines A | 34.5 | 21.6 | 48.8 | 4.6 | 108.7 |
| ampicilline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.7 |
| amoxicilline | 34.5 | 21.6 | 48.8 | 4.6 | 108.7 |
| Penicillines + inhibiteur | 50.4 | 27.9 | 69.8 | 2.0 | 181.3 |
| penicillines A + inh. | 50.1 | 27.6 | 66.7 | 2.0 | 172.4 |
| amoxicilline ac clavulanique | 50.1 | 27.6 | 66.7 | 2.0 | 172.4 |
| ampicilline sulbactam | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ureido-penicilline + inh. (piperacilline tazobactam) | 0.5 | 0.0 | 2.9 | 0.0 | 24.1 |
| carboxypenicillines + inh. (ticarcilline ac clavulanique) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| Aminido-penicilline (pivmecillinam) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| Ureidopenicillines | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 |
| piperacilline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 |
| Carboxypenicillines | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
| ticarcilline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| temocilline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
| Cephalosporines, Penemes, Monobactams | 11.1 | 5.8 | 18.5 | 0.4 | 46.5 |
| Cephalosporines | 9.4 | 4.7 | 17.0 | 0.4 | 39.2 |
| C1G+C2G | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 5.9 |
| C1G (dont J01DC04) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.9 |
| cefalexine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 |
| cefazoline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.9 |

| Molécule | Médiane | P25 | P75 | Minimum | Maximum |
|---|---------|-----|------|---------|---------|
| cefadroxil | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| cefaclor | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
| C2G (sauf J01DC04 et J01DC07) | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 2.2 |
| cefoxitine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 |
| cefuroxime | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 |
| cefamandole | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| C3G (dont J01DC07 et J01DE) | 9.3 | 4.7 | 16.8 | 0.2 | 39.0 |
| C3G Orales (dont J01DC07) | 1.4 | 0.5 | 3.3 | 0.0 | 18.4 |
| cefixime | 1.3 | 0.5 | 3.0 | 0.0 | 18.4 |
| cefopodoxime | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.2 |
| cefotiam | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| C3G Injectables | 5.8 | 2.0 | 14.4 | 0.0 | 37.8 |
| C3G Inj. inactives sur P. aeruginosa | 4.7 | 1.7 | 11.4 | 0.0 | 36.6 |
| cefotaxime | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 9.2 |
| ceftriaxone | 4.3 | 1.4 | 9.1 | 0.0 | 33.3 |
| C3G Inj. actives sur P. aeruginosa | 0.4 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 7.6 |
| ceftazidime | 0.1 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 5.3 |
| cefepime | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 7.3 |
| ceftazidimeavibactam | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| ceftolozanetazobactam | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.3 |
| Autres céphalosporines | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ceftobiprole | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ceftaroline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ceftobiprole+ceftaroline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Penemes | 0.5 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 21.3 |
| ertapenem | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 2.9 |
| Penemes actives sur P. aeruginosa | 0.5 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 18.5 |
| imipenem | 0.3 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 17.6 |
| meropenem | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
| Monobactams (aztreonam) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| Tetracyclines | 1.5 | 0.0 | 4.4 | 0.0 | 47.1 |
| demeclocycline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 |
| doxycycline | 1.2 | 0.0 | 4.3 | 0.0 | 34.6 |

| Molécule | Médiane | P25 | P75 | Minimum | Maximum |
|---|---------|-----|------|---------|---------|
| lymecycline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.4 |
| metacycline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| minocycline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 |
| tigecycline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| Sulfamides | 4.4 | 2.2 | 10.1 | 0.0 | 65.6 |
| cotrimoxazole | 4.4 | 2.2 | 10.1 | 0.0 | 57.4 |
| sulfadiazine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.3 |
| sulfamethizole | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| sulfafurazole (erythromycine+sulfafurazole) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| MLS | 8.3 | 4.7 | 13.6 | 1.2 | 52.2 |
| Macrolides | 2.4 | 1.2 | 4.5 | 0.0 | 38.8 |
| erythromycine seule | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 2.3 |
| erythromycine (erythromycine+sulfafurazole) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| erythromycine | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 2.3 |
| spiramycine seule | 0.3 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 8.6 |
| spiramycine (spiramycine+ métronidazole) | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.9 |
| spiramycine | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 0.0 | 8.7 |
| roxithromycine | 0.1 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 5.2 |
| josamycine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.2 |
| clarithromycine | 0.4 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 24.7 |
| azithromycine | 0.4 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 27.1 |
| midecamycine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| telithromycine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| Lincosamides | 0.8 | 0.0 | 2.7 | 0.0 | 14.5 |
| clindamycine | 0.8 | 0.0 | 2.7 | 0.0 | 14.5 |
| lincomycine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Streptogramines | 2.8 | 1.7 | 4.6 | 0.1 | 16.3 |
| pristinamycine | 2.8 | 1.7 | 4.6 | 0.1 | 16.3 |
| Aminosides | 0.5 | 0.1 | 1.6 | 0.0 | 19.4 |
| amikacine | 0.2 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 19.4 |
| gentamicine | 0.1 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 4.0 |
| tobramycine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.6 |
| streptomycine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

| Molécule | Médiane | P25 | P75 | Minimum | Maximum |
|--|---------|------|------|---------|---------|
| Quinolones | 21.3 | 13.3 | 31.4 | 0.0 | 62.6 |
| Quinolones 1 G | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| acide pipemidique | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| flumequine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Fluoroquinolones | 21.3 | 13.3 | 31.4 | 0.0 | 62.6 |
| Fluoroquinolones orales | 19.9 | 11.8 | 27.9 | 0.0 | 56.7 |
| Fluoroquinolones injectables | 0.5 | 0.0 | 1.9 | 0.0 | 16.8 |
| norfloxacin | 0.8 | 0.2 | 1.8 | 0.0 | 17.2 |
| enoxacin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| pefloxacin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
| ofloxacin | 6.8 | 4.5 | 10.4 | 0.0 | 25.8 |
| ciprofloxacin | 5.7 | 2.9 | 10.4 | 0.0 | 35.1 |
| levofloxacin | 4.0 | 1.3 | 7.2 | 0.0 | 22.1 |
| moxifloxacin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.3 |
| lomefloxacin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| Phénicoles (thiamphenicol) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Glycopeptides | 0.4 | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 10.1 |
| vancomycine | 0.3 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 10.1 |
| teicoplanine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.8 |
| Imidazoles | 2.1 | 0.7 | 6.6 | 0.0 | 19.6 |
| Imidazolés O | 1.8 | 0.3 | 4.1 | 0.0 | 15.2 |
| Imidazolés I | 0.4 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 9.7 |
| metronidazole seul | 2.1 | 0.6 | 6.6 | 0.0 | 19.6 |
| metronidazole (spiramycine+ metronidazole) | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.5 |
| metronidazole | 2.1 | 0.7 | 6.6 | 0.0 | 19.6 |
| ornidazole | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| tinidazole | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| "Autres ATB" (J01X + imidazoles oraux: P01AB) | 8.6 | 4.3 | 12.6 | 0.0 | 33.1 |
| J01X | 5.8 | 2.9 | 9.3 | 0.0 | 24.8 |
| acide fusidique | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 20.9 |
| fosfomycine | 0.2 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 3.4 |
| linezolid | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 9.5 |
| colistine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.5 |

| Molécule | Médiane | P25 | P75 | Minimum | Maximum |
|---|---------|-------|-------|---------|---------|
| nitrofurantoïne | 1.4 | 0.3 | 3.3 | 0.0 | 10.1 |
| daptomycine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.5 |
| Antistaphylococciques | 0.6 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 16.7 |
| rifampicine | 2.8 | 0.1 | 8.6 | 0.0 | 48.4 |
| fidaxomicine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 |
| Consommation antibactériens à usage systémique (J01) | 144.3 | 116.1 | 193.3 | 41.3 | 469.0 |
| CONSOMMATION TOTALE | 152.0 | 122.3 | 202.9 | 42.6 | 508.3 |

*Antistaphylococciques: glycopeptides, linézolide, daptomycine.

Consommations d'antibiotiques - Services de médecine (N=81)

(Réseau de surveillance des consommations 2016)

| Molécule | Médiane | P25 | P75 | Minimum | Maximum |
|--|---------|-------|-------|---------|---------|
| B-lactamines | 423.2 | 323.1 | 504.9 | 75.1 | 950.0 |
| Penicillines | 345.2 | 236.1 | 425.3 | 35.7 | 773.2 |
| Penicillines G | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 4.8 |
| benzylpenicilline | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 4.8 |
| benzathine benzylpenicilline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| Penicilline V (phenoxyethylpenicilline) | 0.4 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 30.3 |
| Penicillines M | 5.5 | 2.1 | 12.8 | 0.0 | 53.2 |
| cloxacilline | 4.3 | 1.4 | 10.4 | 0.0 | 30.6 |
| oxacilline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.8 |
| Penicillines A | 94.5 | 61.5 | 130.8 | 0.0 | 323.5 |
| ampicilline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| amoxicilline | 94.5 | 61.5 | 130.8 | 0.0 | 323.5 |
| Penicillines + inhibiteur | 223.1 | 158.8 | 277.1 | 24.7 | 648.7 |
| penicillines A + inh. | 203.9 | 134.4 | 265.5 | 24.7 | 646.4 |
| amoxicilline ac clavulanique | 203.9 | 134.4 | 265.5 | 24.7 | 646.4 |
| ampicilline sulbactam | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ureido-penicilline + inh. (piperacilline tazobactam) | 11.6 | 3.6 | 19.8 | 0.0 | 112.5 |
| carboxypenicillines + inh. (ticarcilline ac clavulanique) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
| Aminido-penicilline (pivmecillinam) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 |
| Ureidopenicillines | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 6.3 |
| piperacilline | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 6.3 |
| Carboxypenicillines | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 |
| ticarcilline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| temocilline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 |
| Cephalosporines, Penemes, Monobactams | 66.6 | 48.8 | 89.6 | 7.3 | 283.9 |
| Cephalosporines | 59.1 | 46.4 | 82.8 | 7.3 | 278.1 |
| C1G+C2G | 1.6 | 0.0 | 6.2 | 0.0 | 191.5 |
| C1G (dont J01DC04) | 1.1 | 0.0 | 4.2 | 0.0 | 86.1 |
| cefalexine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| cefazoline | 1.1 | 0.0 | 4.2 | 0.0 | 86.1 |
| cefadroxil | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

| Molécule | Médiane | P25 | P75 | Minimum | Maximum |
|---|---------|------|------|---------|---------|
| cefaclor | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| C2G (sauf J01DC04 et J01DC07) | 0.2 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 105.4 |
| cefoxitine | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 92.4 |
| cefuroxime | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 |
| cefamandole | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 |
| C3G (dont J01DC07 et J01DE) | 54.0 | 41.2 | 78.2 | 6.2 | 278.1 |
| C3G Orales (dont J01DC07) | 2.1 | 0.6 | 3.7 | 0.0 | 28.1 |
| cefixime | 1.9 | 0.5 | 3.7 | 0.0 | 28.1 |
| cefpodoxime | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 |
| cefotiam | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| C3G Injectables | 53.8 | 39.7 | 72.7 | 5.5 | 278.1 |
| C3G Inj. inactives sur P. aeruginosa | 47.6 | 32.9 | 61.5 | 5.3 | 277.7 |
| cefotaxime | 6.4 | 1.1 | 13.0 | 0.0 | 89.4 |
| ceftriaxone | 37.7 | 23.3 | 54.4 | 3.3 | 277.1 |
| C3G Inj. actives sur P. aeruginosa | 2.3 | 0.8 | 7.5 | 0.0 | 43.9 |
| ceftazidime | 1.5 | 0.4 | 3.3 | 0.0 | 32.8 |
| cefepime | 0.4 | 0.0 | 2.7 | 0.0 | 26.9 |
| ceftazidimeavibactam | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ceftolozanetazobactam | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 |
| Autres céphalosporines | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| ceftobiprole | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| ceftaroline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| ceftobiprole+ceftaroline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 |
| Penemes | 4.1 | 1.6 | 8.2 | 0.0 | 72.4 |
| ertapenem | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 4.8 |
| Penemes actives sur P. aeruginosa | 3.3 | 1.3 | 7.3 | 0.0 | 70.8 |
| imipenem | 2.8 | 1.3 | 5.4 | 0.0 | 50.3 |
| meropenem | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 46.4 |
| Monobactams (aztreonam) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.4 |
| Tetracyclines | 0.7 | 0.0 | 4.8 | 0.0 | 30.5 |
| demeclocycline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.3 |
| doxycycline | 0.4 | 0.0 | 4.4 | 0.0 | 30.4 |
| lymecycline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 |

| Molécule | Médiane | P25 | P75 | Minimum | Maximum |
|---|---------|------|------|---------|---------|
| metacycline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| minocycline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.6 |
| tigecycline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 |
| Sulfamides | 6.4 | 3.5 | 13.4 | 0.0 | 77.9 |
| cotrimoxazole | 6.3 | 3.5 | 12.6 | 0.0 | 77.9 |
| sulfadiazine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.3 |
| sulfamethizole | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| sulfafurazole (erythromycine+sulfafurazole) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| MLS | 23.7 | 12.7 | 38.1 | 0.0 | 73.5 |
| Macrolides | 14.4 | 6.9 | 22.8 | 0.0 | 63.4 |
| erythromycine seule | 0.6 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 11.5 |
| erythromycine (erythromycine+sulfafurazole) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| erythromycine | 0.6 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 11.5 |
| spiramycine seule | 6.2 | 1.6 | 13.9 | 0.0 | 54.2 |
| spiramycine (spiramycine+ métronidazole) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 |
| spiramycine | 6.3 | 1.7 | 13.9 | 0.0 | 54.2 |
| roxithromycine | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 21.1 |
| josamycine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 |
| clarithromycine | 0.7 | 0.0 | 2.9 | 0.0 | 10.7 |
| azithromycine | 1.1 | 0.1 | 3.0 | 0.0 | 43.1 |
| midecamycine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| telithromycine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 |
| Lincosamides | 1.8 | 0.4 | 4.1 | 0.0 | 50.5 |
| clindamycine | 1.8 | 0.4 | 4.1 | 0.0 | 50.5 |
| lincomycine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 |
| Streptogramines | 5.7 | 3.3 | 9.9 | 0.0 | 28.8 |
| pristinamycine | 5.7 | 3.3 | 9.9 | 0.0 | 28.8 |
| Aminosides | 7.4 | 4.1 | 12.8 | 0.0 | 50.3 |
| amikacine | 2.6 | 1.1 | 5.0 | 0.0 | 12.5 |
| gentamicine | 4.0 | 1.7 | 6.9 | 0.0 | 25.4 |
| tobramycine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39.1 |
| streptomycine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Quinolones | 45.9 | 27.8 | 63.9 | 3.3 | 126.5 |

| Molécule | Médiane | P25 | P75 | Minimum | Maximum |
|--|---------|------|------|---------|---------|
| Quinolones 1 G | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| acide pipemidique | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| flumequine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Fluoroquinolones | 45.9 | 27.8 | 63.9 | 3.3 | 126.5 |
| Fluoroquinolones orales | 33.1 | 21.6 | 45.9 | 0.0 | 102.2 |
| Fluoroquinolones injectables | 7.2 | 3.3 | 15.5 | 0.0 | 92.5 |
| norfloxacin | 1.3 | 0.3 | 2.8 | 0.0 | 15.2 |
| enoxacin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| pefloxacin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| ofloxacin | 15.6 | 9.3 | 27.4 | 0.0 | 105.5 |
| ciprofloxacin | 12.0 | 4.3 | 18.4 | 1.2 | 88.5 |
| levofloxacin | 7.6 | 2.1 | 12.5 | 0.0 | 53.3 |
| moxifloxacin | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 10.2 |
| lomefloxacin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Phénicoles (thiamphenicol) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Glycopeptides | 3.4 | 1.0 | 6.3 | 0.0 | 76.5 |
| vancomycine | 2.9 | 1.0 | 5.9 | 0.0 | 72.8 |
| teicoplanine | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 8.8 |
| Imidazoles | 20.3 | 11.5 | 28.7 | 0.0 | 158.9 |
| Imidazolés O | 7.4 | 1.3 | 11.9 | 0.0 | 36.6 |
| Imidazolés I | 11.7 | 6.5 | 20.2 | 0.0 | 133.4 |
| metronidazole seul | 19.6 | 11.2 | 28.7 | 0.0 | 158.9 |
| metronidazole (spiramycine+ metronidazole) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 |
| metronidazole | 19.6 | 11.2 | 28.7 | 0.0 | 158.9 |
| ornidazole | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.0 |
| tinidazole | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 |
| "Autres ATB" (J01X + imidazoles oraux: P01AB) | 30.0 | 19.0 | 47.9 | 1.9 | 161.7 |
| J01X | 23.9 | 11.8 | 38.5 | 1.7 | 135.3 |
| acide fusidique | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 |
| fosfomycine | 0.3 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 7.6 |
| linezolid | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 10.1 |
| colistine | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 47.1 |
| nitrofurantoïne | 0.8 | 0.2 | 1.6 | 0.0 | 10.9 |

| Molécule | Médiane | P25 | P75 | Minimum | Maximum |
|---|---------|-------|-------|---------|---------|
| daptomycine | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 28.8 |
| Antistaphylococciques | 4.8 | 1.3 | 8.4 | 0.0 | 88.9 |
| rifampicine | 3.2 | 0.0 | 7.8 | 0.0 | 81.6 |
| fidaxomicine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 |
| Consommation antibactériens à usage systémique (J01) | 535.9 | 431.8 | 683.7 | 104.8 | 1199.2 |
| CONSOMMATION TOTALE | 549.7 | 435.6 | 695.8 | 105.3 | 1199.2 |

*Antistaphylococcique: glycopeptides, linézolide, daptomycine.

Consommations d'antibiotiques - Services de réanimation (N=38)

(Réseau de surveillance des consommations 2016)

| Molécule | Médiane | P25 | P75 | Minimum | Maximum |
|--|---------|-------|-------|---------|---------|
| B-lactamines | 862.2 | 736.5 | 987.8 | 330.2 | 1674.8 |
| Penicillines | 537.2 | 425.4 | 675.1 | 221.6 | 1001.3 |
| Penicillines G | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.3 |
| benzylpenicilline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.3 |
| benzathine benzylpenicilline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Penicilline V (phenoxyethylpenicilline) | 0.6 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 11.2 |
| Penicillines M | 26.5 | 14.8 | 46.9 | 0.0 | 84.5 |
| cloxacilline | 25.3 | 11.9 | 44.2 | 0.0 | 84.5 |
| oxacilline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38.5 |
| Penicillines A | 191.7 | 129.4 | 265.1 | 0.0 | 557.7 |
| ampicilline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| amoxicilline | 191.7 | 129.4 | 265.1 | 0.0 | 557.7 |
| Penicillines + inhibiteur | 325.5 | 221.6 | 366.8 | 124.0 | 532.4 |
| penicillines A + inh. | 204.4 | 116.0 | 277.9 | 33.8 | 416.0 |
| amoxicilline ac clavulanique | 204.4 | 116.0 | 277.9 | 33.8 | 416.0 |
| ampicilline sulbactam | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ureido-penicilline + inh. (piperacilline tazobactam) | 97.6 | 76.4 | 132.0 | 13.4 | 253.8 |
| carboxypenicillines + inh. (ticarcilline ac clavulanique) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.4 |
| Aminido-penicilline (pivmecillinam) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.2 |
| Ureidopenicillines | 11.0 | 3.0 | 17.7 | 0.0 | 30.6 |
| piperacilline | 11.0 | 3.0 | 17.7 | 0.0 | 30.6 |
| Carboxypenicillines | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 30.8 |
| ticarcilline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| temocilline | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 30.8 |
| Cephalosporines, Penemes, Monobactams | 304.6 | 235.7 | 390.8 | 108.7 | 925.9 |
| Cephalosporines | 213.3 | 161.4 | 271.3 | 63.7 | 792.9 |
| C1G+C2G | 9.5 | 1.5 | 18.6 | 0.0 | 566.0 |
| C1G (dont J01DC04) | 8.4 | 0.2 | 18.1 | 0.0 | 517.2 |
| cefalexine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| cefazoline | 8.4 | 0.2 | 18.1 | 0.0 | 517.2 |
| cefadroxil | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

| Molécule | Médiane | P25 | P75 | Minimum | Maximum |
|---|---------|-------|-------|---------|---------|
| cefaclor | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| C2G (sauf J01DC04 et J01DC07) | 0.3 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 78.6 |
| cefoxitine | 0.3 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 54.7 |
| cefuroxime | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 53.2 |
| cefamandole | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.9 |
| C3G (dont J01DC07 et J01DE) | 183.3 | 153.0 | 237.6 | 59.4 | 364.8 |
| C3G Orales (dont J01DC07) | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 4.8 |
| cefixime | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 4.8 |
| cefpodoxime | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| cefotiam | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| C3G Injectables | 182.9 | 153.0 | 237.6 | 58.6 | 364.8 |
| C3G Inj. inactives sur P. aeruginosa | 126.4 | 83.7 | 162.0 | 39.5 | 227.4 |
| cefotaxime | 64.1 | 31.5 | 108.2 | 0.0 | 210.0 |
| ceftriaxone | 34.3 | 11.3 | 80.1 | 1.2 | 208.5 |
| C3G Inj. actives sur P. aeruginosa | 51.9 | 32.9 | 94.7 | 0.0 | 189.5 |
| ceftazidime | 16.2 | 10.3 | 22.6 | 0.0 | 56.7 |
| cefepime | 39.8 | 16.0 | 63.5 | 0.0 | 172.9 |
| ceftazidimeavibactam | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
| ceftolozanetazobactam | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.4 |
| Autres céphalosporines | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 |
| ceftobiprole | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.5 |
| ceftaroline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 |
| ceftobiprole+ceftaroline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.6 |
| Penemes | 64.1 | 37.0 | 124.1 | 11.0 | 237.9 |
| ertapenem | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 33.5 |
| Penemes actives sur P. aeruginosa | 62.8 | 36.6 | 124.1 | 11.0 | 226.1 |
| imipenem | 38.0 | 19.7 | 53.0 | 5.4 | 198.1 |
| meropenem | 14.0 | 0.0 | 45.7 | 0.0 | 157.6 |
| Monobactams (aztreonam) | 1.6 | 0.0 | 3.7 | 0.0 | 10.5 |
| Tetracyclines | 3.5 | 0.0 | 7.4 | 0.0 | 48.7 |
| demeclocycline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| doxycycline | 0.7 | 0.0 | 6.4 | 0.0 | 40.2 |
| lymecycline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

| Molécule | Médiane | P25 | P75 | Minimum | Maximum |
|---|---------|------|-------|---------|---------|
| metacycline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| minocycline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| tigecycline | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 18.4 |
| Sulfamides | 35.2 | 24.3 | 56.8 | 0.0 | 267.7 |
| cotrimoxazole | 34.1 | 23.6 | 51.9 | 0.0 | 267.7 |
| sulfadiazine | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 20.8 |
| sulfamethizole | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| sulfafurazole (erythromycine+sulfafurazole) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| MLS | 74.2 | 62.8 | 105.4 | 0.0 | 170.8 |
| Macrolides | 63.3 | 44.3 | 82.2 | 0.0 | 156.3 |
| erythromycine seule | 28.3 | 18.8 | 56.5 | 0.0 | 120.3 |
| erythromycine (erythromycine+sulfafurazole) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| erythromycine | 28.3 | 18.8 | 56.5 | 0.0 | 120.3 |
| spiramycine seule | 23.5 | 8.5 | 36.4 | 0.0 | 73.4 |
| spiramycine (spiramycine+ métronidazole) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| spiramycine | 23.5 | 8.5 | 36.4 | 0.0 | 73.4 |
| roxithromycine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.8 |
| josamycine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 |
| clarithromycine | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 0.0 | 15.6 |
| azithromycine | 0.9 | 0.0 | 4.9 | 0.0 | 31.1 |
| midecamycine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| telithromycine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lincosamides | 7.2 | 3.0 | 13.7 | 0.0 | 70.7 |
| clindamycine | 7.2 | 3.0 | 13.7 | 0.0 | 70.7 |
| lincomycine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Streptogramines | 1.2 | 0.1 | 4.5 | 0.0 | 14.6 |
| pristinamycine | 1.2 | 0.1 | 4.5 | 0.0 | 14.6 |
| Aminosides | 88.5 | 67.4 | 112.5 | 0.0 | 520.6 |
| amikacine | 59.8 | 39.9 | 75.1 | 0.0 | 463.9 |
| gentamicine | 23.7 | 13.5 | 38.4 | 0.0 | 111.8 |
| tobramycine | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 0.0 | 68.7 |
| streptomycine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
| Quinolones | 80.7 | 53.0 | 108.1 | 13.1 | 279.2 |

| Molécule | Médiane | P25 | P75 | Minimum | Maximum |
|--|---------|------|-------|---------|---------|
| Quinolones 1 G | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| acide pipemidique | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| flumequine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Fluoroquinolones | 80.7 | 53.0 | 108.1 | 13.1 | 279.2 |
| Fluoroquinolones orales | 25.7 | 15.4 | 38.2 | 0.0 | 91.8 |
| Fluoroquinolones injectables | 43.3 | 28.2 | 76.6 | 12.3 | 228.1 |
| norfloxacin | 0.7 | 0.0 | 4.8 | 0.0 | 17.9 |
| enoxacin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| pefloxacin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
| ofloxacin | 14.0 | 6.9 | 22.2 | 0.0 | 70.4 |
| ciprofloxacin | 31.2 | 22.0 | 50.3 | 6.3 | 184.0 |
| levofloxacin | 19.7 | 11.8 | 32.3 | 0.0 | 116.3 |
| moxifloxacin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
| lomefloxacin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Phenicoles (thiamphenicol) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Glycopeptides | 31.2 | 22.1 | 57.8 | 0.0 | 165.0 |
| vancomycine | 27.8 | 21.6 | 57.8 | 0.0 | 165.0 |
| teicoplanine | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 15.9 |
| Imidazoles | 56.7 | 38.7 | 77.2 | 0.0 | 116.1 |
| Imidazolés O | 6.7 | 0.0 | 11.5 | 0.0 | 59.0 |
| Imidazolés I | 46.9 | 29.0 | 62.1 | 0.0 | 104.6 |
| metronidazole seul | 46.7 | 28.2 | 67.9 | 0.0 | 112.1 |
| metronidazole (spiramycine+ metronidazole) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| metronidazole | 46.7 | 28.2 | 67.9 | 0.0 | 112.1 |
| ornidazole | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 98.4 |
| tinidazole | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 |
| "Autres ATB" (J01X + imidazoles oraux: P01AB) | 158.3 | 97.5 | 208.4 | 19.2 | 437.5 |
| J01X | 155.2 | 96.2 | 190.3 | 19.2 | 425.9 |
| acide fusidique | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 |
| fosfomycine | 2.5 | 0.1 | 4.4 | 0.0 | 12.9 |
| linezolid | 12.1 | 2.1 | 26.7 | 0.0 | 166.1 |
| colistine | 12.9 | 2.3 | 43.3 | 0.0 | 149.7 |
| nitrofurantoïne | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.7 |

| Molécule | Médiane | P25 | P75 | Minimum | Maximum |
|---|---------|--------|--------|---------|---------|
| daptomycine | 0.7 | 0.0 | 10.2 | 0.0 | 52.6 |
| Antistaphylococciques | 66.2 | 35.4 | 102.2 | 0.0 | 220.2 |
| rifampicine | 15.2 | 4.4 | 26.5 | 0.0 | 71.3 |
| fidaxomicine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.1 |
| Consommation antibactériens à usage systémique (J01) | 1350.1 | 1109.5 | 1509.3 | 381.0 | 2701.3 |
| CONSOMMATION TOTALE | 1382.1 | 1125.1 | 1552.8 | 381.0 | 2771.9 |

*Antistaphylococcique: glycopeptides, linézolide, daptomycine.

Consommations d'antibiotiques - Services de pédiatrie (N=33)
(Réseau de surveillance des consommations 2016)

| Molécule | Médiane | P25 | P75 | Minimum | Maximum |
|--|----------------|------------|------------|----------------|----------------|
| B-lactamines | 242.5 | 147.5 | 328.8 | 34.4 | 495.9 |
| Penicillines | 194.2 | 110.4 | 250.8 | 28.2 | 390.9 |
| Penicillines G | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 |
| benzylpenicilline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 |
| benzathine benzylpenicilline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Penicilline V (phenoxyethylpenicilline) | 4.5 | 1.4 | 9.7 | 0.0 | 25.7 |
| Penicillines M | 0.9 | 0.0 | 4.9 | 0.0 | 22.3 |
| cloxacilline | 0.5 | 0.0 | 3.9 | 0.0 | 22.3 |
| oxacilline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.4 |
| Penicillines A | 116.2 | 77.5 | 152.3 | 13.0 | 341.6 |
| ampicilline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| amoxicilline | 116.2 | 77.5 | 152.3 | 13.0 | 341.6 |
| Penicillines + inhibiteur | 62.2 | 21.2 | 96.2 | 0.0 | 163.4 |
| penicillines A + inh. | 55.9 | 20.6 | 81.2 | 0.0 | 158.6 |
| amoxicilline ac clavulanique | 55.9 | 20.6 | 81.2 | 0.0 | 158.6 |
| ampicilline sulbactam | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ureido-penicilline + inh. (piperacilline tazobactam) | 2.8 | 0.0 | 7.3 | 0.0 | 78.4 |
| carboxypenicillines + inh. (ticarcilline ac clavulanique) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
| Aminido-penicilline (pivmecillinam) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| Ureidopenicillines | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 |
| piperacilline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 |
| Carboxypenicillines | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 |
| ticarcilline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| temocilline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 |
| Cephalosporines, Penemes, Monobactams | 46.1 | 33.9 | 66.0 | 6.2 | 105.0 |
| Cephalosporines | 43.5 | 30.3 | 63.6 | 5.0 | 104.3 |
| C1G+C2G | 0.5 | 0.0 | 2.7 | 0.0 | 17.8 |
| C1G (dont J01DC04) | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 17.8 |
| cefalexine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| cefazoline | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 17.8 |
| cefadroxil | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |

| Molécule | Médiane | P25 | P75 | Minimum | Maximum |
|---|---------|------|------|---------|---------|
| cefaclor | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 |
| C2G (sauf J01DC04 et J01DC07) | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 4.6 |
| cefoxitine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| cefuroxime | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.4 |
| cefamandole | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 4.5 |
| C3G (dont J01DC07 et J01DE) | 39.9 | 30.3 | 61.4 | 5.0 | 99.4 |
| C3G Orales (dont J01DC07) | 1.3 | 0.0 | 2.7 | 0.0 | 9.2 |
| cefixime | 0.7 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 9.2 |
| cefpodoxime | 0.2 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.4 |
| cefotiam | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| C3G Injectables | 37.6 | 30.3 | 57.5 | 5.0 | 96.1 |
| C3G Inj. inactives sur P. aeruginosa | 34.6 | 24.9 | 45.7 | 5.0 | 94.6 |
| cefotaxime | 18.8 | 14.2 | 35.1 | 1.9 | 79.6 |
| ceftriaxone | 12.4 | 5.2 | 26.8 | 0.0 | 60.9 |
| C3G Inj. actives sur P. aeruginosa | 0.4 | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 24.5 |
| ceftazidime | 0.1 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 14.6 |
| cefepime | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 19.6 |
| ceftazidimeavibactam | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ceftolozanetazobactam | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
| Autres céphalosporines | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ceftobiprole | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ceftaroline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ceftobiprole+ceftaroline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Penemes | 1.2 | 0.0 | 3.6 | 0.0 | 22.9 |
| ertapenem | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 |
| Penemes actives sur P. aeruginosa | 0.8 | 0.0 | 3.4 | 0.0 | 22.9 |
| imipenem | 0.2 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 22.9 |
| meropenem | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 22.9 |
| Monobactams (aztreonam) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 |
| Tetracyclines | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 10.5 |
| demeclocycline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| doxycycline | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 10.5 |
| lymecycline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

| Molécule | Médiane | P25 | P75 | Minimum | Maximum |
|---|---------|------|------|---------|---------|
| metacycline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| minocycline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| tigecycline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Sulfamides | 1.3 | 0.4 | 4.3 | 0.0 | 79.2 |
| cotrimoxazole | 1.3 | 0.4 | 4.3 | 0.0 | 79.2 |
| sulfadiazine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| sulfamethizole | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| sulfafurazole (erythromycine+sulfafurazole) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| MLS | 22.5 | 11.5 | 25.6 | 0.0 | 74.7 |
| Macrolides | 16.6 | 8.7 | 22.9 | 0.0 | 66.6 |
| erythromycine seule | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.2 |
| erythromycine (erythromycine+sulfafurazole) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| erythromycine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.2 |
| spiramycine seule | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 |
| spiramycine (spiramycine+ métronidazole) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| spiramycine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 |
| roxithromycine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.7 |
| josamycine | 0.8 | 0.1 | 4.2 | 0.0 | 54.4 |
| clarithromycine | 0.5 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 26.8 |
| azithromycine | 6.2 | 0.0 | 16.7 | 0.0 | 65.9 |
| midecamycine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| telithromycine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lincosamides | 2.9 | 0.2 | 5.5 | 0.0 | 10.9 |
| clindamycine | 2.9 | 0.2 | 5.5 | 0.0 | 10.9 |
| lincomycine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Streptogramines | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.6 |
| pristinamycine | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.6 |
| Aminosides | 8.8 | 5.0 | 12.5 | 1.7 | 32.8 |
| amikacine | 2.2 | 0.6 | 4.0 | 0.0 | 18.9 |
| gentamicine | 5.2 | 3.2 | 7.7 | 1.7 | 26.5 |
| tobramycine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.3 |
| streptomycine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Quinolones | 1.7 | 0.0 | 5.3 | 0.0 | 29.3 |

| Molécule | Médiane | P25 | P75 | Minimum | Maximum |
|--|---------|-----|------|---------|---------|
| Quinolones 1 G | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| acide pipemidique | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| flumequine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Fluoroquinolones | 1.7 | 0.0 | 5.3 | 0.0 | 29.3 |
| Fluoroquinolones orales | 0.7 | 0.0 | 4.9 | 0.0 | 26.6 |
| Fluoroquinolones injectables | 0.2 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 12.9 |
| norfloxacin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| enoxacin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| pefloxacin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 |
| ofloxacin | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 2.1 |
| ciprofloxacin | 0.4 | 0.0 | 4.9 | 0.0 | 26.7 |
| levofloxacin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 |
| moxifloxacin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| lomefloxacin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Phenicoles (thiamphenicol) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Glycopeptides | 2.5 | 0.7 | 5.1 | 0.0 | 101.4 |
| vancomycine | 2.5 | 0.3 | 4.3 | 0.0 | 71.1 |
| teicoplanine | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 30.4 |
| Imidazoles | 5.5 | 1.6 | 9.1 | 0.0 | 31.9 |
| Imidazolés O | 0.3 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 11.6 |
| Imidazolés I | 3.7 | 1.5 | 8.2 | 0.0 | 30.1 |
| metronidazole seul | 4.4 | 1.6 | 9.1 | 0.0 | 31.9 |
| metronidazole (spiramycine+ metronidazole) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| metronidazole | 4.4 | 1.6 | 9.1 | 0.0 | 31.9 |
| ornidazole | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
| tinidazole | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| "Autres ATB" (J01X + imidazoles oraux: P01AB) | 8.3 | 3.4 | 19.0 | 0.0 | 127.7 |
| J01X | 7.2 | 3.4 | 16.2 | 0.0 | 116.0 |
| acide fusidique | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 |
| fosfomycine | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 3.6 |
| linezolid | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.3 |
| colistine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.4 |
| nitrofurantoïne | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |

| Molécule | Médiane | P25 | P75 | Minimum | Maximum |
|---|---------|-------|-------|---------|---------|
| daptomycine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 |
| Antistaphylococciques | 2.5 | 0.7 | 6.5 | 0.0 | 104.7 |
| rifampicine | 2.6 | 0.0 | 6.5 | 0.0 | 39.7 |
| fidaxomicine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Consommation antibactériens à usage systémique (J01) | 309.8 | 189.7 | 396.9 | 40.2 | 621.6 |
| CONSOMMATION TOTALE | 314.1 | 189.7 | 402.6 | 40.2 | 627.7 |

*Antistaphylococcique: glycopeptides, linézolide, daptomycine.

Consommations d'antibiotiques - Services de chirurgie (N=73)

(Réseau de surveillance des consommations 2016)

| Molécule | Médiane | P25 | P75 | Minimum | Maximum |
|--|---------|-------|-------|---------|---------|
| B-lactamines | 464.4 | 381.4 | 584.1 | 96.0 | 1434.6 |
| Penicillines | 300.3 | 209.2 | 389.9 | 35.2 | 1159.3 |
| Penicillines G | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 5.5 |
| benzylpenicilline | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 5.5 |
| benzathine benzylpenicilline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Penicilline V (phenoxyethylpenicilline) | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 9.8 |
| Penicillines M | 4.3 | 0.8 | 9.6 | 0.0 | 45.8 |
| cloxacilline | 2.9 | 0.2 | 8.2 | 0.0 | 40.5 |
| oxacilline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.7 |
| Penicillines A | 72.9 | 42.9 | 116.3 | 0.0 | 485.3 |
| ampicilline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| amoxicilline | 72.9 | 42.9 | 116.3 | 0.0 | 485.3 |
| Penicillines + inhibiteur | 196.2 | 135.8 | 268.9 | 0.0 | 674.0 |
| penicillines A + inh. | 188.0 | 127.9 | 264.0 | 0.0 | 674.0 |
| amoxicilline ac clavulanique | 188.0 | 127.9 | 264.0 | 0.0 | 674.0 |
| ampicilline sulbactam | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ureido-penicilline + inh. (piperacilline tazobactam) | 9.4 | 3.0 | 14.7 | 0.0 | 70.7 |
| carboxypenicillines + inh. (ticarcilline ac clavulanique) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| Aminido-penicilline (pivmecillinam) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 |
| Ureidopenicillines | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 4.1 |
| piperacilline | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 4.1 |
| Carboxypenicillines | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.7 |
| ticarcilline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| temocilline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.7 |
| Cephalosporines, Penemes, Monobactams | 161.1 | 96.7 | 218.1 | 21.5 | 859.0 |
| Cephalosporines | 157.8 | 92.9 | 217.5 | 20.6 | 859.0 |
| C1G+C2G | 103.0 | 40.8 | 205.1 | 0.0 | 851.4 |
| C1G (dont J01DC04) | 92.1 | 22.2 | 183.9 | 0.0 | 652.3 |
| cefalexine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 |
| cefazoline | 92.1 | 22.2 | 183.9 | 0.0 | 652.3 |
| cefadroxil | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |

| Molécule | Médiane | P25 | P75 | Minimum | Maximum |
|---|---------|------|------|---------|---------|
| cefaclor | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| C2G (sauf J01DC04 et J01DC07) | 3.8 | 0.2 | 16.2 | 0.0 | 271.7 |
| cefoxitine | 0.7 | 0.0 | 5.6 | 0.0 | 25.2 |
| cefuroxime | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 271.7 |
| cefamandole | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.9 |
| C3G (dont J01DC07 et J01DE) | 35.8 | 12.1 | 63.3 | 0.0 | 156.8 |
| C3G Orales (dont J01DC07) | 1.3 | 0.2 | 2.9 | 0.0 | 43.4 |
| cefixime | 1.2 | 0.2 | 2.9 | 0.0 | 43.4 |
| cefpodoxime | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 |
| cefotiam | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| C3G Injectables | 32.6 | 11.8 | 52.8 | 0.0 | 113.4 |
| C3G Inj. inactives sur P. aeruginosa | 26.2 | 10.6 | 49.2 | 0.0 | 113.1 |
| cefotaxime | 2.6 | 0.3 | 7.4 | 0.0 | 40.8 |
| ceftriaxone | 14.9 | 5.4 | 44.8 | 0.0 | 110.5 |
| C3G Inj. actives sur P. aeruginosa | 1.3 | 0.3 | 5.5 | 0.0 | 29.1 |
| ceftazidime | 0.7 | 0.1 | 2.1 | 0.0 | 8.6 |
| cefepime | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 0.0 | 20.5 |
| ceftazidimeavibactam | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ceftolozanetazobactam | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| Autres céphalosporines | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 |
| ceftobiprole | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| ceftaroline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 |
| ceftobiprole+ceftaroline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| Penemes | 2.6 | 0.7 | 6.2 | 0.0 | 26.7 |
| ertapenem | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 6.5 |
| Penemes actives sur P. aeruginosa | 2.2 | 0.5 | 6.0 | 0.0 | 26.3 |
| imipenem | 2.0 | 0.3 | 5.2 | 0.0 | 14.0 |
| meropenem | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.1 |
| Monobactams (aztreonam) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 |
| Tetracyclines | 0.3 | 0.0 | 5.1 | 0.0 | 35.2 |
| demeclocycline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| doxycycline | 0.3 | 0.0 | 4.4 | 0.0 | 35.2 |
| lymecycline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

| Molécule | Médiane | P25 | P75 | Minimum | Maximum |
|---|---------|------|------|---------|---------|
| metacycline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| minocycline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 |
| tigecycline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9 |
| Sulfamides | 5.2 | 1.8 | 9.4 | 0.0 | 104.7 |
| cotrimoxazole | 5.2 | 1.8 | 9.4 | 0.0 | 104.7 |
| sulfadiazine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 |
| sulfamethizole | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| sulfafurazole (erythromycine+sulfafurazole) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| MLS | 18.2 | 10.9 | 26.7 | 0.0 | 48.4 |
| Macrolides | 3.9 | 0.8 | 9.1 | 0.0 | 31.2 |
| erythromycine seule | 2.1 | 0.2 | 4.2 | 0.0 | 28.8 |
| erythromycine (erythromycine+sulfafurazole) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| erythromycine | 2.1 | 0.2 | 4.2 | 0.0 | 28.8 |
| spiramycine seule | 0.1 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 6.6 |
| spiramycine (spiramycine+ métronidazole) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
| spiramycine | 0.1 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 6.6 |
| roxithromycine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.5 |
| josamycine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
| clarithromycine | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 18.2 |
| azithromycine | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 10.5 |
| midecamycine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| telithromycine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lincosamides | 5.9 | 2.8 | 14.0 | 0.0 | 32.2 |
| clindamycine | 5.8 | 2.7 | 12.2 | 0.0 | 32.2 |
| lincomycine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.7 |
| Streptogramines | 2.9 | 1.1 | 5.2 | 0.0 | 31.8 |
| pristinamycine | 2.9 | 1.1 | 5.2 | 0.0 | 31.8 |
| Aminosides | 28.1 | 12.3 | 41.8 | 0.0 | 121.4 |
| amikacine | 2.4 | 0.4 | 4.6 | 0.0 | 17.8 |
| gentamicine | 23.5 | 11.1 | 37.4 | 0.0 | 121.4 |
| tobramycine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.5 |
| streptomycine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Quinolones | 51.1 | 38.0 | 73.9 | 0.0 | 405.8 |

| Molécule | Médiane | P25 | P75 | Minimum | Maximum |
|--|---------|------|------|---------|---------|
| Quinolones 1 G | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| acide pipemidique | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| flumequine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Fluoroquinolones | 51.1 | 38.0 | 73.9 | 0.0 | 405.8 |
| Fluoroquinolones orales | 39.2 | 28.8 | 53.5 | 0.0 | 380.3 |
| Fluoroquinolones injectables | 8.7 | 5.0 | 17.4 | 0.0 | 67.8 |
| norfloxacin | 1.8 | 0.0 | 4.5 | 0.0 | 64.4 |
| enoxacin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| pefloxacin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 |
| ofloxacin | 23.6 | 9.7 | 37.5 | 0.0 | 97.2 |
| ciprofloxacin | 11.6 | 6.1 | 18.0 | 0.0 | 47.2 |
| levofloxacin | 3.8 | 1.0 | 12.1 | 0.0 | 372.3 |
| moxifloxacin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| lomefloxacin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Phénicoles (thiamphenicol) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
| Glycopeptides | 5.2 | 2.4 | 11.2 | 0.0 | 46.2 |
| vancomycine | 5.2 | 2.4 | 11.2 | 0.0 | 46.2 |
| teicoplanine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.7 |
| Imidazoles | 31.9 | 11.3 | 68.2 | 0.0 | 152.9 |
| Imidazolés O | 5.3 | 0.0 | 10.7 | 0.0 | 44.0 |
| Imidazolés I | 26.1 | 9.2 | 50.2 | 0.0 | 128.5 |
| metronidazole seul | 31.6 | 10.0 | 68.2 | 0.0 | 142.6 |
| metronidazole (spiramycine+ metronidazole) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| metronidazole | 31.6 | 10.0 | 68.2 | 0.0 | 142.6 |
| ornidazole | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.1 |
| tinidazole | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
| "Autres ATB" (J01X + imidazoles oraux: P01AB) | 45.8 | 24.2 | 89.5 | 2.9 | 169.0 |
| J01X | 45.1 | 19.9 | 70.6 | 2.9 | 151.5 |
| acide fusidique | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 |
| fosfomycine | 0.1 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 7.2 |
| linezolid | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 6.5 |
| colistine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.8 |
| nitrofurantoïne | 0.4 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 11.5 |

| Molécule | Médiane | P25 | P75 | Minimum | Maximum |
|---|---------|-------|-------|---------|---------|
| daptomycine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 105.2 |
| Antistaphylococciques | 6.3 | 3.3 | 12.9 | 0.0 | 128.3 |
| rifampicine | 4.8 | 0.2 | 13.9 | 0.0 | 65.5 |
| fidaxomicine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| Consommation antibactériens à usage systémique (J01) | 683.3 | 505.4 | 785.4 | 104.8 | 1658.2 |
| CONSOMMATION TOTALE | 707.8 | 525.4 | 807.0 | 104.8 | 1658.2 |

*Antistaphylococcique: glycopeptides, linézolide, daptomycine.

Consommations d'antibiotiques - Services de gynécologie-obstétrique (N=42)

(Réseau de surveillance des consommations 2016)

| Molécule | Médiane | P25 | P75 | Minimum | Maximum |
|--|---------|-------|-------|---------|---------|
| B-lactamines | 295.7 | 231.5 | 410.8 | 55.1 | 927.5 |
| Penicillines | 284.3 | 212.2 | 377.5 | 47.8 | 865.6 |
| Penicillines G | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 104.8 |
| benzylpenicilline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 104.8 |
| benzathine benzylpenicilline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 |
| Penicilline V (phenoxyethylpenicilline) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 |
| Penicillines M | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 7.2 |
| cloxacilline | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 7.2 |
| oxacilline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| Penicillines A | 196.1 | 130.1 | 272.8 | 6.5 | 637.4 |
| ampicilline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| amoxicilline | 196.1 | 130.1 | 272.8 | 6.5 | 637.4 |
| Penicillines + inhibiteur | 74.4 | 43.9 | 107.8 | 13.0 | 335.0 |
| penicillines A + inh. | 74.3 | 43.4 | 107.8 | 13.0 | 334.4 |
| amoxicilline ac clavulanique | 74.3 | 43.4 | 107.8 | 13.0 | 334.4 |
| ampicilline sulbactam | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ureido-penicilline + inh. (piperacilline tazobactam) | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 2.1 |
| carboxypenicillines + inh. (ticarcilline ac clavulanique) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Aminido-penicilline (pivmecillinam) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 |
| Ureidopenicillines | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| piperacilline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| Carboxypenicillines | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
| ticarcilline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| temocilline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
| Cephalosporines, Penemes, Monobactams | 28.1 | 9.6 | 35.6 | 3.5 | 124.7 |
| Cephalosporines | 26.5 | 9.6 | 35.6 | 3.5 | 121.6 |
| C1G+C2G | 2.0 | 0.4 | 21.4 | 0.0 | 74.0 |
| C1G (dont J01DC04) | 0.8 | 0.0 | 17.8 | 0.0 | 74.0 |
| cefalexine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| cefazoline | 0.8 | 0.0 | 17.5 | 0.0 | 74.0 |
| cefadroxil | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

| Molécule | Médiane | P25 | P75 | Minimum | Maximum |
|---|---------|-----|------|---------|---------|
| cefaclor | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
| C2G (sauf J01DC04 et J01DC07) | 0.1 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 18.8 |
| cefoxitine | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 4.1 |
| cefuroxime | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.8 |
| cefamandole | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| C3G (dont J01DC07 et J01DE) | 11.4 | 5.5 | 24.9 | 0.0 | 100.2 |
| C3G Orales (dont J01DC07) | 7.4 | 1.7 | 13.8 | 0.0 | 43.4 |
| cefixime | 7.2 | 1.7 | 13.7 | 0.0 | 43.4 |
| cefpodoxime | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| cefotiam | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| C3G Injectables | 4.4 | 1.9 | 9.7 | 0.0 | 69.9 |
| C3G Inj. inactives sur P. aeruginosa | 4.4 | 1.9 | 9.7 | 0.0 | 69.9 |
| cefotaxime | 1.4 | 0.5 | 3.3 | 0.0 | 68.1 |
| ceftriaxone | 1.7 | 0.9 | 4.7 | 0.0 | 22.9 |
| C3G Inj. actives sur P. aeruginosa | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 |
| ceftazidime | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
| cefepime | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 |
| ceftazidimeavibactam | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ceftolozanetazobactam | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Autres céphalosporines | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ceftobiprole | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ceftaroline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ceftobiprole+ceftaroline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Penemes | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 3.1 |
| ertapenem | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
| Penemes actives sur P. aeruginosa | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 3.1 |
| imipenem | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 2.9 |
| meropenem | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 |
| Monobactams (aztreonam) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| Tetracyclines | 0.7 | 0.0 | 8.1 | 0.0 | 36.1 |
| demeclocycline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| doxycycline | 0.7 | 0.0 | 8.1 | 0.0 | 36.1 |
| lymecycline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

| Molécule | Médiane | P25 | P75 | Minimum | Maximum |
|---|---------|-----|------|---------|---------|
| metacycline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| minocycline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| tigecycline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Sulfamides | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 8.8 |
| cotrimoxazole | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 8.8 |
| sulfadiazine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 |
| sulfamethizole | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| sulfafurazole (erythromycine+sulfafurazole) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| MLS | 7.4 | 4.4 | 11.6 | 1.3 | 22.9 |
| Macrolides | 1.9 | 0.2 | 5.7 | 0.0 | 13.9 |
| erythromycine seule | 0.5 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 13.9 |
| erythromycine (erythromycine+sulfafurazole) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| erythromycine | 0.5 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 13.9 |
| spiramycine seule | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 5.3 |
| spiramycine (spiramycine+ métronidazole) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| spiramycine | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 5.3 |
| roxithromycine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
| josamycine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| clarithromycine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 |
| azithromycine | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 6.1 |
| midecamycine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| telithromycine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lincosamides | 3.6 | 2.3 | 6.3 | 0.0 | 18.2 |
| clindamycine | 3.4 | 2.3 | 6.0 | 0.0 | 18.2 |
| lincomycine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.9 |
| Streptogramines | 0.2 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 5.1 |
| pristinamycine | 0.2 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 5.1 |
| Aminosides | 3.0 | 1.6 | 5.5 | 0.0 | 20.6 |
| amikacine | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 2.2 |
| gentamicine | 2.9 | 1.6 | 5.4 | 0.0 | 20.6 |
| tobramycine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| streptomycine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Quinolones | 5.6 | 2.7 | 11.3 | 0.0 | 19.5 |

| Molécule | Médiane | P25 | P75 | Minimum | Maximum |
|--|---------|-----|------|---------|---------|
| Quinolones 1 G | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| acide pipemidique | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| flumequine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Fluoroquinolones | 5.6 | 2.7 | 11.3 | 0.0 | 19.5 |
| Fluoroquinolones orales | 4.7 | 1.8 | 8.1 | 0.0 | 18.0 |
| Fluoroquinolones injectables | 0.8 | 0.1 | 2.7 | 0.0 | 8.8 |
| norfloxacin | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 13.5 |
| enoxacin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| pefloxacin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| ofloxacin | 4.8 | 0.5 | 8.2 | 0.0 | 18.3 |
| ciprofloxacin | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 3.7 |
| levofloxacin | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 1.9 |
| moxifloxacin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| lomefloxacin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Phénicoles (thiamphenicol) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Glycopeptides | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 7.6 |
| vancomycine | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 7.6 |
| teicoplanine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Imidazoles | 4.0 | 1.2 | 10.3 | 0.0 | 22.4 |
| Imidazolés O | 1.3 | 0.0 | 5.6 | 0.0 | 13.8 |
| Imidazolés I | 2.3 | 0.9 | 6.0 | 0.0 | 14.5 |
| metronidazole seul | 4.0 | 1.2 | 10.3 | 0.0 | 21.0 |
| metronidazole (spiramycine+ metronidazole) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| metronidazole | 4.0 | 1.2 | 10.3 | 0.0 | 21.0 |
| ornidazole | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.7 |
| tinidazole | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| "Autres ATB" (J01X + imidazoles oraux: P01AB) | 5.0 | 1.6 | 14.6 | 0.3 | 36.8 |
| J01X | 4.3 | 1.0 | 8.0 | 0.0 | 28.3 |
| acide fusidique | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| fosfomycine | 0.1 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 5.7 |
| linezolid | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| colistine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| nitrofurantoïne | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 8.5 |

| Molécule | Médiane | P25 | P75 | Minimum | Maximum |
|---|---------|-------|-------|---------|---------|
| daptomycine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Antistaphylococciques | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 7.6 |
| rifampicine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 |
| fidaxomicine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Consommation antibactériens à usage systémique (J01) | 330.9 | 250.2 | 440.3 | 60.5 | 1017.8 |
| CONSOMMATION TOTALE | 333.7 | 251.4 | 442.8 | 60.7 | 1017.8 |

*Antistaphylococcique: glycopeptides, linézolide, daptomycine.

Consommations d'antibiotiques - Services de SSR (N=99)

(Réseau de surveillance des consommations 2016)

| Molécule | Médiane | P25 | P75 | Minimum | Maximum |
|--|---------|------|-------|---------|---------|
| B-lactamines | 113.0 | 86.8 | 151.1 | 31.6 | 274.7 |
| Penicillines | 101.4 | 78.8 | 134.2 | 27.9 | 228.9 |
| Penicillines G | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.8 |
| benzylpenicilline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.8 |
| benzathine benzylpenicilline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| Penicilline V (phenoxyethylpenicilline) | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 41.4 |
| Penicillines M | 0.8 | 0.1 | 2.0 | 0.0 | 17.3 |
| cloxacilline | 0.7 | 0.1 | 1.8 | 0.0 | 17.3 |
| oxacilline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| Penicillines A | 38.4 | 25.4 | 51.4 | 0.0 | 127.2 |
| ampicilline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.7 |
| amoxicilline | 38.4 | 25.4 | 51.4 | 0.0 | 127.2 |
| Penicillines + inhibiteur | 55.6 | 41.6 | 75.8 | 2.0 | 178.0 |
| penicillines A + inh. | 53.4 | 41.5 | 70.7 | 2.0 | 167.2 |
| amoxicilline ac clavulanique | 53.4 | 41.5 | 70.7 | 2.0 | 167.2 |
| ampicilline sulbactam | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ureido-penicilline + inh. (piperacilline tazobactam) | 1.0 | 0.0 | 3.2 | 0.0 | 13.0 |
| carboxypenicillines + inh. (ticarcilline ac clavulanique) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Aminido-penicilline (pivmecillinam) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
| Ureidopenicillines | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| piperacilline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| Carboxypenicillines | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.8 |
| ticarcilline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| temocilline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.8 |
| Cephalosporines, Penemes, Monobactams | 13.3 | 8.3 | 19.3 | 0.7 | 47.9 |
| Cephalosporines | 12.2 | 7.2 | 17.2 | 0.7 | 43.3 |
| C1G+C2G | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 4.7 |
| C1G (dont J01DC04) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.7 |
| cefalexine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 |
| cefazoline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.7 |
| cefadroxil | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

| Molécule | Médiane | P25 | P75 | Minimum | Maximum |
|---|---------|-----|------|---------|---------|
| cefaclor | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
| C2G (sauf J01DC04 et J01DC07) | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 2.5 |
| cefoxitine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 |
| cefuroxime | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
| cefamandole | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| C3G (dont J01DC07 et J01DE) | 11.9 | 6.8 | 16.0 | 0.7 | 42.7 |
| C3G Orales (dont J01DC07) | 1.7 | 0.5 | 3.8 | 0.0 | 18.4 |
| cefixime | 1.7 | 0.4 | 3.8 | 0.0 | 18.4 |
| cefpodoxime | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.2 |
| cefotiam | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| C3G Injectables | 8.4 | 3.9 | 14.5 | 0.4 | 38.7 |
| C3G Inj. inactives sur P. aeruginosa | 8.2 | 3.4 | 12.4 | 0.4 | 33.0 |
| cefotaxime | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 9.2 |
| ceftriaxone | 6.4 | 3.2 | 11.6 | 0.0 | 33.0 |
| C3G Inj. actives sur P. aeruginosa | 0.6 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 7.7 |
| ceftazidime | 0.2 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 7.1 |
| cefepime | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 4.5 |
| ceftazidimeavibactam | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ceftolozanetazobactam | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.3 |
| Autres céphalosporines | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ceftobiprole | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ceftaroline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ceftobiprole+ceftaroline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Penemes | 0.9 | 0.2 | 2.1 | 0.0 | 26.2 |
| ertapenem | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 3.1 |
| Penemes actives sur P. aeruginosa | 0.8 | 0.1 | 1.8 | 0.0 | 23.2 |
| imipenem | 0.5 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 22.1 |
| meropenem | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9 |
| Monobactams (aztreonam) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| Tetracyclines | 0.8 | 0.0 | 3.4 | 0.0 | 26.3 |
| demeclocycline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 |
| doxycycline | 0.7 | 0.0 | 3.4 | 0.0 | 25.8 |
| lymecycline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.9 |

| Molécule | Médiane | P25 | P75 | Minimum | Maximum |
|---|---------|------|------|---------|---------|
| metacycline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| minocycline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
| tigecycline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| Sulfamides | 5.8 | 3.7 | 10.0 | 0.0 | 196.2 |
| cotrimoxazole | 5.8 | 3.7 | 10.0 | 0.0 | 71.4 |
| sulfadiazine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 124.8 |
| sulfamethizole | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| sulfafurazole (erythromycine+sulfafurazole) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| MLS | 9.2 | 5.9 | 13.5 | 0.0 | 64.2 |
| Macrolides | 2.8 | 1.2 | 5.1 | 0.0 | 42.9 |
| erythromycine seule | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 4.0 |
| erythromycine (erythromycine+sulfafurazole) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| erythromycine | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 4.0 |
| spiramycine seule | 0.4 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 5.8 |
| spiramycine (spiramycine+ métronidazole) | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.9 |
| spiramycine | 0.4 | 0.1 | 1.1 | 0.0 | 5.8 |
| roxithromycine | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 7.0 |
| josamycine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 |
| clarithromycine | 0.4 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 31.5 |
| azithromycine | 0.1 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 13.5 |
| midecamycine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| telithromycine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lincosamides | 1.3 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 16.1 |
| clindamycine | 1.3 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 16.1 |
| lincomycine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Streptogramines | 3.4 | 1.6 | 5.9 | 0.0 | 18.4 |
| pristinamycine | 3.4 | 1.6 | 5.9 | 0.0 | 18.4 |
| Aminosides | 0.6 | 0.1 | 1.6 | 0.0 | 19.4 |
| amikacine | 0.3 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 19.4 |
| gentamicine | 0.1 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 4.0 |
| tobramycine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| streptomycine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Quinolones | 23.8 | 16.2 | 36.9 | 0.0 | 80.3 |

| Molécule | Médiane | P25 | P75 | Minimum | Maximum |
|--|---------|------|------|---------|---------|
| Quinolones 1 G | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| acide pipemidique | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| flumequine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Fluoroquinolones | 23.8 | 16.2 | 36.9 | 0.0 | 80.3 |
| Fluoroquinolones orales | 22.9 | 15.3 | 34.1 | 0.0 | 67.3 |
| Fluoroquinolones injectables | 0.5 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 20.2 |
| norfloxacin | 0.9 | 0.1 | 2.5 | 0.0 | 17.2 |
| enoxacin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| pefloxacin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
| ofloxacin | 8.3 | 5.8 | 13.1 | 0.0 | 31.7 |
| ciprofloxacin | 6.3 | 3.6 | 12.4 | 0.0 | 35.1 |
| levofloxacin | 4.9 | 1.9 | 9.0 | 0.0 | 27.9 |
| moxifloxacin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39.7 |
| lomefloxacin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Phénicoles (thiamphenicol) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Glycopeptides | 0.6 | 0.1 | 1.9 | 0.0 | 10.1 |
| vancomycine | 0.4 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 10.1 |
| teicoplanine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.3 |
| Imidazoles | 3.2 | 1.4 | 7.0 | 0.0 | 28.8 |
| Imidazolés O | 2.2 | 0.3 | 4.7 | 0.0 | 20.4 |
| Imidazolés I | 0.7 | 0.0 | 2.6 | 0.0 | 8.5 |
| metronidazole seul | 3.2 | 1.4 | 6.8 | 0.0 | 28.8 |
| metronidazole (spiramycine+ metronidazole) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
| metronidazole | 3.2 | 1.4 | 7.0 | 0.0 | 28.8 |
| ornidazole | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| tinidazole | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 |
| "Autres ATB" (J01X + imidazoles oraux: P01AB) | 9.0 | 5.3 | 15.0 | 0.0 | 41.4 |
| J01X | 6.6 | 4.2 | 10.8 | 0.0 | 31.2 |
| acide fusidique | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.9 |
| fosfomycine | 0.2 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 8.4 |
| linezolid | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 7.0 |
| colistine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 |
| nitrofurantoïne | 1.4 | 0.1 | 3.6 | 0.0 | 24.1 |

| Molécule | Médiane | P25 | P75 | Minimum | Maximum |
|---|---------|-------|-------|---------|---------|
| daptomycine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.7 |
| Antistaphylococciques | 1.0 | 0.2 | 3.0 | 0.0 | 12.4 |
| rifampicine | 4.6 | 1.0 | 9.8 | 0.0 | 66.2 |
| fidaxomicine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9 |
| Consommation antibactériens à usage systémique (J01) | 163.3 | 128.9 | 219.1 | 37.5 | 533.8 |
| CONSOMMATION TOTALE | 175.7 | 134.0 | 228.7 | 37.5 | 607.1 |

*Antistaphylococcique: glycopeptides, linézolide, daptomycine.

Consommations d'antibiotiques - Services de SLD (N=34)

(Réseau de surveillance des consommations 2016)

| Molécule | Médiane | P25 | P75 | Minimum | Maximum |
|--|---------|------|------|---------|---------|
| B-lactamines | 53.6 | 37.5 | 74.2 | 10.5 | 99.2 |
| Penicillines | 47.4 | 33.9 | 63.8 | 8.1 | 92.5 |
| Penicillines G | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 |
| benzylpenicilline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 |
| benzathine benzylpenicilline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Penicilline V (phenoxyethylpenicilline) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 |
| Penicillines M | 0.2 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.5 |
| cloxacilline | 0.1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.5 |
| oxacilline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
| Penicillines A | 11.4 | 7.4 | 18.6 | 1.1 | 37.9 |
| ampicilline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| amoxicilline | 11.4 | 7.4 | 18.6 | 1.1 | 37.9 |
| Penicillines + inhibiteur | 29.8 | 19.4 | 43.1 | 4.6 | 71.0 |
| penicillines A + inh. | 29.1 | 19.4 | 42.7 | 4.6 | 69.0 |
| amoxicilline ac clavulanique | 29.1 | 19.4 | 42.7 | 4.6 | 69.0 |
| ampicilline sulbactam | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ureido-penicilline + inh. (piperacilline tazobactam) | 0.1 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 3.4 |
| carboxypenicillines + inh. (ticarcilline ac clavulanique) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Aminido-penicilline (pivmecillinam) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| Ureidopenicillines | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| piperacilline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Carboxypenicillines | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 |
| ticarcilline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 |
| temocilline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| Cephalosporines, Penemes, Monobactams | 6.5 | 4.6 | 10.7 | 0.3 | 17.2 |
| Cephalosporines | 6.3 | 3.8 | 10.1 | 0.3 | 16.8 |
| C1G+C2G | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 |
| C1G (dont J01DC04) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 |
| cefalexine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| cefazoline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 |
| cefadroxil | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

| Molécule | Médiane | P25 | P75 | Minimum | Maximum |
|---|---------|-----|------|---------|---------|
| cefaclor | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| C2G (sauf J01DC04 et J01DC07) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| cefoxitine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| cefuroxime | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| cefamandole | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| C3G (dont J01DC07 et J01DE) | 6.3 | 3.8 | 10.1 | 0.3 | 16.8 |
| C3G Orales (dont J01DC07) | 0.2 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 5.6 |
| cefixime | 0.2 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 5.6 |
| cefpodoxime | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| cefotiam | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| C3G Injectables | 5.6 | 3.1 | 9.7 | 0.1 | 14.1 |
| C3G Inj. inactives sur P. aeruginosa | 5.5 | 3.0 | 9.7 | 0.0 | 14.1 |
| cefotaxime | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
| ceftriaxone | 5.4 | 2.5 | 9.7 | 0.0 | 14.0 |
| C3G Inj. actives sur P. aeruginosa | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.3 |
| ceftazidime | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| cefepime | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 |
| ceftazidimeavibactam | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ceftolozanetazobactam | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Autres céphalosporines | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ceftobiprole | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ceftaroline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ceftobiprole+ceftaroline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Penemes | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 4.6 |
| ertapenem | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| Penemes actives sur P. aeruginosa | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 4.4 |
| imipenem | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 1.1 |
| meropenem | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.4 |
| Monobactams (aztreonam) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Tetracyclines | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.5 |
| demeclocycline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 |
| doxycycline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.5 |
| lymecycline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

| Molécule | Médiane | P25 | P75 | Minimum | Maximum |
|---|---------|-----|-----|---------|---------|
| metacycline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| minocycline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| tigecycline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Sulfamides | 0.6 | 0.5 | 2.0 | 0.0 | 6.6 |
| cotrimoxazole | 0.6 | 0.5 | 2.0 | 0.0 | 6.6 |
| sulfadiazine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| sulfamethizole | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| sulfafurazole (erythromycine+sulfafurazole) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| MLS | 3.9 | 1.2 | 5.0 | 0.3 | 11.3 |
| Macrolides | 0.8 | 0.1 | 1.8 | 0.0 | 5.3 |
| erythromycine seule | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 |
| erythromycine (erythromycine+sulfafurazole) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| erythromycine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 |
| spiramycine seule | 0.1 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 2.2 |
| spiramycine (spiramycine+ métronidazole) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 |
| spiramycine | 0.1 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 2.2 |
| roxithromycine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 |
| josamycine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 |
| clarithromycine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
| azithromycine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.9 |
| midecamycine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| telithromycine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lincosamides | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.2 |
| clindamycine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.2 |
| lincomycine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Streptogramines | 1.8 | 0.9 | 3.2 | 0.0 | 11.3 |
| pristinamycine | 1.8 | 0.9 | 3.2 | 0.0 | 11.3 |
| Aminosides | 0.3 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 2.4 |
| amikacine | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 1.3 |
| gentamicine | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 2.4 |
| tobramycine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| streptomycine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Quinolones | 3.1 | 1.8 | 4.9 | 0.1 | 12.5 |

| Molécule | Médiane | P25 | P75 | Minimum | Maximum |
|--|---------|-----|-----|---------|---------|
| Quinolones 1 G | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| acide pipemidique | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| flumequine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Fluoroquinolones | 3.1 | 1.8 | 4.9 | 0.1 | 12.5 |
| Fluoroquinolones orales | 2.4 | 1.5 | 4.4 | 0.0 | 11.7 |
| Fluoroquinolones injectables | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 0.0 | 4.5 |
| norfloxacin | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 4.4 |
| enoxacin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| pefloxacin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ofloxacin | 1.2 | 0.4 | 2.1 | 0.0 | 11.8 |
| ciprofloxacin | 0.6 | 0.2 | 1.2 | 0.0 | 6.2 |
| levofloxacin | 0.3 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 4.1 |
| moxifloxacin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| lomefloxacin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Phénicoles (thiamphenicol) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Glycopeptides | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.7 |
| vancomycine | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.7 |
| teicoplanine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Imidazoles | 1.8 | 0.9 | 2.9 | 0.0 | 8.6 |
| Imidazolés O | 0.8 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 4.1 |
| Imidazolés I | 0.9 | 0.4 | 2.0 | 0.0 | 4.8 |
| metronidazole seul | 1.8 | 0.9 | 2.9 | 0.0 | 8.6 |
| metronidazole (spiramycine+ metronidazole) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
| metronidazole | 1.8 | 0.9 | 2.9 | 0.0 | 8.6 |
| ornidazole | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| tinidazole | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 |
| "Autres ATB" (J01X + imidazoles oraux: P01AB) | 2.4 | 1.4 | 4.0 | 0.2 | 12.6 |
| J01X | 1.5 | 0.7 | 2.9 | 0.1 | 8.8 |
| acide fusidique | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 |
| fosfomycine | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.6 |
| linezolid | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| colistine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.3 |
| nitrofurantoïne | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 2.4 |

| Molécule | Médiane | P25 | P75 | Minimum | Maximum |
|---|---------|------|------|---------|---------|
| daptomycine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| Antistaphylococciques | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.7 |
| rifampicine | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 5.8 |
| fidaxomicine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 |
| Consommation antibactériens à usage systémique (J01) | 63.5 | 46.4 | 88.9 | 25.2 | 116.3 |
| CONSOMMATION TOTALE | 64.4 | 46.4 | 91.5 | 25.2 | 119.3 |

*Antistaphylococcique: glycopeptides, linézolide, daptomycine.

Consommations d'antibiotiques - Services de psychiatrie (N=26)

(Réseau de surveillance des consommations 2016)

| Molécule | Médiane | P25 | P75 | Minimum | Maximum |
|--|---------|------|------|---------|---------|
| B-lactamines | 57.6 | 39.0 | 78.3 | 5.6 | 117.2 |
| Penicillines | 56.3 | 37.8 | 73.0 | 4.6 | 111.1 |
| Penicillines G | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 |
| benzylpenicilline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 |
| benzathine benzylpenicilline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Penicilline V (phenoxymethylpenicilline) | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 3.4 |
| Penicillines M | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 8.5 |
| cloxacilline | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 8.5 |
| oxacilline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Penicillines A | 24.8 | 13.4 | 35.7 | 0.6 | 63.6 |
| ampicilline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| amoxicilline | 24.8 | 13.4 | 35.7 | 0.6 | 63.6 |
| Penicillines + inhibiteur | 29.0 | 19.9 | 43.3 | 3.9 | 93.1 |
| penicillines A + inh. | 29.0 | 19.9 | 43.3 | 3.9 | 92.8 |
| amoxicilline ac clavulanique | 29.0 | 19.9 | 43.3 | 3.9 | 92.8 |
| ampicilline sulbactam | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ureido-penicilline + inh. (piperacilline tazobactam) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 |
| carboxypenicillines + inh. (ticarcilline ac clavulanique) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Aminido-penicilline (pivmecillinam) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 |
| Ureidopenicillines | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
| piperacilline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
| Carboxypenicillines | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ticarcilline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| temocilline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Cephalosporines, Penemes, Monobactams | 1.0 | 0.5 | 2.5 | 0.0 | 21.3 |
| Cephalosporines | 1.0 | 0.5 | 2.5 | 0.0 | 21.3 |
| C1G+C2G | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 |
| C1G (dont J01DC04) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| cefalexine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| cefazoline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| cefadroxil | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

| Molécule | Médiane | P25 | P75 | Minimum | Maximum |
|---|---------|-----|-----|---------|---------|
| cefaclor | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| C2G (sauf J01DC04 et J01DC07) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 |
| cefoxitine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| cefuroxime | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 |
| cefamandole | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| C3G (dont J01DC07 et J01DE) | 0.9 | 0.4 | 2.2 | 0.0 | 21.3 |
| C3G Orales (dont J01DC07) | 0.3 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 5.8 |
| cefixime | 0.2 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 5.8 |
| cefpodoxime | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.7 |
| cefotiam | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| C3G Injectables | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 0.0 | 20.9 |
| C3G Inj. inactives sur P. aeruginosa | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 0.0 | 20.3 |
| cefotaxime | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 14.2 |
| ceftriaxone | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.0 | 6.1 |
| C3G Inj. actives sur P. aeruginosa | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 |
| ceftazidime | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 |
| cefepime | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ceftazidimeavibactam | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ceftolozanetazobactam | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Autres céphalosporines | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ceftobiprole | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ceftaroline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ceftobiprole+ceftaroline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Penemes | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ertapenem | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Penemes actives sur P. aeruginosa | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| imipenem | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| meropenem | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Monobactams (aztreonam) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Tetracyclines | 3.2 | 1.3 | 4.5 | 0.0 | 44.3 |
| demeclocycline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| doxycycline | 3.0 | 1.1 | 4.3 | 0.0 | 44.3 |
| lymecycline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 |

| Molécule | Médiane | P25 | P75 | Minimum | Maximum |
|---|---------|-----|-----|---------|---------|
| metacycline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| minocycline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 |
| tigecycline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Sulfamides | 0.7 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 3.7 |
| cotrimoxazole | 0.7 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 3.7 |
| sulfadiazine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| sulfamethizole | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| sulfafurazole (erythromycine+sulfafurazole) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| MLS | 3.4 | 1.8 | 5.9 | 0.0 | 43.5 |
| Macrolides | 1.7 | 0.6 | 2.9 | 0.0 | 40.8 |
| erythromycine seule | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.9 |
| erythromycine (erythromycine+sulfafurazole) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| erythromycine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.9 |
| spiramycine seule | 0.1 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 1.7 |
| spiramycine (spiramycine+ métronidazole) | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.5 |
| spiramycine | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.0 | 2.0 |
| roxithromycine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 |
| josamycine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.2 |
| clarithromycine | 0.1 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 3.5 |
| azithromycine | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 4.1 |
| midecamycine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| telithromycine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| Lincosamides | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.4 |
| clindamycine | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.4 |
| lincomycine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Streptogramines | 1.5 | 0.7 | 2.4 | 0.0 | 7.1 |
| pristinamycine | 1.5 | 0.7 | 2.4 | 0.0 | 7.1 |
| Aminosides | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 5.9 |
| amikacine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 |
| gentamicine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.2 |
| tobramycine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| streptomycine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Quinolones | 4.0 | 2.4 | 8.9 | 0.0 | 16.4 |

| Molécule | Médiane | P25 | P75 | Minimum | Maximum |
|--|---------|-----|-----|---------|---------|
| Quinolones 1 G | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| acide pipemidique | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| flumequine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Fluoroquinolones | 4.0 | 2.4 | 8.9 | 0.0 | 16.4 |
| Fluoroquinolones orales | 4.0 | 2.4 | 6.7 | 0.0 | 10.3 |
| Fluoroquinolones injectables | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.6 |
| norfloxacin | 0.2 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 2.6 |
| enoxacin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| pefloxacin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ofloxacin | 2.3 | 1.2 | 4.2 | 0.0 | 8.4 |
| ciprofloxacin | 0.4 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 4.0 |
| levofloxacin | 0.2 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 12.8 |
| moxifloxacin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| lomefloxacin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| Phénicoles (thiamphenicol) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Glycopeptides | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 |
| vancomycine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 |
| teicoplanine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Imidazoles | 0.7 | 0.1 | 1.5 | 0.0 | 8.3 |
| Imidazolés O | 0.6 | 0.1 | 1.4 | 0.0 | 2.4 |
| Imidazolés I | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 7.6 |
| metronidazole seul | 0.7 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 8.3 |
| metronidazole (spiramycine+ metronidazole) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| metronidazole | 0.7 | 0.1 | 1.5 | 0.0 | 8.3 |
| ornidazole | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| tinidazole | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| "Autres ATB" (J01X + imidazoles oraux: P01AB) | 1.2 | 0.3 | 2.7 | 0.0 | 11.1 |
| J01X | 0.4 | 0.1 | 1.4 | 0.0 | 9.7 |
| acide fusidique | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| fosfomycine | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 1.3 |
| linezolid | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
| colistine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| nitrofurantoïne | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 8.1 |

| Molécule | Médiane | P25 | P75 | Minimum | Maximum |
|---|---------|------|------|---------|---------|
| daptomycine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Antistaphylococciques | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 |
| rifampicine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.2 |
| fidaxomicine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Consommation antibactériens à usage systémique (J01) | 74.6 | 54.8 | 99.0 | 15.8 | 166.3 |
| CONSOMMATION TOTALE | 78.0 | 55.2 | 99.2 | 15.9 | 173.9 |

*Antistaphylococcique: glycopeptides, linézolide, daptomycine.

Consommations d'antibiotiques - Services d'hématologie (N=7)

(Réseau de surveillance des consommations 2016)

| Molécule | Médiane | P25 | P75 | Minimum | Maximum |
|--|---------|-------|-------|---------|---------|
| B-lactamines | 681.9 | 605.8 | 961.0 | 278.1 | 1246.7 |
| Penicillines | 486.9 | 442.0 | 578.0 | 204.9 | 866.0 |
| Penicillines G | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 13.7 |
| benzylpenicilline | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 13.7 |
| benzathine benzylpenicilline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Penicilline V (phenoxyethylpenicilline) | 10.7 | 5.0 | 14.1 | 1.5 | 25.5 |
| Penicillines M | 4.9 | 0.2 | 10.9 | 0.0 | 15.0 |
| cloxacilline | 4.9 | 0.2 | 10.8 | 0.0 | 10.9 |
| oxacilline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.2 |
| Penicillines A | 187.1 | 98.5 | 273.0 | 38.5 | 557.3 |
| ampicilline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| amoxicilline | 187.1 | 98.5 | 273.0 | 38.5 | 557.3 |
| Penicillines + inhibiteur | 291.6 | 268.7 | 310.0 | 153.7 | 333.5 |
| penicillines A + inh. | 91.2 | 63.5 | 108.0 | 55.5 | 127.8 |
| amoxicilline ac clavulanique | 91.2 | 63.5 | 108.0 | 55.5 | 127.8 |
| ampicilline sulbactam | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ureido-penicilline + inh. (piperacilline tazobactam) | 208.7 | 140.8 | 222.8 | 60.8 | 277.8 |
| carboxypenicillines + inh. (ticarcilline ac clavulanique) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| Aminido-penicilline (pivmecillinam) | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.8 |
| Ureidopenicillines | 0.7 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 3.6 |
| piperacilline | 0.7 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 3.6 |
| Carboxypenicillines | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 0.0 | 8.1 |
| ticarcilline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| temocilline | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 0.0 | 8.1 |
| Cephalosporines, Penemes, Monobactams | 212.6 | 144.1 | 380.7 | 73.2 | 426.9 |
| Cephalosporines | 94.3 | 61.8 | 151.6 | 49.2 | 164.3 |
| C1G+C2G | 3.1 | 0.4 | 5.9 | 0.0 | 12.3 |
| C1G (dont J01DC04) | 2.5 | 0.0 | 3.8 | 0.0 | 11.6 |
| cefalexine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| cefazoline | 2.5 | 0.0 | 3.8 | 0.0 | 11.6 |
| cefadroxil | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

| Molécule | Médiane | P25 | P75 | Minimum | Maximum |
|---|---------|------|-------|---------|---------|
| cefaclor | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| C2G (sauf J01DC04 et J01DC07) | 0.6 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 3.3 |
| cefoxitine | 0.5 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.7 |
| cefuroxime | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 2.6 |
| cefamandole | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| C3G (dont J01DC07 et J01DE) | 93.9 | 55.9 | 147.1 | 49.2 | 161.2 |
| C3G Orales (dont J01DC07) | 0.9 | 0.7 | 3.3 | 0.0 | 3.5 |
| cefixime | 0.9 | 0.7 | 3.3 | 0.0 | 3.5 |
| cefpodoxime | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| cefotiam | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| C3G Injectables | 93.1 | 52.6 | 145.7 | 49.2 | 157.7 |
| C3G Inj. inactives sur P. aeruginosa | 28.7 | 17.8 | 37.4 | 12.5 | 48.5 |
| cefotaxime | 8.9 | 2.1 | 17.1 | 1.3 | 22.7 |
| ceftriaxone | 20.0 | 6.8 | 31.4 | 3.0 | 35.2 |
| C3G Inj. actives sur P. aeruginosa | 46.5 | 40.1 | 124.5 | 11.8 | 139.9 |
| ceftazidime | 16.3 | 11.0 | 27.3 | 8.1 | 36.0 |
| cefepime | 29.8 | 9.2 | 107.5 | 3.7 | 123.6 |
| ceftazidimeavibactam | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ceftolozanetazobactam | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
| Autres céphalosporines | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ceftobiprole | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
| ceftaroline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ceftobiprole+ceftaroline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
| Penemes | 81.8 | 61.8 | 257.5 | 24.0 | 313.3 |
| ertapenem | 0.5 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 3.4 |
| Penemes actives sur P. aeruginosa | 78.4 | 61.8 | 256.9 | 24.0 | 312.8 |
| imipenem | 61.5 | 12.2 | 92.9 | 10.4 | 197.8 |
| meropenem | 13.7 | 7.7 | 59.1 | 0.3 | 300.6 |
| Monobactams (aztreonam) | 5.6 | 1.7 | 7.0 | 0.0 | 7.5 |
| Tetracyclines | 3.2 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 11.4 |
| demeclocycline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| doxycycline | 3.2 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 11.4 |
| lymecycline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

| Molécule | Médiane | P25 | P75 | Minimum | Maximum |
|---|---------|------|-------|---------|---------|
| metacycline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| minocycline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| tigecycline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| Sulfamides | 50.6 | 43.2 | 80.6 | 41.7 | 101.0 |
| cotrimoxazole | 48.3 | 41.7 | 69.3 | 29.1 | 101.0 |
| sulfadiazine | 0.0 | 0.0 | 14.1 | 0.0 | 38.2 |
| sulfamethizole | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| sulfafurazole (erythromycine+sulfafurazole) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| MLS | 28.8 | 22.3 | 47.6 | 8.4 | 53.1 |
| Macrolides | 21.8 | 17.1 | 33.5 | 1.4 | 38.9 |
| erythromycine seule | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 3.8 |
| erythromycine (erythromycine+sulfafurazole) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| erythromycine | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 3.8 |
| spiramycine seule | 10.1 | 6.9 | 16.5 | 1.4 | 18.0 |
| spiramycine (spiramycine+ métronidazole) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| spiramycine | 10.1 | 6.9 | 16.5 | 1.4 | 18.0 |
| roxithromycine | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 5.4 |
| josamycine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| clarithromycine | 0.9 | 0.0 | 5.8 | 0.0 | 15.8 |
| azithromycine | 5.4 | 0.0 | 9.7 | 0.0 | 23.9 |
| midecamycine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| telithromycine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lincosamides | 4.9 | 1.2 | 6.3 | 0.0 | 8.2 |
| clindamycine | 4.9 | 1.2 | 6.3 | 0.0 | 8.2 |
| lincomycine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Streptogramines | 5.1 | 2.3 | 6.2 | 0.2 | 11.3 |
| pristinamycine | 5.1 | 2.3 | 6.2 | 0.2 | 11.3 |
| Aminosides | 24.3 | 20.3 | 47.7 | 18.1 | 59.5 |
| amikacine | 23.2 | 14.0 | 45.2 | 12.5 | 58.1 |
| gentamicine | 1.6 | 0.0 | 3.5 | 0.0 | 11.8 |
| tobramycine | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 4.7 |
| streptomycine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Quinolones | 55.7 | 40.4 | 101.8 | 26.4 | 101.8 |

| Molécule | Médiane | P25 | P75 | Minimum | Maximum |
|--|---------|-------|-------|---------|---------|
| Quinolones 1 G | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| acide pipemidique | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| flumequine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Fluoroquinolones | 55.7 | 40.4 | 101.8 | 26.4 | 101.8 |
| Fluoroquinolones orales | 41.8 | 35.2 | 46.9 | 23.4 | 60.6 |
| Fluoroquinolones injectables | 14.9 | 3.0 | 42.5 | 0.6 | 54.9 |
| norfloxacin | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 2.4 |
| enoxacin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| pefloxacin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ofloxacin | 9.3 | 5.6 | 9.6 | 3.6 | 15.2 |
| ciprofloxacin | 32.5 | 12.7 | 48.4 | 7.9 | 57.3 |
| levofloxacin | 25.2 | 6.9 | 42.4 | 5.0 | 43.2 |
| moxifloxacin | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 4.2 |
| lomefloxacin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Phenicoles (thiamphenicol) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Glycopeptides | 143.4 | 92.0 | 175.6 | 24.7 | 185.2 |
| vancomycine | 83.1 | 75.8 | 136.4 | 16.3 | 175.6 |
| teicoplanine | 16.2 | 8.3 | 33.7 | 0.0 | 107.9 |
| Imidazoles | 26.1 | 18.7 | 35.3 | 17.5 | 75.3 |
| Imidazolés O | 15.9 | 9.2 | 17.4 | 7.8 | 33.1 |
| Imidazolés I | 13.7 | 9.0 | 18.0 | 3.1 | 42.2 |
| metronidazole seul | 25.0 | 17.5 | 29.6 | 17.4 | 75.3 |
| metronidazole (spiramycine+ metronidazole) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| metronidazole | 25.0 | 17.5 | 29.6 | 17.4 | 75.3 |
| ornidazole | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 |
| tinidazole | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| "Autres ATB" (J01X + imidazoles oraux: P01AB) | 178.7 | 135.0 | 269.8 | 59.0 | 412.4 |
| J01X | 169.6 | 119.1 | 255.5 | 51.1 | 379.3 |
| acide fusidique | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| fosfomycine | 0.9 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 5.2 |
| linezolid | 4.6 | 2.4 | 13.3 | 2.4 | 72.6 |
| colistine | 8.6 | 0.0 | 25.1 | 0.0 | 27.0 |
| nitrofurantoïne | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 1.6 |

| Molécule | Médiane | P25 | P75 | Minimum | Maximum |
|---|---------|-------|--------|---------|---------|
| daptomycine | 4.1 | 0.0 | 5.1 | 0.0 | 130.4 |
| Antistaphylococciques | 150.3 | 101.9 | 250.9 | 33.9 | 305.2 |
| rifampicine | 1.4 | 0.0 | 11.2 | 0.0 | 34.3 |
| fidaxomicine | 0.5 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 2.1 |
| Consommation antibactériens à usage systémique (J01) | 1070.5 | 922.7 | 1639.1 | 515.7 | 1648.4 |
| CONSOMMATION TOTALE | 1121.3 | 938.6 | 1665.6 | 523.5 | 1683.9 |

*Antistaphylococcique: glycopeptides, linézolide, daptomycine.

Consommations d'antibiotiques - Services de maladies infectieuses (N=6)

(Réseau de surveillance des consommations 2016)

| Molécule | Médiane | P25 | P75 | Minimum | Maximum |
|--|---------|-------|--------|---------|---------|
| B-lactamines | 1058.9 | 852.3 | 1346.3 | 716.4 | 2396.8 |
| Penicillines | 846.7 | 729.4 | 1141.0 | 631.4 | 1640.7 |
| Penicillines G | 2.1 | 0.0 | 9.8 | 0.0 | 11.9 |
| benzylpenicilline | 2.0 | 0.0 | 9.8 | 0.0 | 10.0 |
| benzathine benzylpenicilline | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 2.0 |
| Penicilline V (phenoxyethylpenicilline) | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.9 |
| Penicillines M | 62.0 | 49.0 | 94.2 | 45.4 | 116.9 |
| cloxacilline | 62.0 | 49.0 | 93.1 | 27.0 | 116.9 |
| oxacilline | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 18.4 |
| Penicillines A | 458.1 | 383.0 | 733.0 | 188.9 | 1330.8 |
| ampicilline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| amoxicilline | 458.1 | 383.0 | 733.0 | 188.9 | 1330.8 |
| Penicillines + inhibiteur | 293.8 | 265.5 | 299.1 | 264.6 | 367.5 |
| penicillines A + inh. | 257.5 | 204.0 | 268.7 | 133.1 | 359.3 |
| amoxicilline ac clavulanique | 257.5 | 204.0 | 268.7 | 133.1 | 359.3 |
| ampicilline sulbactam | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ureido-penicilline + inh. (piperacilline tazobactam) | 41.2 | 20.6 | 61.3 | 8.2 | 131.5 |
| carboxypenicillines + inh. (ticarcilline ac clavulanique) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| Aminido-penicilline (pivmecillinam) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ureidopenicillines | 3.3 | 0.7 | 13.5 | 0.0 | 15.5 |
| piperacilline | 3.3 | 0.7 | 13.5 | 0.0 | 15.5 |
| Carboxypenicillines | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 6.0 |
| ticarcilline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| temocilline | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 6.0 |
| Cephalosporines, Penemes, Monobactams | 207.5 | 122.9 | 214.6 | 84.9 | 756.1 |
| Cephalosporines | 159.9 | 106.2 | 192.4 | 74.6 | 657.0 |
| C1G+C2G | 6.6 | 2.2 | 17.4 | 0.3 | 356.0 |
| C1G (dont J01DC04) | 5.8 | 1.5 | 10.0 | 0.3 | 356.0 |
| cefalexine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 |
| cefazoline | 5.8 | 1.5 | 10.0 | 0.3 | 354.0 |
| cefadroxil | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

| Molécule | Médiane | P25 | P75 | Minimum | Maximum |
|---|---------|-------|-------|---------|---------|
| cefaclor | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| C2G (sauf J01DC04 et J01DC07) | 0.7 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 7.4 |
| cefoxitine | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 7.4 |
| cefuroxime | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 |
| cefamandole | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| C3G (dont J01DC07 et J01DE) | 150.0 | 104.1 | 181.6 | 74.3 | 301.0 |
| C3G Orales (dont J01DC07) | 1.5 | 0.0 | 3.8 | 0.0 | 9.5 |
| cefixime | 1.5 | 0.0 | 3.8 | 0.0 | 9.5 |
| cefpodoxime | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| cefotiam | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| C3G Injectables | 145.3 | 100.2 | 178.6 | 74.3 | 301.0 |
| C3G Inj. inactives sur P. aeruginosa | 117.5 | 88.4 | 150.1 | 71.1 | 154.7 |
| cefotaxime | 63.0 | 19.1 | 94.6 | 17.8 | 116.7 |
| ceftriaxone | 49.5 | 33.5 | 69.4 | 6.7 | 116.8 |
| C3G Inj. actives sur P. aeruginosa | 22.7 | 11.8 | 38.7 | 3.2 | 146.2 |
| ceftazidime | 7.1 | 4.2 | 12.4 | 0.3 | 47.4 |
| cefepime | 15.6 | 7.7 | 26.3 | 2.9 | 98.8 |
| ceftazidimeavibactam | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ceftolozanetazobactam | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Autres céphalosporines | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ceftobiprole | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ceftaroline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ceftobiprole+ceftaroline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Penemes | 24.0 | 16.4 | 66.6 | 10.3 | 78.6 |
| ertapenem | 4.0 | 1.5 | 6.4 | 0.8 | 15.4 |
| Penemes actives sur P. aeruginosa | 20.0 | 9.4 | 60.2 | 1.0 | 77.1 |
| imipenem | 9.6 | 7.6 | 16.3 | 1.0 | 22.8 |
| meropenem | 7.0 | 0.0 | 37.4 | 0.0 | 69.5 |
| Monobactams (aztreonam) | 0.7 | 0.2 | 1.3 | 0.0 | 20.5 |
| Tetracyclines | 28.2 | 11.9 | 110.5 | 0.7 | 290.4 |
| demeclocycline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| doxycycline | 28.2 | 11.9 | 39.0 | 0.0 | 290.4 |
| lymecycline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

| Molécule | Médiane | P25 | P75 | Minimum | Maximum |
|---|---------|------|-------|---------|---------|
| metacycline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| minocycline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 68.1 |
| tigecycline | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 3.5 |
| Sulfamides | 66.1 | 24.1 | 129.5 | 22.9 | 186.0 |
| cotrimoxazole | 45.2 | 23.1 | 68.2 | 22.9 | 186.0 |
| sulfadiazine | 0.5 | 0.0 | 41.8 | 0.0 | 61.3 |
| sulfamethizole | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| sulfafurazole (erythromycine+sulfafurazole) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| MLS | 82.0 | 79.2 | 109.1 | 45.4 | 353.7 |
| Macrolides | 42.6 | 35.0 | 57.7 | 17.2 | 75.9 |
| erythromycine seule | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
| erythromycine (erythromycine+sulfafurazole) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| erythromycine | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
| spiramycine seule | 11.2 | 5.9 | 20.1 | 0.5 | 22.2 |
| spiramycine (spiramycine+ métronidazole) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
| spiramycine | 11.2 | 5.9 | 20.1 | 1.3 | 22.2 |
| roxithromycine | 0.5 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 30.9 |
| josamycine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| clarithromycine | 11.9 | 10.7 | 26.4 | 2.1 | 35.9 |
| azithromycine | 8.2 | 4.8 | 11.7 | 1.1 | 33.0 |
| midecamycine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| telithromycine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lincosamides | 28.1 | 22.5 | 35.4 | 7.6 | 308.2 |
| clindamycine | 28.1 | 22.5 | 35.4 | 7.6 | 308.2 |
| lincomycine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Streptogramines | 3.8 | 2.2 | 10.7 | 0.4 | 29.7 |
| pristinamycine | 3.8 | 2.2 | 10.7 | 0.4 | 29.7 |
| Aminosides | 30.5 | 15.6 | 45.5 | 13.8 | 51.1 |
| amikacine | 11.3 | 9.3 | 18.1 | 3.3 | 18.1 |
| gentamicine | 14.5 | 10.9 | 33.0 | 4.5 | 33.0 |
| tobramycine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.1 |
| streptomycine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Quinolones | 88.5 | 63.0 | 106.9 | 50.5 | 223.7 |

| Molécule | Médiane | P25 | P75 | Minimum | Maximum |
|--|---------|------|-------|---------|---------|
| Quinolones 1 G | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| acide pipemidique | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| flumequine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Fluoroquinolones | 88.5 | 63.0 | 106.9 | 50.5 | 223.7 |
| Fluoroquinolones orales | 81.2 | 57.0 | 106.5 | 39.8 | 221.2 |
| Fluoroquinolones injectables | 6.2 | 2.5 | 8.1 | 0.3 | 10.7 |
| norfloxacin | 0.3 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 1.1 |
| enoxacin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| pefloxacin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ofloxacin | 35.4 | 29.1 | 41.9 | 8.7 | 55.6 |
| ciprofloxacin | 18.3 | 9.4 | 36.3 | 8.9 | 157.6 |
| levofloxacin | 22.9 | 8.6 | 32.3 | 2.0 | 56.3 |
| moxifloxacin | 2.4 | 0.6 | 3.1 | 0.0 | 10.1 |
| lomefloxacin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Phenicoles (thiamphenicol) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Glycopeptides | 12.6 | 6.9 | 45.2 | 3.8 | 435.3 |
| vancomycine | 12.6 | 6.9 | 45.2 | 3.8 | 412.5 |
| teicoplanine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.8 |
| Imidazoles | 32.8 | 26.7 | 39.2 | 21.6 | 42.2 |
| Imidazolés O | 9.2 | 6.1 | 27.0 | 0.0 | 28.2 |
| Imidazolés I | 15.4 | 13.3 | 26.9 | 12.2 | 32.5 |
| metronidazole seul | 27.2 | 26.7 | 38.6 | 21.6 | 39.2 |
| metronidazole (spiramycine+ metronidazole) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
| metronidazole | 27.5 | 26.7 | 38.6 | 21.6 | 39.2 |
| ornidazole | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.1 |
| tinidazole | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| "Autres ATB" (J01X + imidazoles oraux: P01AB) | 79.3 | 42.3 | 106.0 | 36.1 | 605.1 |
| J01X | 61.5 | 42.3 | 80.2 | 26.0 | 596.8 |
| acide fusidique | 0.1 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 5.4 |
| fosfomycine | 2.4 | 0.8 | 3.8 | 0.1 | 32.3 |
| linezolid | 3.9 | 1.7 | 4.4 | 0.0 | 8.7 |
| colistine | 0.3 | 0.0 | 5.5 | 0.0 | 39.3 |
| nitrofurantoïne | 0.3 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 1.3 |

| Molécule | Médiane | P25 | P75 | Minimum | Maximum |
|---|---------|--------|--------|---------|---------|
| daptomycine | 7.8 | 0.0 | 28.1 | 0.0 | 70.9 |
| Antistaphylococciques | 37.0 | 13.2 | 54.5 | 3.8 | 508.0 |
| rifampicine | 41.0 | 33.9 | 127.9 | 31.9 | 512.1 |
| fidaxomicine | 0.3 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 2.6 |
| Consommation antibactériens à usage systémique (J01) | 1635.9 | 1100.3 | 1746.6 | 932.3 | 3770.9 |
| CONSOMMATION TOTALE | 1700.2 | 1134.2 | 1883.3 | 985.2 | 4291.4 |

*Antistaphylococcique: glycopeptides, linézolide, daptomycine.

Consommations d'antibiotiques - Services de chirurgie ambulatoire (N=26)

(Réseau de surveillance des consommations 2016)

| Molécule | Médiane | P25 | P75 | Minimum | Maximum |
|--|---------|-----|------|---------|---------|
| B-lactamines | 36.0 | 8.8 | 77.2 | 0.1 | 825.7 |
| Penicillines | 17.9 | 3.0 | 57.9 | 0.0 | 588.6 |
| Penicillines G | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| benzylpenicilline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| benzathine benzylpenicilline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Penicilline V (phenoxyethylpenicilline) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 |
| Penicillines M | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 2.6 |
| cloxacilline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 |
| oxacilline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 |
| Penicillines A | 11.5 | 0.5 | 37.6 | 0.0 | 420.2 |
| ampicilline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| amoxicilline | 11.5 | 0.5 | 37.6 | 0.0 | 420.2 |
| Penicillines + inhibiteur | 4.3 | 0.0 | 23.0 | 0.0 | 167.4 |
| penicillines A + inh. | 4.3 | 0.0 | 22.9 | 0.0 | 167.4 |
| amoxicilline ac clavulanique | 4.3 | 0.0 | 22.9 | 0.0 | 167.4 |
| ampicilline sulbactam | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ureido-penicilline + inh. (piperacilline tazobactam) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 |
| carboxypenicillines + inh. (ticarcilline ac clavulanique) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Aminido-penicilline (pivmecillinam) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ureidopenicillines | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| piperacilline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| Carboxypenicillines | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ticarcilline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| temocilline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Cephalosporines, Penemes, Monobactams | 1.2 | 0.0 | 27.1 | 0.0 | 578.1 |
| Cephalosporines | 1.2 | 0.0 | 27.1 | 0.0 | 578.1 |
| C1G+C2G | 0.1 | 0.0 | 27.1 | 0.0 | 566.3 |
| C1G (dont J01DC04) | 0.0 | 0.0 | 6.8 | 0.0 | 526.0 |
| cefalexine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| cefazoline | 0.0 | 0.0 | 6.8 | 0.0 | 526.0 |
| cefadroxil | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

| Molécule | Médiane | P25 | P75 | Minimum | Maximum |
|---|---------|-----|-----|---------|---------|
| cefaclor | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| C2G (sauf J01DC04 et J01DC07) | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 51.3 |
| cefoxitine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.3 |
| cefuroxime | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 51.3 |
| cefamandole | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.4 |
| C3G (dont J01DC07 et J01DE) | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 16.9 |
| C3G Orales (dont J01DC07) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 |
| cefixime | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 |
| cefpodoxime | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| cefotiam | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| C3G Injectables | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 16.9 |
| C3G Inj. inactives sur P. aeruginosa | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 16.9 |
| cefotaxime | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
| ceftriaxone | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 16.7 |
| C3G Inj. actives sur P. aeruginosa | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| ceftazidime | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| cefepime | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ceftazidimeavibactam | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ceftolozanetazobactam | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Autres céphalosporines | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ceftobiprole | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ceftaroline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ceftobiprole+ceftaroline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Penemes | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
| ertapenem | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Penemes actives sur P. aeruginosa | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
| imipenem | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
| meropenem | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| Monobactams (aztreonam) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Tetracyclines | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 216.3 |
| demeclocycline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| doxycycline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 216.3 |
| lymecycline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

| Molécule | Médiane | P25 | P75 | Minimum | Maximum |
|---|---------|-----|------|---------|---------|
| metacycline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| minocycline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| tigecycline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Sulfamides | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.6 |
| cotrimoxazole | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.6 |
| sulfadiazine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| sulfamethizole | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| sulfafurazole (erythromycine+sulfafurazole) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| MLS | 0.1 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 18.2 |
| Macrolides | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 3.6 |
| erythromycine seule | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 |
| erythromycine (erythromycine+sulfafurazole) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| erythromycine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 |
| spiramycine seule | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 |
| spiramycine (spiramycine+ métronidazole) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| spiramycine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 |
| roxithromycine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| josamycine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| clarithromycine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 |
| azithromycine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.3 |
| midecamycine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| telithromycine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lincosamides | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 15.9 |
| clindamycine | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 15.9 |
| lincomycine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 |
| Streptogramines | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 |
| pristinamycine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 |
| Aminosides | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 56.2 |
| amikacine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 |
| gentamicine | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 56.2 |
| tobramycine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| streptomycine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Quinolones | 4.4 | 0.3 | 12.8 | 0.0 | 125.0 |

| Molécule | Médiane | P25 | P75 | Minimum | Maximum |
|--|---------|-----|------|---------|---------|
| Quinolones 1 G | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| acide pipemidique | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| flumequine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Fluoroquinolones | 4.4 | 0.3 | 12.8 | 0.0 | 125.0 |
| Fluoroquinolones orales | 2.8 | 0.0 | 9.8 | 0.0 | 125.0 |
| Fluoroquinolones injectables | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 61.7 |
| norfloxacin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 |
| enoxacin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| pefloxacin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ofloxacin | 1.3 | 0.0 | 9.5 | 0.0 | 125.0 |
| ciprofloxacin | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 37.7 |
| levofloxacin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.6 |
| moxifloxacin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| lomefloxacin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Phénicoles (thiamphenicol) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Glycopeptides | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.7 |
| vancomycine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.7 |
| teicoplanine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
| Imidazoles | 0.2 | 0.0 | 2.7 | 0.0 | 65.1 |
| Imidazolés O | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 65.1 |
| Imidazolés I | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 30.9 |
| metronidazole seul | 0.1 | 0.0 | 2.6 | 0.0 | 65.1 |
| metronidazole (spiramycine+ metronidazole) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| metronidazole | 0.1 | 0.0 | 2.6 | 0.0 | 65.1 |
| ornidazole | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.9 |
| tinidazole | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| "Autres ATB" (J01X + imidazoles oraux: P01AB) | 0.6 | 0.1 | 3.9 | 0.0 | 65.2 |
| J01X | 0.2 | 0.0 | 2.3 | 0.0 | 50.8 |
| acide fusidique | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| fosfomycine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 |
| linezolid | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 |
| colistine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| nitrofurantoïne | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 |

| Molécule | Médiane | P25 | P75 | Minimum | Maximum |
|---|---------|------|-------|---------|---------|
| daptomycine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Antistaphylococciques | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.7 |
| rifampicine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 |
| fidaxomicine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 |
| Consommation antibactériens à usage systémique (J01) | 50.0 | 14.7 | 109.9 | 0.5 | 1008.3 |
| CONSOMMATION TOTALE | 50.0 | 16.0 | 153.5 | 0.8 | 1010.7 |

*Antistaphylococcique: glycopeptides, linézolide, daptomycine.