

Surveillance et prévention de l'antibiorésistance en établissement de santé (SPARES)

Points clés 2019



Consommation des antibiotiques en 2019 dans 1734 établissements



285 Doses définies journalières (DDJ)
pour 1 000 journées d'hospitalisation (JH)



unité standardisée définie par l'OMS, version 2019

Top 3 des antibiotiques consommés



Evolution de la consommation des antibiotiques entre 2012 et 2019

309 DDJ/1 000 JH






*Anti staphylocoque résistant à la méticilline :
glycopeptides, linézolide, daptomycine, tédizolide

**Céphalosporines X^{ème} génération

Surveillance et prévention de l'antibiorésistance en établissement de santé (SPARES)

Points clés 2019

Résistance aux antibiotiques en 2019 dans 991 établissements



Staphylococcus aureus
Résistant à la méticilline
(SARM)

23,3%
des souches de SARM sont
isolées de prélèvements de pus
profond et séreuses

0,17
Densité d'incidence globale
pour 1 000 journées
d'hospitalisation

0,73
Densité d'incidence pour
1 000 journées
d'hospitalisation en
secteur de réanimation




**Entérobactéries produisant
une β -lactamase à spectre
étendu (EBLSE)**

63,4%
des souches d'EBLSE sont
isolées de prélèvements
urinaires

0,53
Densité d'incidence globale
pour 1 000 journées
d'hospitalisation

3,10
Densité d'incidence pour
1 000 journées
d'hospitalisation en
secteur de réanimation


**Principales
EBLSE**



***Escherichia coli* BLSE**

***Klebsiella pneumoniae* BLSE**

***Enterobacter cloacae* complex BLSE**




6,7%
% de BLSE au sein de
l'espèce

0,25
Densité d'incidence
globale pour 1 000
journées d'hospitalisation



22,2%
% de BLSE au sein de
l'espèce

0,17
Densité d'incidence
globale pour 1 000
journées d'hospitalisation



18,9%
% de BLSE au sein de
l'espèce

0,07
Densité d'incidence
globale pour 1 000
journées d'hospitalisation