

Réseau de surveillance des consommations antibiotiques 2021



Détail des consommations d'antibiotiques
par molécule et par type d'activité

Région Ile-de-France

Consommations d'antibiotiques - Ensemble de l'établissement (N=211)
(Réseau de surveillance des consommations 2021)

| Molécule | Médiane | P25 | P75 | Minimum | Maximum |
|--|---------|------|-------|---------|---------|
| B-lactamines | 104.2 | 47.1 | 258.6 | 4.6 | 626.1 |
| Penicillines | 81.0 | 39.5 | 171.3 | 4.0 | 320.4 |
| Penicillines G | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.4 |
| benzylpenicilline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.4 |
| benzathine benzylpenicilline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 |
| Penicilline V (phenoxyethylpenicilline) | 0.3 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 34.9 |
| Penicillines M | 1.0 | 0.0 | 5.6 | 0.0 | 67.7 |
| cloxacilline | 0.9 | 0.0 | 5.1 | 0.0 | 67.7 |
| oxacilline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.6 |
| Penicillines A | 26.4 | 11.0 | 48.6 | 0.0 | 129.4 |
| ampicilline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| amoxicilline | 26.4 | 11.0 | 48.6 | 0.0 | 129.4 |
| Penicillines + inhibiteur | 46.1 | 19.3 | 106.1 | 1.4 | 248.4 |
| penicillines A + inh. | 41.5 | 16.6 | 88.3 | 1.4 | 225.0 |
| amoxicilline ac clavulanique | 41.5 | 16.6 | 88.3 | 1.4 | 225.0 |
| Ratio amoxicilline/amoxicilline ac clavulanique | 0.7 | 0.4 | 1.0 | 0.0 | 10.5 |
| ampicilline sulbactam | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ureido-penicilline + inh. (piperacilline tazobactam) | 3.6 | 0.2 | 14.7 | 0.0 | 91.8 |
| carboxypenicillines + inh. (ticarcilline ac clavulanique) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Aminido-penicilline (pivmecillinam) | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 6.3 |
| Ureidopenicillines | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 23.6 |
| piperacilline | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 23.6 |
| Carboxypenicillines | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 |
| ticarcilline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| temocilline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 |
| Cephalosporines, Penemes, Monobactams | 23.8 | 8.2 | 83.0 | 0.0 | 607.1 |
| Cephalosporines | 20.7 | 7.1 | 68.4 | 0.0 | 607.1 |
| C1G+C2G | 0.9 | 0.0 | 16.0 | 0.0 | 604.7 |
| C1G (dont J01DC04) | 0.8 | 0.0 | 13.5 | 0.0 | 361.6 |
| cefalexine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 |
| cefazoline | 0.7 | 0.0 | 13.5 | 0.0 | 361.6 |
| cefadroxil | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.5 |
| cefaclor | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |

| Molécule | Médiane | P25 | P75 | Minimum | Maximum |
|---|---------|-----|------|---------|---------|
| C2G (sauf J01DC04 et J01DC07) | 0.1 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 243.1 |
| cefoxitine | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 21.1 |
| cefuroxime | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 243.1 |
| cefamandole | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| C3G (dont J01DC07 et J01DE) | 14.3 | 5.1 | 44.3 | 0.0 | 130.5 |
| C3G Orales (dont J01DC07) | 1.1 | 0.2 | 2.3 | 0.0 | 22.6 |
| cefixime | 1.0 | 0.2 | 2.2 | 0.0 | 22.6 |
| cefpodoxime | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 |
| cefotiam | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| C3G Injectables | 11.0 | 3.3 | 41.9 | 0.0 | 130.5 |
| C3G Inj. inactives sur P. aeruginosa | 10.1 | 2.2 | 35.3 | 0.0 | 130.5 |
| cefotaxime | 1.1 | 0.0 | 7.4 | 0.0 | 55.9 |
| ceftriaxone | 7.7 | 1.7 | 19.4 | 0.0 | 128.3 |
| C3G Inj. actives sur P. aeruginosa | 0.9 | 0.0 | 4.7 | 0.0 | 35.2 |
| ceftazidime | 0.4 | 0.0 | 1.9 | 0.0 | 21.4 |
| cefepime | 0.3 | 0.0 | 2.3 | 0.0 | 28.7 |
| ceftazidimeavibactam | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 |
| ceftolozanetazobactam | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 |
| Autres céphalosporines | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
| ceftobiprole | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
| ceftaroline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
| ceftobiprole+ceftaroline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
| Penèmes | 1.3 | 0.1 | 5.8 | 0.0 | 122.0 |
| ertapenem | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 4.2 |
| Penèmes actives sur P. aeruginosa | 1.1 | 0.0 | 5.4 | 0.0 | 122.0 |
| imipenem | 0.5 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 122.0 |
| meropenem | 0.1 | 0.0 | 1.9 | 0.0 | 28.7 |
| Monobactams (aztreonam) | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 3.6 |
| Tetracyclines | 2.7 | 0.4 | 5.4 | 0.0 | 24.2 |
| demeclacycline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 |
| doxycycline | 2.5 | 0.3 | 4.9 | 0.0 | 21.7 |
| lymecycline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.2 |
| metacycline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| minocycline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.2 |
| tigecycline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 |

| Molécule | Médiane | P25 | P75 | Minimum | Maximum |
|---|---------|------|------|---------|---------|
| Sulfamides | 6.1 | 2.1 | 11.6 | 0.0 | 93.8 |
| cotrimoxazole | 6.1 | 2.1 | 11.1 | 0.0 | 63.0 |
| trimethoprime | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| sulfadiazine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.8 |
| sulfamethizole | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| sulfafurazole (erythromycine+sulfafurazole) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| MLS | 11.2 | 4.6 | 20.4 | 0.0 | 67.2 |
| Macrolides | 5.1 | 1.5 | 11.4 | 0.0 | 50.4 |
| erythromycine seule | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 26.9 |
| erythromycine | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 26.9 |
| spiramycine seule | 0.7 | 0.0 | 3.3 | 0.0 | 38.5 |
| spiramycine (spiramycine+ métronidazole) | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.9 |
| spiramycine | 0.8 | 0.1 | 3.4 | 0.0 | 38.6 |
| roxithromycine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.7 |
| josamycine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 |
| clarithromycine | 0.1 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 11.8 |
| azithromycine | 1.2 | 0.2 | 3.9 | 0.0 | 34.6 |
| Lincosamides | 2.6 | 0.3 | 5.8 | 0.0 | 29.3 |
| clindamycine | 2.6 | 0.3 | 5.8 | 0.0 | 29.3 |
| Streptogramines | 1.8 | 0.8 | 2.9 | 0.0 | 16.3 |
| pristinamycine | 1.8 | 0.8 | 2.9 | 0.0 | 16.3 |
| Aminosides | 1.7 | 0.1 | 11.0 | 0.0 | 75.6 |
| amikacine | 0.5 | 0.0 | 3.4 | 0.0 | 56.5 |
| gentamicine | 0.6 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 63.3 |
| tobramycine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.1 |
| streptomycine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Quinolones | 23.2 | 12.0 | 34.7 | 0.0 | 487.6 |
| Fluoroquinolones | 23.2 | 12.0 | 34.7 | 0.0 | 487.6 |
| Fluoroquinolones orales | 19.1 | 10.2 | 28.8 | 0.0 | 476.3 |
| Fluoroquinolones injectables | 1.4 | 0.1 | 6.1 | 0.0 | 61.4 |
| norfloxacine | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 13.4 |
| ofloxacine | 5.4 | 1.8 | 10.6 | 0.0 | 68.1 |
| ciprofloxacine | 5.4 | 2.1 | 10.1 | 0.0 | 29.6 |
| levofloxacine | 7.2 | 2.8 | 12.5 | 0.0 | 475.7 |
| moxifloxacine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 |

| Molécule | Médiane | P25 | P75 | Minimum | Maximum |
|---|---------|------|-------|---------|---------|
| lomefloxacine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| Phénicoles (thiamphenicol) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Glycopeptides | 1.4 | 0.1 | 5.6 | 0.0 | 54.7 |
| vancomycine | 1.3 | 0.1 | 5.4 | 0.0 | 54.7 |
| teicoplanine | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 6.1 |
| dalbavancine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
| Imidazoles | 3.8 | 0.5 | 17.1 | 0.0 | 70.6 |
| Imidazolés O | 0.9 | 0.0 | 3.4 | 0.0 | 20.4 |
| Imidazolés I | 1.5 | 0.0 | 12.2 | 0.0 | 68.5 |
| metronidazole seul | 3.8 | 0.5 | 17.1 | 0.0 | 70.6 |
| metronidazole (spiramycine+ metronidazole) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| metronidazole | 3.8 | 0.5 | 17.1 | 0.0 | 70.6 |
| ornidazole | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.2 |
| tinidazole | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
| "Autres ATB" (J01X + imidazoles oraux: P01AB) | 11.2 | 4.0 | 33.7 | 0.0 | 115.1 |
| J01X | 9.3 | 3.1 | 30.8 | 0.0 | 115.1 |
| acide fusidique | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 |
| fosfomycine | 0.5 | 0.1 | 1.0 | 0.0 | 7.5 |
| linezolide | 0.4 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 23.1 |
| colistine | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 20.9 |
| nitrofurantoïne | 0.5 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 27.2 |
| daptomycine | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 85.7 |
| Antistaphylococciques | 3.1 | 0.5 | 12.0 | 0.0 | 89.7 |
| rifampicine | 3.5 | 0.0 | 9.1 | 0.0 | 158.6 |
| fidaxomicine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
| Consommation antibactériens à usage systémique (J01) | 175.8 | 85.0 | 379.3 | 7.2 | 776.3 |
| CONSOMMATION TOTALE | 185.2 | 89.0 | 393.3 | 8.0 | 781.3 |

*Antistaphylococcique: glycopeptides, daptomycine, linezolide, tedizolide, dalbavancine, ceftaroline, ceftriaxone.

**Consommations d'antibiotiques - Ensemble de l'établissement - Etablissements groupe 1
(>66% lits MCO) et >300 lits (N=23)**
(Réseau de surveillance des consommations 2021)

| Molécule | Médiane | P25 | P75 | Minimum | Maximum |
|--|---------|-------|-------|---------|---------|
| B-lactamines | 271.8 | 257.5 | 328.4 | 136.4 | 375.4 |
| Penicillines | 195.2 | 169.2 | 228.2 | 99.6 | 271.4 |
| Penicillines G | 0.1 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 3.5 |
| benzylpenicilline | 0.1 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 3.5 |
| benzathine benzylpenicilline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
| Penicilline V (phenoxyethylpenicilline) | 1.3 | 0.8 | 2.1 | 0.1 | 19.5 |
| Penicillines M | 9.8 | 4.2 | 21.4 | 0.6 | 44.6 |
| cloxacilline | 9.8 | 4.2 | 21.4 | 0.6 | 44.6 |
| oxacilline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.7 |
| Penicillines A | 63.4 | 48.7 | 77.5 | 33.4 | 99.1 |
| ampicilline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| amoxicilline | 63.4 | 48.7 | 77.5 | 33.4 | 99.1 |
| Penicillines + inhibiteur | 113.4 | 94.5 | 133.3 | 56.4 | 170.9 |
| penicillines A + inh. | 94.0 | 75.4 | 115.6 | 34.5 | 146.7 |
| amoxicilline ac clavulanique | 94.0 | 75.4 | 115.6 | 34.5 | 146.7 |
| Ratio amoxicilline/amoxicilline ac clavulanique | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 1.4 |
| ampicilline sulbactam | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ureido-penicilline + inh. (piperacilline tazobactam) | 19.7 | 13.7 | 24.2 | 7.1 | 48.5 |
| carboxypenicillines + inh. (ticarcilline ac clavulanique) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Aminido-penicilline (pivmecillinam) | 0.2 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 1.7 |
| Ureidopenicillines | 0.8 | 0.4 | 1.9 | 0.0 | 4.7 |
| piperacilline | 0.8 | 0.4 | 1.9 | 0.0 | 4.7 |
| Carboxypenicillines | 0.2 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 1.3 |
| ticarcilline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| temocilline | 0.2 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 1.3 |
| Cephalosporines, Penemes, Monobactams | 86.7 | 69.3 | 104.1 | 36.8 | 146.9 |
| Cephalosporines | 72.3 | 61.7 | 84.6 | 30.4 | 128.3 |
| C1G+C2G | 16.1 | 8.0 | 19.5 | 2.7 | 83.8 |
| C1G (dont J01DC04) | 13.1 | 7.6 | 18.6 | 1.3 | 80.8 |
| cefalexine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| cefazoline | 13.1 | 7.6 | 18.5 | 1.3 | 80.8 |
| cefadroxil | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| cefaclor | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.4 |

| Molécule | Médiane | P25 | P75 | Minimum | Maximum |
|---|---------|------|------|---------|---------|
| C2G (sauf J01DC04 et J01DC07) | 0.3 | 0.2 | 1.9 | 0.1 | 23.3 |
| cefoxitine | 0.3 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 3.7 |
| cefuroxime | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 20.1 |
| cefamandole | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| C3G (dont J01DC07 et J01DE) | 55.5 | 44.5 | 70.5 | 25.8 | 81.5 |
| C3G Orales (dont J01DC07) | 1.9 | 0.7 | 2.5 | 0.1 | 4.8 |
| cefixime | 1.7 | 0.6 | 2.4 | 0.1 | 4.7 |
| cefpodoxime | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
| cefotiam | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| C3G Injectables | 52.6 | 42.6 | 70.1 | 24.7 | 80.7 |
| C3G Inj. inactives sur P. aeruginosa | 37.9 | 35.3 | 49.9 | 19.4 | 63.7 |
| cefotaxime | 16.5 | 12.8 | 34.9 | 3.3 | 55.9 |
| ceftriaxone | 13.5 | 9.8 | 26.8 | 2.3 | 45.1 |
| C3G Inj. actives sur P. aeruginosa | 11.7 | 6.7 | 21.2 | 2.6 | 35.2 |
| ceftazidime | 4.3 | 2.4 | 7.2 | 0.9 | 9.6 |
| cefepime | 6.7 | 3.6 | 14.0 | 0.9 | 28.7 |
| ceftazidimeavibactam | 0.5 | 0.2 | 0.9 | 0.0 | 3.1 |
| ceftolozanetazobactam | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 |
| Autres céphalosporines | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.5 |
| ceftobiprole | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| ceftaroline | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.5 |
| ceftobiprole+ceftaroline | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.8 |
| Penèmes | 9.8 | 6.8 | 14.9 | 3.8 | 30.4 |
| ertapenem | 0.5 | 0.2 | 0.9 | 0.0 | 1.6 |
| Penèmes actives sur P. aeruginosa | 9.6 | 6.4 | 13.3 | 3.6 | 30.2 |
| imipenem | 2.5 | 1.5 | 3.6 | 0.0 | 9.1 |
| meropenem | 6.0 | 3.6 | 10.9 | 2.1 | 28.7 |
| Monobactams (aztreonam) | 0.5 | 0.2 | 1.4 | 0.0 | 2.5 |
| Tetracyclines | 4.4 | 3.5 | 12.5 | 0.0 | 18.6 |
| demeccycline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 |
| doxycycline | 4.4 | 3.0 | 11.4 | 0.0 | 18.2 |
| lymecycline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| metacycline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| minocycline | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.9 |
| tigecycline | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 3.2 |

| Molécule | Médiane | P25 | P75 | Minimum | Maximum |
|---|---------|------|------|---------|---------|
| Sulfamides | 10.7 | 8.9 | 22.3 | 5.4 | 33.0 |
| cotrimoxazole | 10.5 | 8.1 | 22.3 | 5.3 | 31.7 |
| trimethoprime | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| sulfadiazine | 0.1 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 7.2 |
| sulfamethizole | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| sulfafurazole (erythromycine+sulfafurazole) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| MLS | 23.3 | 16.4 | 31.1 | 9.9 | 55.9 |
| Macrolides | 14.5 | 10.5 | 20.5 | 4.8 | 50.4 |
| erythromycine seule | 3.1 | 1.3 | 4.7 | 0.1 | 6.9 |
| erythromycine | 3.1 | 1.3 | 4.7 | 0.1 | 6.9 |
| spiramycine seule | 3.6 | 2.9 | 7.2 | 0.0 | 38.5 |
| spiramycine (spiramycine+ métronidazole) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| spiramycine | 3.6 | 2.9 | 7.2 | 0.0 | 38.6 |
| roxithromycine | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 5.1 |
| josamycine | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.7 |
| clarithromycine | 1.1 | 0.6 | 2.4 | 0.2 | 5.0 |
| azithromycine | 3.8 | 1.8 | 5.6 | 0.5 | 11.9 |
| Lincosamides | 4.8 | 3.5 | 7.1 | 1.5 | 20.3 |
| clindamycine | 4.8 | 3.5 | 7.1 | 1.5 | 20.3 |
| Streptogramines | 2.2 | 0.9 | 2.9 | 0.3 | 4.2 |
| pristinamycine | 2.2 | 0.9 | 2.9 | 0.3 | 4.2 |
| Aminosides | 11.2 | 8.7 | 15.5 | 4.7 | 19.3 |
| amikacine | 5.7 | 2.9 | 7.9 | 2.2 | 12.5 |
| gentamicine | 4.0 | 2.8 | 5.7 | 1.9 | 9.1 |
| tobramycine | 0.3 | 0.0 | 2.6 | 0.0 | 6.4 |
| streptomycine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Quinolones | 31.9 | 23.4 | 39.2 | 13.4 | 50.6 |
| Fluoroquinolones | 31.9 | 23.4 | 39.2 | 13.4 | 50.6 |
| Fluoroquinolones orales | 26.3 | 19.3 | 29.5 | 7.7 | 43.0 |
| Fluoroquinolones injectables | 5.9 | 4.1 | 7.1 | 2.3 | 13.8 |
| norfloxacine | 0.2 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.7 |
| ofloxacine | 7.5 | 3.4 | 10.3 | 0.4 | 16.0 |
| ciprofloxacine | 8.4 | 5.4 | 11.5 | 3.6 | 14.2 |
| levofloxacine | 10.2 | 8.1 | 20.4 | 3.5 | 34.0 |
| moxifloxacine | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.0 | 2.7 |

| Molécule | Médiane | P25 | P75 | Minimum | Maximum |
|---|---------|-------|-------|---------|---------|
| lomefloxacine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Phénicoles (thiamphenicol) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Glycopeptides | 5.7 | 4.8 | 9.5 | 2.2 | 25.0 |
| vancomycine | 5.5 | 4.5 | 9.3 | 1.4 | 20.2 |
| teicoplanine | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.0 | 4.8 |
| dalbavancine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
| Imidazoles | 19.6 | 13.4 | 23.6 | 8.1 | 30.1 |
| Imidazolés O | 3.9 | 0.0 | 5.5 | 0.0 | 8.3 |
| Imidazolés I | 15.4 | 11.5 | 19.6 | 8.1 | 25.2 |
| metronidazole seul | 19.4 | 13.3 | 23.6 | 8.1 | 30.0 |
| metronidazole (spiramycine+ metronidazole) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| metronidazole | 19.4 | 13.3 | 23.6 | 8.1 | 30.0 |
| ornidazole | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.3 |
| tinidazole | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| "Autres ATB" (J01X + imidazoles oraux: P01AB) | 39.7 | 31.1 | 55.4 | 18.0 | 115.1 |
| J01X | 34.8 | 26.8 | 48.9 | 14.6 | 115.1 |
| acide fusidique | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| fosfomycine | 1.5 | 0.7 | 2.5 | 0.1 | 3.0 |
| linezolide | 2.0 | 0.9 | 4.3 | 0.0 | 7.4 |
| colistine | 0.4 | 0.1 | 1.3 | 0.0 | 20.9 |
| nitrofurantoïne | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 0.0 | 1.5 |
| daptomycine | 4.0 | 1.0 | 13.0 | 0.0 | 85.7 |
| Antistaphylococciques | 18.3 | 8.4 | 29.7 | 3.9 | 89.7 |
| rifampicine | 6.3 | 4.1 | 12.0 | 0.0 | 32.6 |
| fidaxomicine | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 3.0 |
| Consommation antibactériens à usage systémique (J01) | 414.6 | 348.3 | 485.4 | 194.7 | 596.8 |
| CONSOMMATION TOTALE | 419.2 | 357.6 | 489.4 | 201.9 | 632.4 |

*Antistaphylococcique: glycopeptides, daptomycine, linezolide, tedizolide, dalbavancine, ceftaroline, ceftriaxone.

Consommations d'antibiotiques - Ensemble de l'établissement - Etablissements groupe 1
 (>66% lits MCO) et <=300 lits (N=64)
 (Réseau de surveillance des consommations 2021)

| Molécule | Médiane | P25 | P75 | Minimum | Maximum |
|--|---------|-------|-------|---------|---------|
| B-lactamines | 261.9 | 182.4 | 336.6 | 8.7 | 626.1 |
| Penicillines | 155.9 | 88.3 | 214.0 | 8.0 | 310.3 |
| Penicillines G | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.4 |
| benzylpenicilline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.4 |
| benzathine benzylpenicilline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| Penicilline V (phenoxyethylpenicilline) | 0.1 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 33.5 |
| Penicillines M | 3.3 | 0.0 | 9.9 | 0.0 | 67.7 |
| cloxacilline | 2.8 | 0.0 | 9.6 | 0.0 | 67.7 |
| oxacilline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.4 |
| Penicillines A | 38.3 | 20.2 | 54.9 | 0.0 | 129.4 |
| ampicilline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| amoxicilline | 38.3 | 20.2 | 54.9 | 0.0 | 129.4 |
| Penicillines + inhibiteur | 103.0 | 56.6 | 148.4 | 6.6 | 236.2 |
| penicillines A + inh. | 84.5 | 48.9 | 122.7 | 5.1 | 225.0 |
| amoxicilline ac clavulanique | 84.5 | 48.9 | 122.7 | 5.1 | 225.0 |
| Ratio amoxicilline/amoxicilline ac clavulanique | 0.5 | 0.3 | 0.9 | 0.0 | 10.5 |
| ampicilline sulbactam | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ureido-penicilline + inh. (piperacilline tazobactam) | 10.9 | 4.4 | 24.0 | 0.0 | 91.8 |
| carboxypenicillines + inh. (ticarcilline ac clavulanique) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Aminido-penicilline (pivmecillinam) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 |
| Ureidopenicillines | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 23.6 |
| piperacilline | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 23.6 |
| Carboxypenicillines | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 |
| ticarcilline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| temocilline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 |
| Cephalosporines, Penemes, Monobactams | 91.1 | 42.4 | 144.5 | 0.6 | 607.1 |
| Cephalosporines | 82.1 | 39.8 | 131.7 | 0.6 | 607.1 |
| C1G+C2G | 31.6 | 6.8 | 88.6 | 0.0 | 604.7 |
| C1G (dont J01DC04) | 25.5 | 6.1 | 76.9 | 0.0 | 361.6 |
| cefalexine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| cefazoline | 25.3 | 6.0 | 76.9 | 0.0 | 361.6 |
| cefadroxil | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.5 |
| cefaclor | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |

| Molécule | Médiane | P25 | P75 | Minimum | Maximum |
|---|---------|------|------|---------|---------|
| C2G (sauf J01DC04 et J01DC07) | 0.4 | 0.0 | 3.2 | 0.0 | 243.1 |
| cefoxitine | 0.2 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 21.1 |
| cefuroxime | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 243.1 |
| cefamandole | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| C3G (dont J01DC07 et J01DE) | 37.5 | 11.0 | 55.1 | 0.0 | 130.5 |
| C3G Orales (dont J01DC07) | 1.1 | 0.0 | 2.3 | 0.0 | 7.6 |
| cefixime | 1.1 | 0.0 | 2.3 | 0.0 | 7.6 |
| cefpodoxime | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 |
| cefotiam | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| C3G Injectables | 36.2 | 10.0 | 53.9 | 0.0 | 130.5 |
| C3G Inj. inactives sur P. aeruginosa | 25.1 | 9.4 | 48.6 | 0.0 | 130.5 |
| cefotaxime | 3.6 | 1.0 | 12.9 | 0.0 | 50.0 |
| ceftriaxone | 18.5 | 6.8 | 33.8 | 0.0 | 128.3 |
| C3G Inj. actives sur P. aeruginosa | 1.9 | 0.5 | 6.5 | 0.0 | 35.2 |
| ceftazidime | 0.8 | 0.0 | 2.9 | 0.0 | 21.4 |
| cefepime | 0.7 | 0.0 | 3.5 | 0.0 | 17.3 |
| ceftazidimeavibactam | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 |
| ceftolozanetazobactam | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Autres céphalosporines | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| ceftobiprole | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ceftaroline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| ceftobiprole+ceftaroline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| Penèmes | 2.7 | 0.3 | 8.7 | 0.0 | 122.0 |
| ertapenem | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 2.8 |
| Penèmes actives sur P. aeruginosa | 2.3 | 0.2 | 8.6 | 0.0 | 122.0 |
| imipenem | 1.7 | 0.1 | 4.3 | 0.0 | 122.0 |
| meropenem | 0.2 | 0.0 | 2.4 | 0.0 | 16.2 |
| Monobactams (aztreonam) | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 2.5 |
| Tetracyclines | 0.8 | 0.0 | 2.8 | 0.0 | 24.2 |
| demeccycline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| doxycycline | 0.7 | 0.0 | 2.8 | 0.0 | 21.7 |
| lymecycline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| metacycline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| minocycline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.2 |
| tigecycline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |

| Molécule | Médiane | P25 | P75 | Minimum | Maximum |
|---|---------|------|------|---------|---------|
| Sulfamides | 5.2 | 1.6 | 12.1 | 0.0 | 59.0 |
| cotrimoxazole | 5.2 | 1.1 | 12.1 | 0.0 | 59.0 |
| trimethoprime | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| sulfadiazine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
| sulfamethizole | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| sulfafurazole (erythromycine+sulfafurazole) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| MLS | 19.5 | 12.0 | 32.8 | 0.0 | 67.2 |
| Macrolides | 7.8 | 1.5 | 18.3 | 0.0 | 44.3 |
| erythromycine seule | 0.8 | 0.0 | 2.8 | 0.0 | 26.9 |
| erythromycine | 0.8 | 0.0 | 2.8 | 0.0 | 26.9 |
| spiramycine seule | 1.8 | 0.0 | 5.6 | 0.0 | 36.2 |
| spiramycine (spiramycine+ métronidazole) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| spiramycine | 1.8 | 0.0 | 5.6 | 0.0 | 36.2 |
| roxithromycine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.7 |
| josamycine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 |
| clarithromycine | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 10.3 |
| azithromycine | 1.9 | 0.0 | 5.9 | 0.0 | 34.6 |
| Lincosamides | 4.9 | 2.5 | 10.3 | 0.0 | 29.3 |
| clindamycine | 4.9 | 2.5 | 10.3 | 0.0 | 29.3 |
| Streptogramines | 1.5 | 0.4 | 2.8 | 0.0 | 11.1 |
| pristinamycine | 1.5 | 0.4 | 2.8 | 0.0 | 11.1 |
| Aminosides | 12.8 | 5.0 | 22.2 | 0.0 | 75.6 |
| amikacine | 2.8 | 0.6 | 8.1 | 0.0 | 56.5 |
| gentamicine | 6.5 | 2.9 | 13.8 | 0.0 | 63.3 |
| tobramycine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.3 |
| streptomycine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Quinolones | 30.9 | 16.2 | 43.6 | 0.9 | 487.6 |
| Fluoroquinolones | 30.9 | 16.2 | 43.6 | 0.9 | 487.6 |
| Fluoroquinolones orales | 20.2 | 12.3 | 30.4 | 0.0 | 476.3 |
| Fluoroquinolones injectables | 7.0 | 1.5 | 13.2 | 0.0 | 61.4 |
| norfloxacine | 0.1 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 13.4 |
| ofloxacine | 10.8 | 4.3 | 17.7 | 0.0 | 68.1 |
| ciprofloxacine | 7.9 | 2.6 | 12.5 | 0.0 | 29.6 |
| levofloxacine | 6.8 | 2.3 | 12.2 | 0.0 | 475.7 |
| moxifloxacine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9 |

| Molécule | Médiane | P25 | P75 | Minimum | Maximum |
|---|---------|-------|-------|---------|---------|
| lomefloxacine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Phénicoles (thiamphenicol) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Glycopeptides | 5.9 | 2.6 | 12.9 | 0.0 | 54.7 |
| vancomycine | 5.4 | 2.6 | 12.3 | 0.0 | 54.7 |
| teicoplanine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.1 |
| dalbavancine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| Imidazoles | 14.2 | 4.4 | 25.3 | 0.0 | 68.6 |
| Imidazolés O | 2.5 | 0.3 | 5.0 | 0.0 | 20.4 |
| Imidazolés I | 11.8 | 1.5 | 21.1 | 0.0 | 56.7 |
| metronidazole seul | 13.1 | 4.4 | 25.3 | 0.0 | 68.6 |
| metronidazole (spiramycine+ metronidazole) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| metronidazole | 13.1 | 4.4 | 25.3 | 0.0 | 68.6 |
| ornidazole | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.2 |
| tinidazole | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| "Autres ATB" (J01X + imidazoles oraux: P01AB) | 34.4 | 15.6 | 51.5 | 0.6 | 91.2 |
| J01X | 30.8 | 12.1 | 45.8 | 0.0 | 88.6 |
| acide fusidique | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| fosfomycine | 0.3 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 7.5 |
| linezolide | 0.6 | 0.0 | 3.1 | 0.0 | 23.1 |
| colistine | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 20.0 |
| nitrofurantoïne | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 27.2 |
| daptomycine | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 42.9 |
| Antistaphylococciques | 9.3 | 3.5 | 20.8 | 0.0 | 68.3 |
| rifampicine | 3.4 | 0.0 | 8.4 | 0.0 | 27.9 |
| fidaxomicine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 |
| Consommation antibactériens à usage systémique (J01) | 386.2 | 266.9 | 497.2 | 13.3 | 776.3 |
| CONSOMMATION TOTALE | 399.1 | 270.0 | 507.9 | 13.3 | 781.3 |

*Antistaphylococcique: glycopeptides, daptomycine, linezolide, tedizolide, dalbavancine, ceftaroline, ceftriaxone.

Consommations d'antibiotiques - Ensemble de l'établissement - Etablissements groupe 2
 (>33% et <=66% lits MCO) (N=19)
 (Réseau de surveillance des consommations 2021)

| Molécule | Médiane | P25 | P75 | Minimum | Maximum |
|--|---------|-------|-------|---------|---------|
| B-lactamines | 181.2 | 141.1 | 241.3 | 87.6 | 433.9 |
| Penicillines | 133.3 | 103.6 | 181.9 | 47.8 | 320.4 |
| Penicillines G | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 6.7 |
| benzylpenicilline | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 6.7 |
| benzathine benzylpenicilline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Penicilline V (phenoxyethylpenicilline) | 0.6 | 0.2 | 1.9 | 0.0 | 34.9 |
| Penicillines M | 4.9 | 2.7 | 10.6 | 0.1 | 13.3 |
| cloxacilline | 3.9 | 1.9 | 9.9 | 0.0 | 13.3 |
| oxacilline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.6 |
| Penicillines A | 39.3 | 29.5 | 56.1 | 4.3 | 78.7 |
| ampicilline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| amoxicilline | 39.3 | 29.5 | 56.1 | 4.3 | 78.7 |
| Penicillines + inhibiteur | 86.2 | 69.1 | 107.6 | 38.9 | 248.4 |
| penicillines A + inh. | 70.7 | 57.4 | 103.6 | 10.5 | 220.0 |
| amoxicilline ac clavulanique | 70.7 | 57.4 | 103.6 | 10.5 | 220.0 |
| Ratio amoxicilline/amoxicilline ac clavulanique | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 1.1 |
| ampicilline sulbactam | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ureido-penicilline + inh. (piperacilline tazobactam) | 12.5 | 5.1 | 20.7 | 3.1 | 28.5 |
| carboxypenicillines + inh. (ticarcilline ac clavulanique) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Aminido-penicilline (pivmecillinam) | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 2.1 |
| Ureidopenicillines | 0.1 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 5.5 |
| piperacilline | 0.1 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 5.5 |
| Carboxypenicillines | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.1 |
| ticarcilline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| temocilline | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.1 |
| Cephalosporines, Penemes, Monobactams | 47.9 | 37.5 | 64.7 | 14.5 | 113.6 |
| Cephalosporines | 44.7 | 26.3 | 62.9 | 14.2 | 102.8 |
| C1G+C2G | 1.9 | 0.4 | 14.1 | 0.0 | 20.0 |
| C1G (dont J01DC04) | 1.5 | 0.4 | 11.9 | 0.0 | 19.2 |
| cefalexine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| cefazoline | 1.5 | 0.4 | 11.9 | 0.0 | 19.2 |
| cefadroxil | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| cefaclor | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |

| Molécule | Médiane | P25 | P75 | Minimum | Maximum |
|---|---------|------|------|---------|---------|
| C2G (sauf J01DC04 et J01DC07) | 0.3 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 3.0 |
| cefoxitine | 0.2 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 2.2 |
| cefuroxime | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 2.8 |
| cefamandole | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| C3G (dont J01DC07 et J01DE) | 40.7 | 25.7 | 59.0 | 13.4 | 85.0 |
| C3G Orales (dont J01DC07) | 1.0 | 0.3 | 3.2 | 0.0 | 7.7 |
| cefixime | 1.0 | 0.2 | 3.2 | 0.0 | 7.7 |
| cefpodoxime | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| cefotiam | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| C3G Injectables | 38.2 | 25.7 | 54.1 | 13.2 | 84.9 |
| C3G Inj. inactives sur P. aeruginosa | 34.9 | 24.5 | 48.2 | 9.5 | 84.0 |
| cefotaxime | 6.4 | 3.3 | 12.8 | 0.0 | 36.1 |
| ceftriaxone | 20.8 | 11.0 | 42.7 | 2.9 | 65.8 |
| C3G Inj. actives sur P. aeruginosa | 2.6 | 0.9 | 5.2 | 0.3 | 26.0 |
| ceftazidime | 1.2 | 0.4 | 2.2 | 0.2 | 6.1 |
| cefepime | 1.4 | 0.3 | 2.3 | 0.0 | 21.0 |
| ceftazidimeavibactam | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 1.2 |
| ceftolozanetazobactam | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Autres céphalosporines | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ceftobiprole | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ceftaroline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ceftobiprole+ceftaroline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Penèmes | 2.4 | 1.0 | 7.5 | 0.4 | 20.0 |
| ertapenem | 0.2 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 4.2 |
| Penèmes actives sur P. aeruginosa | 2.0 | 0.9 | 5.6 | 0.4 | 19.9 |
| imipenem | 1.7 | 0.3 | 3.4 | 0.0 | 10.4 |
| meropenem | 0.6 | 0.3 | 1.6 | 0.0 | 16.5 |
| Monobactams (aztreonam) | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.7 |
| Tetracyclines | 2.9 | 0.7 | 4.6 | 0.0 | 7.4 |
| demeccycline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| doxycycline | 2.9 | 0.7 | 4.6 | 0.0 | 7.3 |
| lymecycline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| metacycline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| minocycline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| tigecycline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |

| Molécule | Médiane | P25 | P75 | Minimum | Maximum |
|---|---------|------|------|---------|---------|
| Sulfamides | 6.9 | 5.4 | 11.5 | 2.2 | 30.7 |
| cotrimoxazole | 6.7 | 5.3 | 11.4 | 2.2 | 30.7 |
| trimethoprime | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| sulfadiazine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.2 |
| sulfamethizole | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| sulfafurazole (erythromycine+sulfafurazole) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| MLS | 16.3 | 9.4 | 23.5 | 1.1 | 47.5 |
| Macrolides | 11.7 | 6.1 | 17.3 | 1.1 | 32.5 |
| erythromycine seule | 0.6 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 9.6 |
| erythromycine | 0.6 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 9.6 |
| spiramycine seule | 3.2 | 1.7 | 6.1 | 0.1 | 17.8 |
| spiramycine (spiramycine+ métronidazole) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 |
| spiramycine | 3.7 | 1.7 | 6.1 | 0.5 | 17.8 |
| roxithromycine | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 3.9 |
| josamycine | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.8 |
| clarithromycine | 0.5 | 0.1 | 1.2 | 0.0 | 3.3 |
| azithromycine | 3.0 | 1.6 | 8.1 | 0.0 | 19.5 |
| Lincosamides | 2.6 | 1.2 | 5.0 | 0.0 | 7.5 |
| clindamycine | 2.6 | 1.2 | 5.0 | 0.0 | 7.5 |
| Streptogramines | 2.3 | 1.8 | 4.1 | 0.0 | 7.8 |
| pristinamycine | 2.3 | 1.8 | 4.1 | 0.0 | 7.8 |
| Aminosides | 7.1 | 2.4 | 9.9 | 0.4 | 33.8 |
| amikacine | 3.1 | 0.8 | 6.0 | 0.0 | 14.7 |
| gentamicine | 1.8 | 0.8 | 4.8 | 0.0 | 20.8 |
| tobramycine | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.6 |
| streptomycine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Quinolones | 26.2 | 14.1 | 41.5 | 6.1 | 169.3 |
| Fluoroquinolones | 26.2 | 14.1 | 41.5 | 6.1 | 169.3 |
| Fluoroquinolones orales | 20.9 | 12.5 | 33.9 | 5.3 | 163.1 |
| Fluoroquinolones injectables | 3.3 | 2.2 | 6.6 | 0.2 | 24.3 |
| norfloxacine | 0.2 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 4.3 |
| ofloxacine | 7.0 | 3.7 | 12.8 | 0.0 | 21.2 |
| ciprofloxacine | 6.3 | 4.4 | 13.1 | 2.0 | 20.3 |
| levofloxacine | 6.4 | 4.6 | 16.3 | 3.0 | 99.7 |
| moxifloxacine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 |

| Molécule | Médiane | P25 | P75 | Minimum | Maximum |
|---|---------|-------|-------|---------|---------|
| lomefloxacine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Phénicoles (thiamphenicol) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Glycopeptides | 2.5 | 1.3 | 5.2 | 0.3 | 15.5 |
| vancomycine | 2.4 | 1.2 | 5.0 | 0.3 | 14.4 |
| teicoplanine | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 1.1 |
| dalbavancine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Imidazoles | 10.1 | 4.4 | 18.4 | 0.0 | 43.3 |
| Imidazolés O | 3.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 6.8 |
| Imidazolés I | 7.1 | 2.6 | 13.5 | 0.0 | 43.3 |
| metronidazole seul | 10.1 | 4.4 | 18.4 | 0.0 | 43.3 |
| metronidazole (spiramycine+ metronidazole) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| metronidazole | 10.1 | 4.4 | 18.4 | 0.0 | 43.3 |
| ornidazole | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| tinidazole | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
| "Autres ATB" (J01X + imidazoles oraux: P01AB) | 23.0 | 10.8 | 29.8 | 6.3 | 60.0 |
| J01X | 18.0 | 9.9 | 24.6 | 4.7 | 60.0 |
| acide fusidique | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 1.2 |
| fosfomycine | 0.6 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 3.5 |
| linezolide | 1.2 | 0.1 | 2.6 | 0.0 | 11.8 |
| colistine | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 4.1 |
| nitrofurantoïne | 0.6 | 0.3 | 1.1 | 0.0 | 7.7 |
| daptomycine | 0.7 | 0.1 | 4.7 | 0.0 | 13.3 |
| Antistaphylococciques | 4.7 | 2.1 | 12.3 | 0.6 | 26.5 |
| rifampicine | 5.0 | 3.0 | 9.7 | 1.3 | 158.6 |
| fidaxomicine | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 1.2 |
| Consommation antibactériens à usage systémique (J01) | 256.3 | 209.9 | 372.3 | 120.6 | 665.7 |
| CONSOMMATION TOTALE | 265.7 | 216.9 | 384.8 | 127.4 | 669.0 |

*Antistaphylococcique: glycopeptides, daptomycine, linezolide, tedizolide, dalbavancine, ceftaroline, ceftriaxone.

Consommations d'antibiotiques - Ensemble de l'établissement - Etablissements groupe 3
 (>66% lits MCO) (N=105)
 (Réseau de surveillance des consommations 2021)

| Molécule | Médiane | P25 | P75 | Minimum | Maximum |
|--|---------|------|------|---------|---------|
| B-lactamines | 49.7 | 29.3 | 83.6 | 4.6 | 254.8 |
| Penicillines | 43.2 | 24.9 | 64.8 | 4.0 | 216.3 |
| Penicillines G | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 |
| benzylpenicilline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| benzathine benzylpenicilline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 |
| Penicilline V (phenoxyethylpenicilline) | 0.1 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 32.1 |
| Penicillines M | 0.2 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 9.3 |
| cloxacilline | 0.2 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 9.3 |
| oxacilline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
| Penicillines A | 13.1 | 8.1 | 26.6 | 0.0 | 75.1 |
| ampicilline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| amoxicilline | 13.1 | 8.1 | 26.6 | 0.0 | 75.1 |
| Penicillines + inhibiteur | 23.0 | 12.4 | 35.9 | 1.4 | 154.5 |
| penicillines A + inh. | 21.7 | 12.1 | 32.6 | 1.4 | 144.5 |
| amoxicilline ac clavulanique | 21.7 | 12.1 | 32.6 | 1.4 | 144.5 |
| Ratio amoxicilline/amoxicilline ac clavulanique | 0.7 | 0.5 | 1.2 | 0.0 | 4.6 |
| ampicilline sulbactam | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ureido-penicilline + inh. (piperacilline tazobactam) | 0.4 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 27.2 |
| carboxypenicillines + inh. (ticarcilline ac clavulanique) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Aminido-penicilline (pivmecillinam) | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 6.3 |
| Ureidopenicillines | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 |
| piperacilline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 |
| Carboxypenicillines | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
| ticarcilline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| temocilline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
| Cephalosporines, Penemes, Monobactams | 8.7 | 1.9 | 14.2 | 0.0 | 65.1 |
| Cephalosporines | 8.0 | 1.2 | 12.6 | 0.0 | 64.7 |
| C1G+C2G | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 4.2 |
| C1G (dont J01DC04) | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 3.5 |
| cefalexine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 |
| cefazoline | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 3.5 |
| cefadroxil | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| cefaclor | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |

| Molécule | Médiane | P25 | P75 | Minimum | Maximum |
|---|---------|-----|------|---------|---------|
| C2G (sauf J01DC04 et J01DC07) | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.9 |
| cefoxitine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
| cefuroxime | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 |
| cefamandole | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| C3G (dont J01DC07 et J01DE) | 7.4 | 1.1 | 11.8 | 0.0 | 64.7 |
| C3G Orales (dont J01DC07) | 0.9 | 0.3 | 1.8 | 0.0 | 22.6 |
| cefixime | 0.9 | 0.2 | 1.8 | 0.0 | 22.6 |
| cefpodoxime | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 |
| cefotiam | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| C3G Injectables | 4.6 | 0.3 | 8.9 | 0.0 | 64.1 |
| C3G Inj. inactives sur P. aeruginosa | 4.1 | 0.2 | 8.2 | 0.0 | 63.4 |
| cefotaxime | 0.2 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 8.5 |
| ceftriaxone | 3.2 | 0.2 | 6.8 | 0.0 | 63.2 |
| C3G Inj. actives sur P. aeruginosa | 0.2 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 8.3 |
| ceftazidime | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 7.6 |
| cefepime | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 2.9 |
| ceftazidimeavibactam | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 |
| ceftolozanetazobactam | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Autres céphalosporines | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| ceftobiprole | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
| ceftaroline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| ceftobiprole+ceftaroline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
| Penèmes | 0.5 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 16.8 |
| ertapenem | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 2.0 |
| Penèmes actives sur P. aeruginosa | 0.2 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 16.2 |
| imipenem | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 14.6 |
| meropenem | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 7.0 |
| Monobactams (aztreonam) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 |
| Tetracyclines | 3.2 | 1.1 | 6.2 | 0.0 | 21.0 |
| demeclacycline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| doxycycline | 3.0 | 0.9 | 5.7 | 0.0 | 19.4 |
| lymecycline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.2 |
| metacycline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| minocycline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 |
| tigecycline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 |

| Molécule | Médiane | P25 | P75 | Minimum | Maximum |
|---|---------|-----|------|---------|---------|
| Sulfamides | 4.4 | 1.0 | 9.7 | 0.0 | 93.8 |
| cotrimoxazole | 4.4 | 1.0 | 9.0 | 0.0 | 63.0 |
| trimethoprime | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| sulfadiazine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.8 |
| sulfamethizole | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| sulfafurazole (erythromycine+sulfafurazole) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| MLS | 6.0 | 3.1 | 10.0 | 0.0 | 35.4 |
| Macrolides | 2.3 | 1.1 | 5.3 | 0.0 | 25.1 |
| erythromycine seule | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 6.7 |
| erythromycine | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 6.7 |
| spiramycine seule | 0.2 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 8.4 |
| spiramycine (spiramycine+ métronidazole) | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 1.5 |
| spiramycine | 0.4 | 0.1 | 1.0 | 0.0 | 8.4 |
| roxithromycine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.1 |
| josamycine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
| clarithromycine | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 11.8 |
| azithromycine | 0.8 | 0.2 | 1.6 | 0.0 | 23.7 |
| Lincosamides | 0.7 | 0.0 | 2.7 | 0.0 | 9.9 |
| clindamycine | 0.7 | 0.0 | 2.7 | 0.0 | 9.9 |
| Streptogramines | 1.6 | 0.8 | 2.7 | 0.0 | 16.3 |
| pristinamycine | 1.6 | 0.8 | 2.7 | 0.0 | 16.3 |
| Aminosides | 0.1 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 25.1 |
| amikacine | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 7.4 |
| gentamicine | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 8.8 |
| tobramycine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.1 |
| streptomycine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Quinolones | 16.5 | 4.3 | 26.5 | 0.0 | 60.4 |
| Fluoroquinolones | 16.5 | 4.3 | 26.5 | 0.0 | 60.4 |
| Fluoroquinolones orales | 15.9 | 4.3 | 24.7 | 0.0 | 59.9 |
| Fluoroquinolones injectables | 0.1 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 13.7 |
| norfloxacine | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 2.4 |
| ofloxacine | 3.7 | 0.9 | 6.3 | 0.0 | 30.9 |
| ciprofloxacine | 3.5 | 0.9 | 7.5 | 0.0 | 21.3 |
| levofloxacine | 5.9 | 1.2 | 12.1 | 0.0 | 33.4 |
| moxifloxacine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |

| Molécule | Médiane | P25 | P75 | Minimum | Maximum |
|---|---------|------|-------|---------|---------|
| lomefloxacine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| Phénicoles (thiamphenicol) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Glycopeptides | 0.1 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 20.1 |
| vancomycine | 0.1 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 20.1 |
| teicoplanine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.7 |
| dalbavancine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Imidazoles | 0.7 | 0.1 | 2.4 | 0.0 | 70.6 |
| Imidazolés O | 0.4 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 5.7 |
| Imidazolés I | 0.1 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 68.5 |
| metronidazole seul | 0.7 | 0.1 | 2.4 | 0.0 | 70.6 |
| metronidazole (spiramycine+ metronidazole) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| metronidazole | 0.7 | 0.1 | 2.4 | 0.0 | 70.6 |
| ornidazole | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 |
| tinidazole | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| "Autres ATB" (J01X + imidazoles oraux: P01AB) | 4.3 | 1.6 | 8.0 | 0.0 | 74.2 |
| J01X | 3.7 | 1.2 | 7.3 | 0.0 | 72.1 |
| acide fusidique | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 |
| fosfomycine | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 0.0 | 4.4 |
| linezolide | 0.2 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 11.7 |
| colistine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.5 |
| nitrofurantoïne | 0.6 | 0.2 | 1.7 | 0.0 | 13.8 |
| daptomycine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.6 |
| Antistaphylococciques | 0.9 | 0.0 | 2.7 | 0.0 | 21.3 |
| rifampicine | 1.9 | 0.0 | 8.2 | 0.0 | 38.6 |
| fidaxomicine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 |
| Consommation antibactériens à usage systémique (J01) | 91.0 | 56.9 | 141.3 | 7.2 | 379.3 |
| CONSOMMATION TOTALE | 98.3 | 56.9 | 152.2 | 8.0 | 393.3 |

*Antistaphylococcique: glycopeptides, daptomycine, linezolide, tedizolide, dalbavancine, ceftaroline, ceftriaxone.

Consommations d'antibiotiques - Services de médecine (N=97)
(Réseau de surveillance des consommations 2021)

| Molécule | Médiane | P25 | P75 | Minimum | Maximum |
|--|---------|-------|-------|---------|---------|
| B-lactamines | 294.9 | 223.6 | 337.5 | 35.5 | 659.2 |
| Penicillines | 207.3 | 164.6 | 237.9 | 24.8 | 565.7 |
| Penicillines G | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 6.2 |
| benzylpenicilline | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 6.2 |
| benzathine benzylpenicilline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
| Penicilline V (phenoxyethylpenicilline) | 0.6 | 0.0 | 1.9 | 0.0 | 59.6 |
| Penicillines M | 6.9 | 2.1 | 13.4 | 0.0 | 41.2 |
| cloxacilline | 5.9 | 1.3 | 12.1 | 0.0 | 41.2 |
| oxacilline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.8 |
| Penicillines A | 44.3 | 31.3 | 66.3 | 2.3 | 121.9 |
| ampicilline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| amoxicilline | 44.3 | 31.3 | 66.3 | 2.3 | 121.9 |
| Penicillines + inhibiteur | 138.7 | 93.4 | 174.5 | 13.5 | 441.8 |
| penicillines A + inh. | 112.4 | 72.4 | 145.8 | 13.3 | 369.1 |
| amoxicilline ac clavulanique | 112.4 | 72.4 | 145.8 | 13.3 | 369.1 |
| Ratio amoxicilline/amoxicilline ac clavulanique | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 1.7 |
| ampicilline sulbactam | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ureido-penicilline + inh. (piperacilline tazobactam) | 16.5 | 8.6 | 28.9 | 0.0 | 126.6 |
| carboxypenicillines + inh. (ticarcilline ac clavulanique) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Aminido-penicilline (pivmecillinam) | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 5.6 |
| Ureidopenicillines | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 4.6 |
| piperacilline | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 4.6 |
| Carboxypenicillines | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 2.7 |
| ticarcilline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| temocilline | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 2.7 |
| Cephalosporines, Penemes, Monobactams | 76.5 | 52.1 | 98.7 | 10.4 | 264.8 |
| Cephalosporines | 69.3 | 48.8 | 85.8 | 9.6 | 259.6 |
| C1G+C2G | 3.0 | 0.8 | 9.4 | 0.0 | 52.0 |
| C1G (dont J01DC04) | 2.7 | 0.5 | 7.1 | 0.0 | 52.0 |
| cefalexine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| cefazoline | 2.7 | 0.5 | 7.1 | 0.0 | 52.0 |
| cefadroxil | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| cefaclor | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 |

| Molécule | Médiane | P25 | P75 | Minimum | Maximum |
|---|---------|------|------|---------|---------|
| C2G (sauf J01DC04 et J01DC07) | 0.2 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 12.7 |
| cefoxitine | 0.2 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 9.8 |
| cefuroxime | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.8 |
| cefamandole | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| C3G (dont J01DC07 et J01DE) | 60.7 | 42.3 | 77.6 | 9.6 | 258.9 |
| C3G Orales (dont J01DC07) | 0.9 | 0.3 | 3.4 | 0.0 | 32.6 |
| cefixime | 0.9 | 0.2 | 3.4 | 0.0 | 32.6 |
| cefpodoxime | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| cefotiam | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| C3G Injectables | 59.3 | 41.0 | 76.7 | 9.0 | 226.2 |
| C3G Inj. inactives sur P. aeruginosa | 48.3 | 36.5 | 74.4 | 6.5 | 223.6 |
| cefotaxime | 10.6 | 2.8 | 20.3 | 0.0 | 65.5 |
| ceftriaxone | 31.9 | 15.3 | 56.2 | 4.1 | 176.0 |
| C3G Inj. actives sur P. aeruginosa | 4.1 | 1.1 | 8.1 | 0.0 | 25.7 |
| ceftazidime | 1.8 | 0.6 | 4.0 | 0.0 | 21.4 |
| cefepime | 1.6 | 0.1 | 4.0 | 0.0 | 21.5 |
| ceftazidimeavibactam | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 2.9 |
| ceftolozanetazobactam | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
| Autres céphalosporines | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| ceftobiprole | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| ceftaroline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| ceftobiprole+ceftaroline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 |
| Penèmes | 4.7 | 1.6 | 8.9 | 0.0 | 111.8 |
| ertapenem | 0.2 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 6.2 |
| Penèmes actives sur P. aeruginosa | 4.2 | 1.3 | 7.1 | 0.0 | 110.2 |
| imipenem | 2.1 | 0.6 | 4.2 | 0.0 | 106.8 |
| meropenem | 1.1 | 0.0 | 3.4 | 0.0 | 25.2 |
| Monobactams (aztreonam) | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 3.2 |
| Tetracyclines | 1.8 | 0.0 | 4.9 | 0.0 | 25.3 |
| demeccycline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 |
| doxycycline | 1.8 | 0.0 | 4.8 | 0.0 | 24.5 |
| lymecycline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| metacycline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| minocycline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 |
| tigecycline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 |

| Molécule | Médiane | P25 | P75 | Minimum | Maximum |
|---|---------|------|------|---------|---------|
| Sulfamides | 11.3 | 5.3 | 21.4 | 0.0 | 105.4 |
| cotrimoxazole | 11.0 | 5.3 | 19.0 | 0.0 | 105.4 |
| trimethoprime | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| sulfadiazine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.1 |
| sulfamethizole | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| sulfafurazole (erythromycine+sulfafurazole) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| MLS | 24.7 | 14.9 | 41.1 | 0.3 | 182.0 |
| Macrolides | 16.5 | 8.1 | 29.7 | 0.0 | 178.1 |
| erythromycine seule | 0.6 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 13.6 |
| erythromycine | 0.6 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 13.6 |
| spiramycine seule | 6.4 | 2.2 | 14.7 | 0.0 | 127.3 |
| spiramycine (spiramycine+ métronidazole) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 |
| spiramycine | 6.4 | 2.2 | 14.7 | 0.0 | 127.3 |
| roxithromycine | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 17.0 |
| josamycine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 |
| clarithromycine | 0.6 | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 12.0 |
| azithromycine | 3.2 | 1.2 | 8.4 | 0.0 | 141.5 |
| Lincosamides | 3.4 | 1.1 | 6.3 | 0.0 | 23.1 |
| clindamycine | 3.4 | 1.1 | 6.3 | 0.0 | 23.1 |
| Streptogramines | 3.1 | 1.7 | 6.1 | 0.0 | 14.1 |
| pristinamycine | 3.1 | 1.7 | 6.1 | 0.0 | 14.1 |
| Aminosides | 6.5 | 3.7 | 12.1 | 0.1 | 130.0 |
| amikacine | 2.9 | 1.4 | 4.9 | 0.0 | 119.0 |
| gentamicine | 2.4 | 1.3 | 4.7 | 0.0 | 22.1 |
| tobramycine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.4 |
| streptomycine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Quinolones | 35.7 | 26.3 | 48.8 | 2.6 | 145.1 |
| Fluoroquinolones | 35.7 | 26.3 | 48.8 | 2.6 | 145.1 |
| Fluoroquinolones orales | 27.2 | 15.3 | 39.3 | 2.4 | 106.8 |
| Fluoroquinolones injectables | 5.8 | 2.7 | 13.1 | 0.0 | 138.2 |
| norfloxacine | 0.1 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 17.2 |
| ofloxacine | 10.1 | 4.3 | 18.9 | 0.0 | 68.1 |
| ciprofloxacine | 9.3 | 6.0 | 14.4 | 0.0 | 140.3 |
| levofloxacine | 11.7 | 5.1 | 18.9 | 0.0 | 90.2 |
| moxifloxacine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.7 |

| Molécule | Médiane | P25 | P75 | Minimum | Maximum |
|---|---------|-------|-------|---------|---------|
| lomefloxacine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Phénicoles (thiamphenicol) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Glycopeptides | 4.4 | 2.2 | 8.5 | 0.0 | 53.9 |
| vancomycine | 4.1 | 1.9 | 7.5 | 0.0 | 53.9 |
| teicoplanine | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 7.2 |
| dalbavancine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| Imidazoles | 16.8 | 8.9 | 26.4 | 0.0 | 185.0 |
| Imidazolés O | 4.2 | 0.3 | 6.6 | 0.0 | 20.4 |
| Imidazolés I | 12.6 | 6.6 | 19.3 | 0.0 | 177.4 |
| metronidazole seul | 16.8 | 8.9 | 26.4 | 0.0 | 185.0 |
| metronidazole (spiramycine+ metronidazole) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| metronidazole | 16.8 | 8.9 | 26.4 | 0.0 | 185.0 |
| ornidazole | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| tinidazole | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
| "Autres ATB" (J01X + imidazoles oraux: P01AB) | 31.1 | 21.7 | 45.3 | 1.7 | 185.0 |
| J01X | 27.5 | 16.6 | 39.0 | 1.7 | 177.4 |
| acide fusidique | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 |
| fosfomycine | 0.5 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 4.5 |
| linezolide | 0.8 | 0.0 | 3.3 | 0.0 | 29.5 |
| colistine | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 25.6 |
| nitrofurantoïne | 0.6 | 0.1 | 1.2 | 0.0 | 8.5 |
| daptomycine | 0.6 | 0.0 | 4.3 | 0.0 | 36.9 |
| Antistaphylococciques | 8.9 | 3.8 | 17.0 | 0.0 | 54.1 |
| rifampicine | 4.1 | 1.2 | 7.8 | 0.0 | 52.1 |
| fidaxomicine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.9 |
| Consommation antibactériens à usage systémique (J01) | 423.3 | 331.3 | 494.2 | 50.6 | 865.9 |
| CONSOMMATION TOTALE | 437.6 | 347.3 | 502.3 | 55.4 | 872.2 |

*Antistaphylococcique: glycopeptides, daptomycine, linezolide, tedizolide, dalbavancine, ceftaroline, ceftriaxone.

Consommations d'antibiotiques - Services de réanimation (N=47)
(Réseau de surveillance des consommations 2021)

| Molécule | Médiane | P25 | P75 | Minimum | Maximum |
|--|---------|-------|-------|---------|---------|
| B-lactamines | 718.9 | 596.3 | 820.7 | 37.6 | 1105.9 |
| Penicillines | 354.9 | 271.4 | 439.3 | 17.8 | 759.4 |
| Penicillines G | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.6 |
| benzylpenicilline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.6 |
| benzathine benzylpenicilline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| Penicilline V (phenoxyethylpenicilline) | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 10.3 |
| Penicillines M | 42.1 | 20.1 | 77.0 | 0.0 | 140.4 |
| cloxacilline | 36.9 | 19.9 | 70.1 | 0.0 | 140.4 |
| oxacilline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39.3 |
| Penicillines A | 68.7 | 44.0 | 103.1 | 7.6 | 215.0 |
| ampicilline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| amoxicilline | 68.7 | 44.0 | 103.1 | 7.6 | 215.0 |
| Penicillines + inhibiteur | 218.0 | 154.9 | 263.3 | 7.5 | 563.1 |
| penicillines A + inh. | 116.9 | 81.1 | 160.4 | 7.5 | 455.2 |
| amoxicilline ac clavulanique | 116.9 | 81.1 | 160.4 | 7.5 | 454.7 |
| Ratio amoxicilline/amoxicilline ac clavulanique | 0.6 | 0.4 | 1.0 | 0.1 | 3.2 |
| ampicilline sulbactam | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
| ureido-penicilline + inh. (piperacilline tazobactam) | 91.2 | 67.1 | 122.1 | 0.0 | 236.9 |
| carboxypenicillines + inh. (ticarcilline ac clavulanique) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Aminido-penicilline (pivmecillinam) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 |
| Ureidopenicillines | 7.5 | 0.8 | 18.5 | 0.0 | 55.9 |
| piperacilline | 7.5 | 0.8 | 18.5 | 0.0 | 55.9 |
| Carboxypenicillines | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 10.5 |
| ticarcilline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| temocilline | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 10.5 |
| Cephalosporines, Penemes, Monobactams | 333.9 | 229.4 | 400.6 | 19.7 | 651.4 |
| Cephalosporines | 224.1 | 151.9 | 299.4 | 19.7 | 541.7 |
| C1G+C2G | 11.6 | 3.4 | 47.5 | 0.0 | 244.2 |
| C1G (dont J01DC04) | 11.6 | 3.0 | 45.7 | 0.0 | 244.2 |
| cefalexine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| cefazoline | 11.6 | 3.0 | 45.7 | 0.0 | 244.2 |
| cefadroxil | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| cefaclor | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

| Molécule | Médiane | P25 | P75 | Minimum | Maximum |
|---|---------|-------|-------|---------|---------|
| C2G (sauf J01DC04 et J01DC07) | 0.2 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 92.7 |
| cefoxitine | 0.1 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 8.2 |
| cefuroxime | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 89.9 |
| cefamandole | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| C3G (dont J01DC07 et J01DE) | 194.9 | 142.9 | 256.6 | 19.6 | 518.7 |
| C3G Orales (dont J01DC07) | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 6.7 |
| cefixime | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 |
| cefpodoxime | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.7 |
| cefotiam | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| C3G Injectables | 194.9 | 142.5 | 255.7 | 19.3 | 518.7 |
| C3G Inj. inactives sur P. aeruginosa | 113.7 | 79.4 | 150.3 | 2.6 | 440.1 |
| cefotaxime | 81.0 | 48.3 | 124.6 | 0.0 | 430.9 |
| ceftriaxone | 10.6 | 6.9 | 31.7 | 0.2 | 174.0 |
| C3G Inj. actives sur P. aeruginosa | 78.6 | 48.5 | 110.1 | 11.1 | 206.3 |
| ceftazidime | 20.0 | 14.3 | 33.1 | 0.9 | 100.6 |
| cefepime | 46.2 | 22.2 | 65.5 | 0.0 | 146.7 |
| ceftazidimeavibactam | 3.1 | 0.0 | 9.0 | 0.0 | 37.2 |
| ceftolozanetazobactam | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 |
| Autres céphalosporines | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 |
| ceftobiprole | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 |
| ceftaroline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 |
| ceftobiprole+ceftaroline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 |
| Penèmes | 89.8 | 56.7 | 121.7 | 0.0 | 217.1 |
| ertapenem | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 6.1 |
| Penèmes actives sur P. aeruginosa | 85.5 | 56.2 | 115.6 | 0.0 | 217.1 |
| imipenem | 26.2 | 11.5 | 51.9 | 0.0 | 165.3 |
| meropenem | 41.4 | 16.1 | 89.5 | 0.0 | 171.5 |
| Monobactams (aztreonam) | 1.8 | 0.0 | 5.4 | 0.0 | 17.1 |
| Tetracyclines | 3.5 | 0.0 | 11.4 | 0.0 | 48.9 |
| demeccycline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| doxycycline | 0.9 | 0.0 | 6.4 | 0.0 | 45.1 |
| lymecycline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| metacycline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| minocycline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.2 |
| tigecycline | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 17.9 |

| Molécule | Médiane | P25 | P75 | Minimum | Maximum |
|---|---------|------|-------|---------|---------|
| Sulfamides | 46.8 | 24.3 | 61.4 | 0.0 | 254.9 |
| cotrimoxazole | 46.8 | 24.3 | 61.4 | 0.0 | 254.9 |
| trimethoprime | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| sulfadiazine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.3 |
| sulfamethizole | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| sulfafurazole (erythromycine+sulfafurazole) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| MLS | 60.7 | 39.7 | 95.3 | 3.7 | 327.2 |
| Macrolides | 52.0 | 37.0 | 85.1 | 3.4 | 322.4 |
| erythromycine seule | 23.7 | 9.1 | 48.5 | 0.0 | 179.5 |
| erythromycine | 23.7 | 9.1 | 48.5 | 0.0 | 179.5 |
| spiramycine seule | 16.1 | 7.2 | 23.2 | 0.1 | 313.7 |
| spiramycine (spiramycine+ métronidazole) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
| spiramycine | 16.1 | 7.2 | 23.2 | 0.1 | 313.7 |
| roxithromycine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.5 |
| josamycine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 |
| clarithromycine | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 0.0 | 11.5 |
| azithromycine | 2.4 | 0.0 | 11.0 | 0.0 | 93.8 |
| Lincosamides | 4.3 | 2.2 | 7.5 | 0.0 | 24.8 |
| clindamycine | 4.3 | 2.2 | 7.5 | 0.0 | 24.8 |
| Streptogramines | 0.7 | 0.0 | 2.1 | 0.0 | 32.6 |
| pristinamycine | 0.7 | 0.0 | 2.1 | 0.0 | 32.6 |
| Aminosides | 88.0 | 52.0 | 125.7 | 14.8 | 293.3 |
| amikacine | 62.2 | 38.4 | 94.0 | 5.8 | 265.5 |
| gentamicine | 10.6 | 7.7 | 20.8 | 0.0 | 58.0 |
| tobramycine | 1.0 | 0.0 | 6.5 | 0.0 | 56.2 |
| streptomycine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Quinolones | 58.5 | 42.7 | 88.6 | 5.3 | 226.5 |
| Fluoroquinolones | 58.5 | 42.7 | 88.6 | 5.3 | 226.5 |
| Fluoroquinolones orales | 13.3 | 8.0 | 23.8 | 0.3 | 145.4 |
| Fluoroquinolones injectables | 47.2 | 26.7 | 68.3 | 0.0 | 213.5 |
| norfloxacine | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 51.6 |
| ofloxacine | 5.4 | 1.9 | 13.7 | 0.0 | 37.7 |
| ciprofloxacine | 23.6 | 10.8 | 34.4 | 0.6 | 109.8 |
| levofloxacine | 28.4 | 13.8 | 39.7 | 0.0 | 138.5 |
| moxifloxacine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.5 |

| Molécule | Médiane | P25 | P75 | Minimum | Maximum |
|---|---------|-------|--------|---------|---------|
| lomefloxacine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Phénicoles (thiamphenicol) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Glycopeptides | 41.1 | 20.1 | 60.3 | 1.4 | 140.2 |
| vancomycine | 41.1 | 20.1 | 59.7 | 1.4 | 140.2 |
| teicoplanine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.3 |
| dalbavancine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Imidazoles | 24.4 | 17.1 | 37.0 | 2.6 | 84.6 |
| Imidazolés O | 1.5 | 0.0 | 2.7 | 0.0 | 25.6 |
| Imidazolés I | 23.2 | 15.5 | 33.4 | 1.6 | 84.6 |
| metronidazole seul | 24.4 | 17.1 | 37.0 | 2.6 | 84.6 |
| metronidazole (spiramycine+ metronidazole) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| metronidazole | 24.4 | 17.1 | 37.0 | 2.6 | 84.6 |
| ornidazole | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 |
| tinidazole | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 |
| "Autres ATB" (J01X + imidazoles oraux: P01AB) | 119.1 | 67.9 | 170.5 | 27.1 | 370.4 |
| J01X | 110.3 | 62.4 | 170.5 | 27.1 | 370.4 |
| acide fusidique | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.2 |
| fosfomycine | 0.9 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 25.9 |
| linezolide | 16.7 | 7.0 | 30.2 | 0.0 | 129.0 |
| colistine | 3.0 | 1.2 | 9.3 | 0.0 | 166.3 |
| nitrofurantoïne | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 10.7 |
| daptomycine | 5.0 | 0.0 | 20.3 | 0.0 | 308.4 |
| Antistaphylococciques | 67.4 | 43.6 | 108.4 | 10.4 | 317.9 |
| rifampicine | 9.9 | 3.4 | 15.3 | 0.0 | 33.1 |
| fidaxomicine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.8 |
| Consommation antibactériens à usage systémique (J01) | 1145.1 | 908.3 | 1365.7 | 206.4 | 2056.3 |
| CONSOMMATION TOTALE | 1168.3 | 912.0 | 1378.3 | 206.4 | 2056.3 |

*Antistaphylococcique: glycopeptides, daptomycine, linezolide, tedizolide, dalbavancine, ceftaroline, ceftriaxone.

Consommations d'antibiotiques - Services de pédiatrie (N=40)
(Réseau de surveillance des consommations 2021)

| Molécule | Médiane | P25 | P75 | Minimum | Maximum |
|--|---------|------|-------|---------|---------|
| B-lactamines | 124.4 | 60.6 | 212.7 | 18.5 | 382.6 |
| Penicillines | 84.9 | 38.2 | 134.7 | 9.2 | 247.0 |
| Penicillines G | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 |
| benzylpenicilline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 |
| benzathine benzylpenicilline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| Penicilline V (phenoxyethylpenicilline) | 3.2 | 0.0 | 7.6 | 0.0 | 33.5 |
| Penicillines M | 1.2 | 0.0 | 5.1 | 0.0 | 20.3 |
| cloxacilline | 1.0 | 0.0 | 4.4 | 0.0 | 19.8 |
| oxacilline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.1 |
| Penicillines A | 35.4 | 17.2 | 51.5 | 9.0 | 110.7 |
| ampicilline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| amoxicilline | 35.4 | 17.2 | 51.5 | 9.0 | 110.7 |
| Penicillines + inhibiteur | 30.7 | 5.4 | 64.8 | 0.0 | 140.6 |
| penicillines A + inh. | 24.2 | 5.2 | 50.6 | 0.0 | 135.1 |
| amoxicilline ac clavulanique | 24.2 | 5.2 | 50.6 | 0.0 | 135.1 |
| Ratio amoxicilline/amoxicilline ac clavulanique | 1.0 | 0.7 | 2.1 | 0.3 | 28.7 |
| ampicilline sulbactam | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ureido-penicilline + inh. (piperacilline tazobactam) | 2.5 | 0.0 | 8.6 | 0.0 | 73.5 |
| carboxypenicillines + inh. (ticarcilline ac clavulanique) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Aminido-penicilline (pivmecillinam) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 |
| Ureidopenicillines | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
| piperacilline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
| Carboxypenicillines | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
| ticarcilline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| temocilline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
| Cephalosporines, Penemes, Monobactams | 41.3 | 24.4 | 67.6 | 0.0 | 139.7 |
| Cephalosporines | 39.0 | 15.9 | 61.5 | 0.0 | 134.8 |
| C1G+C2G | 1.3 | 0.0 | 4.6 | 0.0 | 44.0 |
| C1G (dont J01DC04) | 1.1 | 0.0 | 3.7 | 0.0 | 43.8 |
| cefalexine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 |
| cefazoline | 0.8 | 0.0 | 3.4 | 0.0 | 42.7 |
| cefadroxil | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| cefaclor | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.3 |

| Molécule | Médiane | P25 | P75 | Minimum | Maximum |
|---|---------|------|------|---------|---------|
| C2G (sauf J01DC04 et J01DC07) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
| cefoxitine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
| cefuroxime | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
| cefamandole | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| C3G (dont J01DC07 et J01DE) | 36.6 | 15.0 | 59.6 | 0.0 | 124.2 |
| C3G Orales (dont J01DC07) | 1.0 | 0.0 | 2.7 | 0.0 | 13.9 |
| cefixime | 0.6 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 10.6 |
| cefpodoxime | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 3.7 |
| cefotiam | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| C3G Injectables | 35.6 | 14.4 | 58.2 | 0.0 | 110.3 |
| C3G Inj. inactives sur P. aeruginosa | 32.4 | 13.9 | 45.6 | 0.0 | 109.0 |
| cefotaxime | 21.7 | 8.8 | 31.0 | 0.0 | 69.3 |
| ceftriaxone | 4.4 | 0.9 | 17.7 | 0.0 | 71.6 |
| C3G Inj. actives sur P. aeruginosa | 1.0 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 34.9 |
| ceftazidime | 0.2 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 12.7 |
| cefepime | 0.5 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 23.6 |
| ceftazidimeavibactam | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 |
| ceftolozanetazobactam | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| Autres céphalosporines | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 |
| ceftobiprole | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ceftaroline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 |
| ceftobiprole+ceftaroline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 |
| Penèmes | 0.7 | 0.0 | 5.8 | 0.0 | 43.4 |
| ertapenem | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 |
| Penèmes actives sur P. aeruginosa | 0.7 | 0.0 | 5.6 | 0.0 | 43.4 |
| imipenem | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 12.2 |
| meropenem | 0.3 | 0.0 | 4.2 | 0.0 | 31.2 |
| Monobactams (aztreonam) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| Tetracyclines | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 26.8 |
| demeclacycline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| doxycycline | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 15.4 |
| lymecycline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.4 |
| metacycline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| minocycline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 |
| tigecycline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |

| Molécule | Médiane | P25 | P75 | Minimum | Maximum |
|---|---------|-----|------|---------|---------|
| Sulfamides | 3.2 | 0.1 | 5.9 | 0.0 | 93.9 |
| cotrimoxazole | 2.8 | 0.1 | 5.0 | 0.0 | 93.9 |
| trimethoprime | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 |
| sulfadiazine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.4 |
| sulfamethizole | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| sulfafurazole (erythromycine+sulfafurazole) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| MLS | 11.9 | 1.8 | 25.4 | 0.0 | 70.2 |
| Macrolides | 9.0 | 1.2 | 21.1 | 0.0 | 70.2 |
| erythromycine seule | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
| erythromycine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
| spiramycine seule | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 63.7 |
| spiramycine (spiramycine+ métronidazole) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| spiramycine | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 63.7 |
| roxithromycine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.5 |
| josamycine | 0.1 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 9.6 |
| clarithromycine | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 16.3 |
| azithromycine | 6.3 | 0.0 | 15.3 | 0.0 | 46.5 |
| Lincosamides | 1.9 | 0.0 | 3.9 | 0.0 | 25.4 |
| clindamycine | 1.9 | 0.0 | 3.9 | 0.0 | 25.4 |
| Streptogramines | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.2 |
| pristinamycine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.2 |
| Aminosides | 7.5 | 4.7 | 13.0 | 0.0 | 37.4 |
| amikacine | 3.4 | 0.0 | 4.6 | 0.0 | 22.1 |
| gentamicine | 4.3 | 2.4 | 7.3 | 0.0 | 18.8 |
| tobramycine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.5 |
| streptomycine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Quinolones | 2.1 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 26.4 |
| Fluoroquinolones | 2.1 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 26.4 |
| Fluoroquinolones orales | 1.9 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 24.7 |
| Fluoroquinolones injectables | 0.2 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 9.2 |
| norfloxacine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 |
| ofloxacine | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 3.2 |
| ciprofloxacine | 1.6 | 0.0 | 4.2 | 0.0 | 26.4 |
| levofloxacine | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 6.5 |
| moxifloxacine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

| Molécule | Médiane | P25 | P75 | Minimum | Maximum |
|---|---------|------|-------|---------|---------|
| lomefloxacine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Phénicoles (thiamphenicol) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Glycopeptides | 2.3 | 0.1 | 4.8 | 0.0 | 57.1 |
| vancomycine | 2.1 | 0.1 | 4.3 | 0.0 | 41.4 |
| teicoplanine | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 15.7 |
| dalbavancine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Imidazoles | 6.8 | 1.9 | 12.5 | 0.0 | 50.3 |
| Imidazolés O | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 4.9 |
| Imidazolés I | 5.1 | 0.5 | 9.9 | 0.0 | 50.3 |
| metronidazole seul | 6.8 | 1.9 | 11.8 | 0.0 | 50.3 |
| metronidazole (spiramycine+ metronidazole) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| metronidazole | 6.8 | 1.9 | 11.8 | 0.0 | 50.3 |
| ornidazole | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.1 |
| tinidazole | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| "Autres ATB" (J01X + imidazoles oraux: P01AB) | 10.3 | 3.4 | 22.1 | 0.0 | 74.4 |
| J01X | 9.3 | 2.7 | 21.8 | 0.0 | 71.1 |
| acide fusidique | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
| fosfomycine | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 2.4 |
| linezolide | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 16.2 |
| colistine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 |
| nitrofurantoïne | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| daptomycine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.9 |
| Antistaphylococciques | 2.7 | 0.3 | 5.5 | 0.0 | 61.1 |
| rifampicine | 1.3 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 27.8 |
| fidaxomicine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
| Consommation antibactériens à usage systémique (J01) | 178.1 | 85.9 | 293.8 | 21.0 | 538.2 |
| CONSOMMATION TOTALE | 180.0 | 88.4 | 297.0 | 21.0 | 566.7 |

*Antistaphylococcique: glycopeptides, daptomycine, linezolide, tedizolide, dalbavancine, ceftaroline, ceftriaxone.

Consommations d'antibiotiques - Services de chirurgie (N=88)
(Réseau de surveillance des consommations 2021)

| Molécule | Médiane | P25 | P75 | Minimum | Maximum |
|--|---------|-------|-------|---------|---------|
| B-lactamines | 379.2 | 236.0 | 483.3 | 8.7 | 1556.4 |
| Penicillines | 210.5 | 137.1 | 270.0 | 8.0 | 1008.4 |
| Penicillines G | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.4 |
| benzylpenicilline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.4 |
| benzathine benzylpenicilline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Penicilline V (phenoxyethylpenicilline) | 0.3 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 12.4 |
| Penicillines M | 3.7 | 0.3 | 12.1 | 0.0 | 180.3 |
| cloxacilline | 3.7 | 0.2 | 11.1 | 0.0 | 180.3 |
| oxacilline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.7 |
| Penicillines A | 38.9 | 20.7 | 63.0 | 0.0 | 129.4 |
| ampicilline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| amoxicilline | 38.9 | 20.7 | 63.0 | 0.0 | 129.4 |
| Penicillines + inhibiteur | 141.1 | 97.1 | 199.7 | 8.0 | 907.2 |
| penicillines A + inh. | 117.0 | 68.3 | 166.6 | 5.1 | 868.0 |
| amoxicilline ac clavulanique | 117.0 | 68.3 | 166.6 | 5.1 | 868.0 |
| Ratio amoxicilline/amoxicilline ac clavulanique | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.0 | 1.7 |
| ampicilline sulbactam | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ureido-penicilline + inh. (piperacilline tazobactam) | 16.8 | 7.4 | 31.5 | 0.0 | 157.1 |
| carboxypenicillines + inh. (ticarcilline ac clavulanique) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Aminido-penicilline (pivmecillinam) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.7 |
| Ureidopenicillines | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 23.6 |
| piperacilline | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 23.6 |
| Carboxypenicillines | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 |
| ticarcilline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| temocilline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 |
| Cephalosporines, Penemes, Monobactams | 134.8 | 79.2 | 231.8 | 0.6 | 607.1 |
| Cephalosporines | 126.0 | 71.0 | 218.1 | 0.6 | 607.1 |
| C1G+C2G | 47.2 | 15.0 | 144.1 | 0.0 | 604.7 |
| C1G (dont J01DC04) | 36.4 | 14.0 | 139.6 | 0.0 | 384.2 |
| cefalexine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
| cefazoline | 36.4 | 13.9 | 139.6 | 0.0 | 384.2 |
| cefadroxil | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.5 |
| cefaclor | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

| Molécule | Médiane | P25 | P75 | Minimum | Maximum |
|---|---------|------|------|---------|---------|
| C2G (sauf J01DC04 et J01DC07) | 0.5 | 0.0 | 7.9 | 0.0 | 243.1 |
| cefoxitine | 0.3 | 0.0 | 3.4 | 0.0 | 26.3 |
| cefuroxime | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 243.1 |
| cefamandole | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| C3G (dont J01DC07 et J01DE) | 49.6 | 17.8 | 80.4 | 0.0 | 272.1 |
| C3G Orales (dont J01DC07) | 0.5 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 15.0 |
| cefixime | 0.5 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 15.0 |
| cefpodoxime | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| cefotiam | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| C3G Injectables | 44.9 | 15.3 | 76.0 | 0.0 | 265.8 |
| C3G Inj. inactives sur P. aeruginosa | 34.5 | 13.4 | 67.7 | 0.0 | 259.2 |
| cefotaxime | 6.4 | 2.0 | 16.1 | 0.0 | 91.8 |
| ceftriaxone | 19.8 | 7.6 | 42.7 | 0.0 | 196.6 |
| C3G Inj. actives sur P. aeruginosa | 4.5 | 1.2 | 12.9 | 0.0 | 92.8 |
| ceftazidime | 1.5 | 0.2 | 3.4 | 0.0 | 23.9 |
| cefepime | 2.8 | 0.1 | 7.7 | 0.0 | 84.6 |
| ceftazidimeavibactam | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
| ceftolozanetazobactam | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| Autres céphalosporines | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 |
| ceftobiprole | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 |
| ceftaroline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 |
| ceftobiprole+ceftaroline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 |
| Penèmes | 4.4 | 0.8 | 10.1 | 0.0 | 122.0 |
| ertapenem | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 6.8 |
| Penèmes actives sur P. aeruginosa | 4.0 | 0.5 | 9.2 | 0.0 | 122.0 |
| imipenem | 2.2 | 0.3 | 4.4 | 0.0 | 122.0 |
| meropenem | 0.4 | 0.0 | 3.8 | 0.0 | 18.3 |
| Monobactams (aztreonam) | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 7.3 |
| Tetracyclines | 2.2 | 0.0 | 9.0 | 0.0 | 66.5 |
| demeccycline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| doxycycline | 1.8 | 0.0 | 8.7 | 0.0 | 66.5 |
| lymecycline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| metacycline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| minocycline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.9 |
| tigecycline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.6 |

| Molécule | Médiane | P25 | P75 | Minimum | Maximum |
|---|---------|------|------|---------|---------|
| Sulfamides | 5.4 | 1.8 | 11.9 | 0.0 | 51.2 |
| cotrimoxazole | 5.4 | 1.7 | 11.9 | 0.0 | 51.2 |
| trimethoprime | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| sulfadiazine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
| sulfamethizole | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| sulfafurazole (erythromycine+sulfafurazole) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| MLS | 18.9 | 12.4 | 30.8 | 0.0 | 230.6 |
| Macrolides | 6.3 | 2.2 | 10.2 | 0.0 | 192.0 |
| erythromycine seule | 1.2 | 0.2 | 5.5 | 0.0 | 42.3 |
| erythromycine | 1.2 | 0.2 | 5.5 | 0.0 | 42.3 |
| spiramycine seule | 0.6 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 93.4 |
| spiramycine (spiramycine+ métronidazole) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
| spiramycine | 0.6 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 93.4 |
| roxithromycine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
| josamycine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 |
| clarithromycine | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 10.3 |
| azithromycine | 0.5 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 90.5 |
| Lincosamides | 8.9 | 4.2 | 15.5 | 0.0 | 56.4 |
| clindamycine | 8.9 | 4.2 | 15.5 | 0.0 | 56.4 |
| Streptogramines | 1.3 | 0.5 | 3.2 | 0.0 | 17.3 |
| pristinamycine | 1.3 | 0.5 | 3.2 | 0.0 | 17.3 |
| Aminosides | 17.4 | 8.4 | 30.5 | 0.0 | 158.0 |
| amikacine | 3.4 | 1.5 | 7.2 | 0.0 | 91.7 |
| gentamicine | 12.7 | 5.4 | 22.8 | 0.0 | 141.2 |
| tobramycine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 |
| streptomycine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Quinolones | 41.2 | 21.5 | 56.8 | 0.9 | 487.6 |
| Fluoroquinolones | 41.2 | 21.5 | 56.8 | 0.9 | 487.6 |
| Fluoroquinolones orales | 29.6 | 15.2 | 44.1 | 0.0 | 476.3 |
| Fluoroquinolones injectables | 6.6 | 3.1 | 12.3 | 0.0 | 136.3 |
| norfloxacine | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 7.4 |
| ofloxacine | 12.6 | 5.0 | 20.6 | 0.0 | 82.7 |
| ciprofloxacine | 8.6 | 4.3 | 13.2 | 0.0 | 47.6 |
| levofloxacine | 10.2 | 3.0 | 21.7 | 0.0 | 475.7 |
| moxifloxacine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 |

| Molécule | Médiane | P25 | P75 | Minimum | Maximum |
|---|---------|-------|-------|---------|---------|
| lomefloxacine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Phénicoles (thiamphenicol) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Glycopeptides | 7.4 | 3.6 | 13.1 | 0.0 | 76.7 |
| vancomycine | 7.1 | 3.5 | 13.1 | 0.0 | 76.7 |
| teicoplanine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.5 |
| dalbavancine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 |
| Imidazoles | 35.5 | 11.8 | 66.2 | 0.0 | 175.9 |
| Imidazolés O | 3.6 | 0.0 | 9.4 | 0.0 | 26.0 |
| Imidazolés I | 28.3 | 8.8 | 56.1 | 0.0 | 171.5 |
| metronidazole seul | 35.1 | 11.8 | 66.2 | 0.0 | 175.9 |
| metronidazole (spiramycine+ metronidazole) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| metronidazole | 35.1 | 11.8 | 66.2 | 0.0 | 175.9 |
| ornidazole | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.9 |
| tinidazole | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 |
| "Autres ATB" (J01X + imidazoles oraux: P01AB) | 63.4 | 26.6 | 112.9 | 0.6 | 315.2 |
| J01X | 57.3 | 24.1 | 98.2 | 0.0 | 315.2 |
| acide fusidique | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 |
| fosfomycine | 0.3 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 10.3 |
| linezolide | 0.9 | 0.0 | 3.7 | 0.0 | 76.3 |
| colistine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.9 |
| nitrofurantoïne | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 27.2 |
| daptomycine | 0.6 | 0.0 | 9.1 | 0.0 | 266.1 |
| Antistaphylococciques | 15.5 | 7.0 | 36.4 | 0.0 | 273.3 |
| rifampicine | 3.8 | 0.2 | 16.6 | 0.0 | 114.1 |
| fidaxomicine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 |
| Consommation antibactériens à usage systémique (J01) | 581.7 | 342.3 | 715.0 | 13.3 | 2379.4 |
| CONSOMMATION TOTALE | 615.2 | 347.3 | 736.7 | 13.3 | 2413.3 |

*Antistaphylococcique: glycopeptides, daptomycine, linezolide, tedizolide, dalbavancine, ceftaroline, ceftriaxone.

Consommations d'antibiotiques - Services de gynécologie-obstétrique (N=51)
(Réseau de surveillance des consommations 2021)

| Molécule | Médiane | P25 | P75 | Minimum | Maximum |
|--|---------|-------|-------|---------|---------|
| B-lactamines | 166.9 | 116.4 | 235.6 | 17.4 | 379.9 |
| Penicillines | 149.3 | 102.0 | 210.7 | 15.8 | 342.1 |
| Penicillines G | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 125.3 |
| benzylpenicilline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 125.3 |
| benzathine benzylpenicilline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| Penicilline V (phenoxyethylpenicilline) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 |
| Penicillines M | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 13.2 |
| cloxacilline | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 13.2 |
| oxacilline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Penicillines A | 92.2 | 69.0 | 162.9 | 10.8 | 228.4 |
| ampicilline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| amoxicilline | 92.2 | 69.0 | 162.9 | 10.8 | 228.4 |
| Penicillines + inhibiteur | 38.6 | 21.0 | 55.6 | 0.0 | 108.5 |
| penicillines A + inh. | 37.7 | 21.0 | 54.4 | 0.0 | 102.6 |
| amoxicilline ac clavulanique | 37.7 | 21.0 | 54.4 | 0.0 | 102.6 |
| Ratio amoxicilline/amoxicilline ac clavulanique | 2.9 | 2.0 | 4.3 | 0.7 | 12.0 |
| ampicilline sulbactam | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ureido-penicilline + inh. (piperacilline tazobactam) | 0.3 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 7.6 |
| carboxypenicillines + inh. (ticarcilline ac clavulanique) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Aminido-penicilline (pivmecillinam) | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.3 |
| Ureidopenicillines | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| piperacilline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| Carboxypenicillines | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
| ticarcilline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| temocilline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
| Cephalosporines, Penemes, Monobactams | 19.1 | 10.1 | 26.0 | 1.6 | 69.9 |
| Cephalosporines | 18.5 | 10.0 | 25.4 | 1.6 | 69.5 |
| C1G+C2G | 2.5 | 0.6 | 7.6 | 0.0 | 54.3 |
| C1G (dont J01DC04) | 2.1 | 0.2 | 7.6 | 0.0 | 54.1 |
| cefalexine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 |
| cefazoline | 2.0 | 0.2 | 7.3 | 0.0 | 54.1 |
| cefadroxil | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| cefaclor | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.8 |

| Molécule | Médiane | P25 | P75 | Minimum | Maximum |
|---|---------|-----|------|---------|---------|
| C2G (sauf J01DC04 et J01DC07) | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 4.0 |
| cefoxitine | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 4.0 |
| cefuroxime | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 |
| cefamandole | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| C3G (dont J01DC07 et J01DE) | 10.8 | 4.4 | 20.6 | 0.3 | 34.1 |
| C3G Orales (dont J01DC07) | 3.8 | 1.8 | 8.5 | 0.0 | 20.0 |
| cefixime | 3.8 | 1.8 | 8.5 | 0.0 | 20.0 |
| cefpodoxime | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
| cefotiam | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| C3G Injectables | 6.3 | 1.7 | 11.8 | 0.0 | 29.2 |
| C3G Inj. inactives sur P. aeruginosa | 6.3 | 1.7 | 11.4 | 0.0 | 27.3 |
| cefotaxime | 1.3 | 0.4 | 3.9 | 0.0 | 15.2 |
| ceftriaxone | 2.9 | 1.1 | 6.5 | 0.0 | 14.6 |
| C3G Inj. actives sur P. aeruginosa | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 2.3 |
| ceftazidime | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.3 |
| cefepime | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 |
| ceftazidimeavibactam | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ceftolozanetazobactam | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Autres céphalosporines | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ceftobiprole | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ceftaroline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ceftobiprole+ceftaroline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Penèmes | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 2.2 |
| ertapenem | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
| Penèmes actives sur P. aeruginosa | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 2.1 |
| imipenem | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.3 |
| meropenem | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
| Monobactams (aztreonam) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
| Tetracyclines | 1.3 | 0.0 | 9.6 | 0.0 | 27.1 |
| demeccycline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| doxycycline | 1.3 | 0.0 | 9.6 | 0.0 | 26.5 |
| lymecycline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| metacycline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| minocycline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| tigecycline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |

| Molécule | Médiane | P25 | P75 | Minimum | Maximum |
|---|---------|-----|------|---------|---------|
| Sulfamides | 0.2 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 2.9 |
| cotrimoxazole | 0.1 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 2.9 |
| trimethoprime | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| sulfadiazine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| sulfamethizole | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| sulfafurazole (erythromycine+sulfafurazole) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| MLS | 6.4 | 4.5 | 12.5 | 0.3 | 23.1 |
| Macrolides | 1.2 | 0.6 | 3.2 | 0.0 | 19.1 |
| erythromycine seule | 0.1 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 12.7 |
| erythromycine | 0.1 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 12.7 |
| spiramycine seule | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 2.0 |
| spiramycine (spiramycine+ métronidazole) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| spiramycine | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 2.0 |
| roxithromycine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.7 |
| josamycine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.2 |
| clarithromycine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.3 |
| azithromycine | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 17.0 |
| Lincosamides | 3.7 | 2.6 | 6.6 | 0.0 | 16.0 |
| clindamycine | 3.7 | 2.6 | 6.6 | 0.0 | 16.0 |
| Streptogramines | 0.2 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 6.6 |
| pristinamycine | 0.2 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 6.6 |
| Aminosides | 2.9 | 1.0 | 5.0 | 0.0 | 16.0 |
| amikacine | 0.2 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 1.1 |
| gentamicine | 2.9 | 0.8 | 4.9 | 0.0 | 15.5 |
| tobramycine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| streptomycine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Quinolones | 2.4 | 0.8 | 5.3 | 0.0 | 24.8 |
| Fluoroquinolones | 2.4 | 0.8 | 5.3 | 0.0 | 24.8 |
| Fluoroquinolones orales | 2.3 | 0.6 | 4.6 | 0.0 | 13.4 |
| Fluoroquinolones injectables | 0.2 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 23.5 |
| norfloxacine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.4 |
| ofloxacine | 1.4 | 0.2 | 3.5 | 0.0 | 23.9 |
| ciprofloxacine | 0.1 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 4.8 |
| levofloxacine | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 5.0 |
| moxifloxacine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |

| Molécule | Médiane | P25 | P75 | Minimum | Maximum |
|---|---------|-------|-------|---------|---------|
| lomefloxacine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Phénicoles (thiamphenicol) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Glycopeptides | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 3.1 |
| vancomycine | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.8 |
| teicoplanine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 |
| dalbavancine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Imidazoles | 3.9 | 0.6 | 8.7 | 0.0 | 22.0 |
| Imidazolés O | 1.5 | 0.0 | 4.9 | 0.0 | 10.1 |
| Imidazolés I | 0.8 | 0.3 | 5.3 | 0.0 | 16.1 |
| metronidazole seul | 3.9 | 0.6 | 8.7 | 0.0 | 22.0 |
| metronidazole (spiramycine+ metronidazole) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| metronidazole | 3.9 | 0.6 | 8.7 | 0.0 | 22.0 |
| ornidazole | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
| tinidazole | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| "Autres ATB" (J01X + imidazoles oraux: P01AB) | 7.5 | 1.1 | 11.4 | 0.0 | 28.6 |
| J01X | 5.2 | 0.7 | 7.9 | 0.0 | 22.7 |
| acide fusidique | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| fosfomycine | 0.8 | 0.0 | 3.3 | 0.0 | 12.2 |
| linezolide | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 |
| colistine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| nitrofurantoïne | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 3.6 |
| daptomycine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.7 |
| Antistaphylococciques | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 6.2 |
| rifampicine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.9 |
| fidaxomicine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Consommation antibactériens à usage systémique (J01) | 195.8 | 129.5 | 274.4 | 18.9 | 457.3 |
| CONSOMMATION TOTALE | 195.8 | 132.6 | 278.7 | 19.0 | 463.3 |

*Antistaphylococcique: glycopeptides, daptomycine, linezolide, tedizolide, dalbavancine, ceftaroline, ceftriaxone.

Consommations d'antibiotiques - Services de SSR (N=124)
(Réseau de surveillance des consommations 2021)

| Molécule | Médiane | P25 | P75 | Minimum | Maximum |
|--|---------|------|-------|---------|---------|
| B-lactamines | 78.9 | 46.5 | 107.6 | 6.3 | 309.1 |
| Penicillines | 64.9 | 39.7 | 87.5 | 5.9 | 262.5 |
| Penicillines G | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| benzylpenicilline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| benzathine benzylpenicilline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| Penicilline V (phenoxyethylpenicilline) | 0.2 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 37.3 |
| Penicillines M | 0.4 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 20.0 |
| cloxacilline | 0.4 | 0.0 | 2.1 | 0.0 | 20.0 |
| oxacilline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
| Penicillines A | 23.1 | 12.2 | 38.3 | 0.0 | 126.0 |
| ampicilline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| amoxicilline | 23.1 | 12.2 | 38.3 | 0.0 | 126.0 |
| Penicillines + inhibiteur | 31.9 | 19.8 | 47.0 | 1.7 | 154.5 |
| penicillines A + inh. | 29.2 | 19.0 | 40.4 | 1.7 | 144.5 |
| amoxicilline ac clavulanique | 29.2 | 19.0 | 40.4 | 1.7 | 144.5 |
| Ratio amoxicilline/amoxicilline ac clavulanique | 0.7 | 0.5 | 1.4 | 0.0 | 4.6 |
| ampicilline sulbactam | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ureido-penicilline + inh. (piperacilline tazobactam) | 1.6 | 0.3 | 3.5 | 0.0 | 16.6 |
| carboxypenicillines + inh. (ticarcilline ac clavulanique) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Aminido-penicilline (pivmecillinam) | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 6.3 |
| Ureidopenicillines | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 |
| piperacilline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 |
| Carboxypenicillines | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 |
| ticarcilline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| temocilline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 |
| Cephalosporines, Penemes, Monobactams | 13.3 | 8.5 | 20.6 | 0.0 | 64.3 |
| Cephalosporines | 11.1 | 7.3 | 17.3 | 0.0 | 63.9 |
| C1G+C2G | 0.1 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 10.5 |
| C1G (dont J01DC04) | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 10.2 |
| cefalexine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.6 |
| cefazoline | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 9.7 |
| cefadroxil | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| cefaclor | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |

| Molécule | Médiane | P25 | P75 | Minimum | Maximum |
|---|---------|-----|------|---------|---------|
| C2G (sauf J01DC04 et J01DC07) | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 5.9 |
| cefoxitine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 |
| cefuroxime | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.1 |
| cefamandole | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| C3G (dont J01DC07 et J01DE) | 10.4 | 6.8 | 16.3 | 0.0 | 63.9 |
| C3G Orales (dont J01DC07) | 1.1 | 0.3 | 2.9 | 0.0 | 22.6 |
| cefixime | 1.0 | 0.3 | 2.9 | 0.0 | 22.6 |
| cefpodoxime | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 |
| cefotiam | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| C3G Injectables | 8.6 | 4.4 | 12.7 | 0.0 | 63.2 |
| C3G Inj. inactives sur P. aeruginosa | 6.9 | 3.9 | 10.6 | 0.0 | 62.5 |
| cefotaxime | 0.6 | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 15.1 |
| ceftriaxone | 5.8 | 2.4 | 9.6 | 0.0 | 62.4 |
| C3G Inj. actives sur P. aeruginosa | 0.8 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 16.0 |
| ceftazidime | 0.2 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 13.4 |
| cefepime | 0.3 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 4.7 |
| ceftazidimeavibactam | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 |
| ceftolozanetazobactam | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Autres céphalosporines | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| ceftobiprole | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
| ceftaroline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| ceftobiprole+ceftaroline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
| Penèmes | 1.0 | 0.1 | 2.6 | 0.0 | 17.5 |
| ertapenem | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 4.7 |
| Penèmes actives sur P. aeruginosa | 0.8 | 0.0 | 1.9 | 0.0 | 15.0 |
| imipenem | 0.2 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 10.8 |
| meropenem | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 11.3 |
| Monobactams (aztreonam) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.4 |
| Tetracyclines | 2.4 | 0.0 | 6.7 | 0.0 | 26.4 |
| demeclacycline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| doxycycline | 2.1 | 0.0 | 6.4 | 0.0 | 26.3 |
| lymecycline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 |
| metacycline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| minocycline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.2 |
| tigecycline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 |

| Molécule | Médiane | P25 | P75 | Minimum | Maximum |
|---|---------|------|------|---------|---------|
| Sulfamides | 7.6 | 4.0 | 12.3 | 0.0 | 118.5 |
| cotrimoxazole | 7.5 | 4.0 | 12.1 | 0.0 | 86.1 |
| trimethoprime | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| sulfadiazine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39.2 |
| sulfamethizole | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| sulfafurazole (erythromycine+sulfafurazole) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| MLS | 7.9 | 4.4 | 12.5 | 0.0 | 47.8 |
| Macrolides | 3.1 | 1.2 | 6.4 | 0.0 | 36.2 |
| erythromycine seule | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 8.2 |
| erythromycine | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 8.2 |
| spiramycine seule | 0.4 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 8.8 |
| spiramycine (spiramycine+ métronidazole) | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 2.1 |
| spiramycine | 0.5 | 0.1 | 1.3 | 0.0 | 8.8 |
| roxithromycine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.1 |
| josamycine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| clarithromycine | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 29.3 |
| azithromycine | 0.9 | 0.0 | 2.4 | 0.0 | 23.7 |
| Lincosamides | 1.0 | 0.0 | 3.5 | 0.0 | 29.9 |
| clindamycine | 1.0 | 0.0 | 3.5 | 0.0 | 29.9 |
| Streptogramines | 1.8 | 0.6 | 3.1 | 0.0 | 16.3 |
| pristinamycine | 1.8 | 0.6 | 3.1 | 0.0 | 16.3 |
| Aminosides | 0.3 | 0.1 | 1.2 | 0.0 | 40.3 |
| amikacine | 0.1 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 8.3 |
| gentamicine | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 8.8 |
| tobramycine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.3 |
| streptomycine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Quinolones | 23.5 | 15.4 | 34.0 | 0.0 | 304.1 |
| Fluoroquinolones | 23.5 | 15.4 | 34.0 | 0.0 | 304.1 |
| Fluoroquinolones orales | 21.5 | 14.7 | 33.1 | 0.0 | 299.7 |
| Fluoroquinolones injectables | 0.5 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 11.0 |
| norfloxacine | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 4.2 |
| ofloxacine | 5.3 | 2.9 | 8.6 | 0.0 | 30.9 |
| ciprofloxacine | 5.9 | 2.9 | 10.2 | 0.0 | 52.0 |
| levofloxacine | 8.7 | 5.2 | 14.6 | 0.0 | 203.4 |
| moxifloxacine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.5 |

| Molécule | Médiane | P25 | P75 | Minimum | Maximum |
|---|---------|------|-------|---------|---------|
| lomefloxacine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| Phénicoles (thiamphenicol) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Glycopeptides | 0.7 | 0.1 | 1.8 | 0.0 | 20.1 |
| vancomycine | 0.6 | 0.1 | 1.7 | 0.0 | 20.1 |
| teicoplanine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.3 |
| dalbavancine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| Imidazoles | 1.6 | 0.4 | 3.9 | 0.0 | 59.4 |
| Imidazolés O | 0.8 | 0.0 | 2.1 | 0.0 | 6.5 |
| Imidazolés I | 0.5 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 57.8 |
| metronidazole seul | 1.6 | 0.4 | 3.9 | 0.0 | 59.4 |
| metronidazole (spiramycine+ metronidazole) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| metronidazole | 1.6 | 0.4 | 3.9 | 0.0 | 59.4 |
| ornidazole | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 |
| tinidazole | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 |
| "Autres ATB" (J01X + imidazoles oraux: P01AB) | 7.5 | 4.0 | 12.9 | 0.0 | 63.3 |
| J01X | 5.7 | 3.1 | 10.2 | 0.0 | 61.8 |
| acide fusidique | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 |
| fosfomycine | 0.5 | 0.1 | 1.0 | 0.0 | 4.6 |
| linezolide | 0.4 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 23.6 |
| colistine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.6 |
| nitrofurantoïne | 0.8 | 0.1 | 2.0 | 0.0 | 13.8 |
| daptomycine | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 10.7 |
| Antistaphylococciques | 2.0 | 0.5 | 4.7 | 0.0 | 25.1 |
| rifampicine | 5.6 | 1.2 | 13.9 | 0.0 | 333.5 |
| fidaxomicine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9 |
| Consommation antibactériens à usage systémique (J01) | 132.4 | 91.8 | 178.0 | 7.2 | 483.0 |
| CONSOMMATION TOTALE | 145.6 | 99.1 | 188.5 | 8.0 | 788.6 |

*Antistaphylococcique: glycopeptides, daptomycine, linezolide, tedizolide, dalbavancine, ceftaroline, ceftriaxone.

Consommations d'antibiotiques - Services de SLD (N=26)
(Réseau de surveillance des consommations 2021)

| Molécule | Médiane | P25 | P75 | Minimum | Maximum |
|--|---------|------|------|---------|---------|
| B-lactamines | 34.9 | 21.2 | 53.2 | 9.2 | 186.0 |
| Penicillines | 28.4 | 17.1 | 47.9 | 7.3 | 173.1 |
| Penicillines G | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| benzylpenicilline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| benzathine benzylpenicilline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Penicilline V (phenoxyethylpenicilline) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 |
| Penicillines M | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 2.0 |
| cloxacilline | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 2.0 |
| oxacilline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Penicillines A | 8.7 | 5.1 | 19.0 | 0.8 | 75.6 |
| ampicilline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| amoxicilline | 8.7 | 5.1 | 19.0 | 0.8 | 75.6 |
| Penicillines + inhibiteur | 15.9 | 10.5 | 26.1 | 1.0 | 98.5 |
| penicillines A + inh. | 15.8 | 9.7 | 25.1 | 1.0 | 92.2 |
| amoxicilline ac clavulanique | 15.8 | 9.7 | 25.1 | 1.0 | 92.2 |
| Ratio amoxicilline/amoxicilline ac clavulanique | 0.6 | 0.3 | 1.0 | 0.1 | 5.3 |
| ampicilline sulbactam | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ureido-penicilline + inh. (piperacilline tazobactam) | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 19.1 |
| carboxypenicillines + inh. (ticarcilline ac clavulanique) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Aminido-penicilline (pivmecillinam) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.9 |
| Ureidopenicillines | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 |
| piperacilline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 |
| Carboxypenicillines | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 |
| ticarcilline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| temocilline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 |
| Cephalosporines, Penemes, Monobactams | 5.6 | 3.4 | 7.9 | 1.9 | 17.6 |
| Cephalosporines | 5.0 | 2.8 | 7.4 | 1.5 | 16.9 |
| C1G+C2G | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 7.5 |
| C1G (dont J01DC04) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 |
| cefalexine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| cefazoline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 |
| cefadroxil | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| cefaclor | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

| Molécule | Médiane | P25 | P75 | Minimum | Maximum |
|---|---------|-----|-----|---------|---------|
| C2G (sauf J01DC04 et J01DC07) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.5 |
| cefoxitine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.5 |
| cefuroxime | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| cefamandole | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| C3G (dont J01DC07 et J01DE) | 4.8 | 2.8 | 7.4 | 1.5 | 16.3 |
| C3G Orales (dont J01DC07) | 0.4 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 3.6 |
| cefixime | 0.4 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 3.6 |
| cefpodoxime | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| cefotiam | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| C3G Injectables | 4.4 | 2.4 | 6.3 | 0.8 | 15.7 |
| C3G Inj. inactives sur P. aeruginosa | 4.0 | 2.3 | 6.0 | 0.8 | 15.4 |
| cefotaxime | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 1.9 |
| ceftriaxone | 3.9 | 2.1 | 5.6 | 0.4 | 13.7 |
| C3G Inj. actives sur P. aeruginosa | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 7.3 |
| ceftazidime | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.3 |
| cefepime | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 |
| ceftazidimeavibactam | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 |
| ceftolozanetazobactam | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Autres céphalosporines | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ceftobiprole | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ceftaroline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ceftobiprole+ceftaroline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Penèmes | 0.2 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 6.1 |
| ertapenem | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 |
| Penèmes actives sur P. aeruginosa | 0.1 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 6.1 |
| imipenem | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 6.1 |
| meropenem | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
| Monobactams (aztreonam) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| Tetracyclines | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.8 |
| demeclacycline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| doxycycline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.8 |
| lymecycline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| metacycline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| minocycline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| tigecycline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

| Molécule | Médiane | P25 | P75 | Minimum | Maximum |
|---|---------|-----|-----|---------|---------|
| Sulfamides | 1.9 | 0.6 | 3.2 | 0.0 | 10.2 |
| cotrimoxazole | 1.9 | 0.6 | 3.2 | 0.0 | 10.2 |
| trimethoprime | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| sulfadiazine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| sulfamethizole | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| sulfafurazole (erythromycine+sulfafurazole) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| MLS | 2.1 | 1.0 | 4.4 | 0.0 | 9.5 |
| Macrolides | 0.8 | 0.1 | 1.5 | 0.0 | 8.0 |
| erythromycine seule | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| erythromycine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| spiramycine seule | 0.1 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 1.6 |
| spiramycine (spiramycine+ métronidazole) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 |
| spiramycine | 0.2 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 1.6 |
| roxithromycine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 |
| josamycine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| clarithromycine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
| azithromycine | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 7.9 |
| Lincosamides | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 2.1 |
| clindamycine | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 2.1 |
| Streptogramines | 0.8 | 0.2 | 1.8 | 0.0 | 2.8 |
| pristinamycine | 0.8 | 0.2 | 1.8 | 0.0 | 2.8 |
| Aminosides | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 3.8 |
| amikacine | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 3.8 |
| gentamicine | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.4 |
| tobramycine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| streptomycine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Quinolones | 4.1 | 2.8 | 6.8 | 0.0 | 31.4 |
| Fluoroquinolones | 4.1 | 2.8 | 6.8 | 0.0 | 31.4 |
| Fluoroquinolones orales | 3.8 | 2.8 | 6.2 | 0.0 | 26.4 |
| Fluoroquinolones injectables | 0.1 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 5.0 |
| norfloxacine | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 2.4 |
| ofloxacine | 1.1 | 0.3 | 2.3 | 0.0 | 10.1 |
| ciprofloxacine | 1.6 | 0.1 | 2.5 | 0.0 | 18.4 |
| levofloxacine | 0.6 | 0.0 | 2.7 | 0.0 | 12.6 |
| moxifloxacine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

| Molécule | Médiane | P25 | P75 | Minimum | Maximum |
|---|---------|------|------|---------|---------|
| lomefloxacine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Phénicoles (thiamphenicol) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Glycopeptides | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 1.5 |
| vancomycine | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 1.5 |
| teicoplanine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| dalbavancine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Imidazoles | 0.9 | 0.3 | 1.5 | 0.0 | 6.4 |
| Imidazolés O | 0.2 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 2.2 |
| Imidazolés I | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 0.0 | 6.4 |
| metronidazole seul | 0.9 | 0.3 | 1.4 | 0.0 | 6.4 |
| metronidazole (spiramycine+ metronidazole) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| metronidazole | 0.9 | 0.3 | 1.4 | 0.0 | 6.4 |
| ornidazole | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| tinidazole | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| "Autres ATB" (J01X + imidazoles oraux: P01AB) | 2.2 | 0.7 | 3.3 | 0.0 | 10.0 |
| J01X | 1.7 | 0.6 | 2.8 | 0.0 | 8.9 |
| acide fusidique | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.3 |
| fosfomycine | 0.1 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 3.0 |
| linezolide | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 |
| colistine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| nitrofurantoïne | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 1.5 |
| daptomycine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
| Antistaphylococciques | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 2.2 |
| rifampicine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.1 |
| fidaxomicine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 |
| Consommation antibactériens à usage systémique (J01) | 47.3 | 36.7 | 68.1 | 9.9 | 218.8 |
| CONSOMMATION TOTALE | 48.6 | 36.9 | 69.0 | 9.9 | 218.8 |

*Antistaphylococcique: glycopeptides, daptomycine, linezolide, tedizolide, dalbavancine, ceftaroline, ceftriaxone.

Consommations d'antibiotiques - Services de psychiatrie (N=54)
(Réseau de surveillance des consommations 2021)

| Molécule | Médiane | P25 | P75 | Minimum | Maximum |
|--|---------|------|------|---------|---------|
| B-lactamines | 25.5 | 13.7 | 41.4 | 2.8 | 64.6 |
| Penicillines | 24.2 | 13.7 | 41.4 | 2.8 | 63.7 |
| Penicillines G | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 |
| benzylpenicilline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| benzathine benzylpenicilline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 |
| Penicilline V (phenoxyethylpenicilline) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 |
| Penicillines M | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 |
| cloxacilline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 |
| oxacilline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Penicillines A | 10.3 | 4.9 | 16.2 | 0.0 | 49.4 |
| ampicilline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| amoxicilline | 10.3 | 4.9 | 16.2 | 0.0 | 49.4 |
| Penicillines + inhibiteur | 12.8 | 7.2 | 23.3 | 0.0 | 42.6 |
| penicillines A + inh. | 12.8 | 7.2 | 23.2 | 0.0 | 42.6 |
| amoxicilline ac clavulanique | 12.8 | 7.2 | 23.2 | 0.0 | 42.6 |
| Ratio amoxicilline/amoxicilline ac clavulanique | 0.8 | 0.6 | 1.1 | 0.0 | 3.5 |
| ampicilline sulbactam | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ureido-penicilline + inh. (piperacilline tazobactam) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 |
| carboxypenicillines + inh. (ticarcilline ac clavulanique) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Aminido-penicilline (pivmecillinam) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.4 |
| Ureidopenicillines | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| piperacilline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Carboxypenicillines | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ticarcilline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| temocilline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Cephalosporines, Penemes, Monobactams | 0.5 | 0.1 | 0.9 | 0.0 | 5.8 |
| Cephalosporines | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 0.0 | 5.8 |
| C1G+C2G | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
| C1G (dont J01DC04) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
| cefalexine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
| cefazoline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| cefadroxil | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| cefaclor | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

| Molécule | Médiane | P25 | P75 | Minimum | Maximum |
|---|---------|-----|-----|---------|---------|
| C2G (sauf J01DC04 et J01DC07) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| cefoxitine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| cefuroxime | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| cefamandole | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| C3G (dont J01DC07 et J01DE) | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 0.0 | 5.8 |
| C3G Orales (dont J01DC07) | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 2.2 |
| cefixime | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 2.2 |
| cefpodoxime | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 |
| cefotiam | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| C3G Injectables | 0.1 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 5.8 |
| C3G Inj. inactives sur P. aeruginosa | 0.1 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 2.1 |
| cefotaxime | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
| ceftriaxone | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 1.4 |
| C3G Inj. actives sur P. aeruginosa | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.7 |
| ceftazidime | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| cefepime | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.7 |
| ceftazidimeavibactam | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ceftolozanetazobactam | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Autres céphalosporines | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ceftobiprole | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ceftaroline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ceftobiprole+ceftaroline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Penèmes | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| ertapenem | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| Penèmes actives sur P. aeruginosa | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| imipenem | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| meropenem | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| Monobactams (aztreonam) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Tetracyclines | 2.5 | 0.5 | 5.7 | 0.0 | 47.3 |
| demeclacycline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| doxycycline | 2.3 | 0.4 | 5.4 | 0.0 | 46.6 |
| lymecycline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.2 |
| metacycline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| minocycline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
| tigecycline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

| Molécule | Médiane | P25 | P75 | Minimum | Maximum |
|---|---------|-----|-----|---------|---------|
| Sulfamides | 0.7 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 10.3 |
| cotrimoxazole | 0.6 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 10.3 |
| trimethoprime | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| sulfadiazine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
| sulfamethizole | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| sulfafurazole (erythromycine+sulfafurazole) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| MLS | 2.5 | 1.4 | 4.3 | 0.0 | 9.4 |
| Macrolides | 1.2 | 0.4 | 2.3 | 0.0 | 7.5 |
| erythromycine seule | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| erythromycine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| spiramycine seule | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.6 |
| spiramycine (spiramycine+ métronidazole) | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 1.8 |
| spiramycine | 0.2 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 2.0 |
| roxithromycine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
| josamycine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
| clarithromycine | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 7.5 |
| azithromycine | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 0.0 | 7.0 |
| Lincosamides | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 2.6 |
| clindamycine | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 2.6 |
| Streptogramines | 1.1 | 0.4 | 1.8 | 0.0 | 3.6 |
| pristinamycine | 1.1 | 0.4 | 1.8 | 0.0 | 3.6 |
| Aminosides | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
| amikacine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
| gentamicine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
| tobramycine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| streptomycine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Quinolones | 1.8 | 1.0 | 3.2 | 0.0 | 8.4 |
| Fluoroquinolones | 1.8 | 1.0 | 3.2 | 0.0 | 8.4 |
| Fluoroquinolones orales | 1.8 | 1.0 | 3.2 | 0.0 | 8.4 |
| Fluoroquinolones injectables | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 |
| norfloxacine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 |
| ofloxacine | 0.8 | 0.3 | 1.5 | 0.0 | 6.7 |
| ciprofloxacine | 0.4 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 3.7 |
| levofloxacine | 0.2 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 6.9 |
| moxifloxacine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 |

| Molécule | Médiane | P25 | P75 | Minimum | Maximum |
|---|---------|------|------|---------|---------|
| lomefloxacine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Phénicoles (thiamphenicol) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Glycopeptides | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 |
| vancomycine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 |
| teicoplanine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| dalbavancine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Imidazoles | 0.2 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 3.4 |
| Imidazolés O | 0.2 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 2.0 |
| Imidazolés I | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| metronidazole seul | 0.2 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 3.4 |
| metronidazole (spiramycine+ metronidazole) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| metronidazole | 0.2 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 3.4 |
| ornidazole | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| tinidazole | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 |
| "Autres ATB" (J01X + imidazoles oraux: P01AB) | 0.8 | 0.5 | 1.3 | 0.0 | 7.2 |
| J01X | 0.5 | 0.2 | 0.9 | 0.0 | 7.2 |
| acide fusidique | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| fosfomycine | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.0 | 2.2 |
| linezolide | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| colistine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| nitrofurantoïne | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 1.4 |
| daptomycine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.7 |
| Antistaphylococciques | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.7 |
| rifampicine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.5 |
| fidaxomicine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| Consommation antibactériens à usage systémique (J01) | 36.3 | 21.8 | 59.8 | 3.5 | 92.7 |
| CONSOMMATION TOTALE | 37.1 | 22.6 | 60.6 | 3.5 | 92.7 |

*Antistaphylococcique: glycopeptides, daptomycine, linezolide, tedizolide, dalbavancine, ceftaroline, ceftriaxone.

Consommations d'antibiotiques - Services d'hématologie (N=9)
(Réseau de surveillance des consommations 2021)

| Molécule | Médiane | P25 | P75 | Minimum | Maximum |
|--|---------|-------|-------|---------|---------|
| B-lactamines | 525.7 | 432.2 | 590.7 | 219.7 | 695.4 |
| Penicillines | 323.8 | 258.0 | 388.5 | 97.0 | 481.2 |
| Penicillines G | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 |
| benzylpenicilline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 |
| benzathine benzylpenicilline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| Penicilline V (phenoxyethylpenicilline) | 22.6 | 18.9 | 41.5 | 0.0 | 365.2 |
| Penicillines M | 1.5 | 0.0 | 8.7 | 0.0 | 43.2 |
| cloxacilline | 1.5 | 0.0 | 8.7 | 0.0 | 43.2 |
| oxacilline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Penicillines A | 62.3 | 39.8 | 76.7 | 0.0 | 144.8 |
| ampicilline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| amoxicilline | 62.3 | 39.8 | 76.7 | 0.0 | 144.8 |
| Penicillines + inhibiteur | 203.1 | 147.6 | 221.1 | 48.7 | 354.3 |
| penicillines A + inh. | 44.2 | 33.4 | 59.7 | 0.0 | 111.8 |
| amoxicilline ac clavulanique | 44.2 | 33.4 | 59.7 | 0.0 | 111.8 |
| Ratio amoxicilline/amoxicilline ac clavulanique | 1.2 | 0.9 | 2.8 | 0.5 | 3.7 |
| ampicilline sulbactam | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ureido-penicilline + inh. (piperacilline tazobactam) | 140.5 | 103.3 | 161.4 | 31.9 | 320.9 |
| carboxypenicillines + inh. (ticarcilline ac clavulanique) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Aminido-penicilline (pivmecillinam) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
| Ureidopenicillines | 0.3 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 2.9 |
| piperacilline | 0.3 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 2.9 |
| Carboxypenicillines | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 |
| ticarcilline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| temocilline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 |
| Cephalosporines, Penemes, Monobactams | 172.2 | 122.7 | 177.9 | 48.2 | 329.4 |
| Cephalosporines | 78.3 | 54.4 | 146.4 | 15.4 | 206.4 |
| C1G+C2G | 6.0 | 2.3 | 6.8 | 0.0 | 30.1 |
| C1G (dont J01DC04) | 5.6 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 29.0 |
| cefalexine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| cefazoline | 5.6 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 29.0 |
| cefadroxil | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| cefaclor | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

| Molécule | Médiane | P25 | P75 | Minimum | Maximum |
|---|---------|------|-------|---------|---------|
| C2G (sauf J01DC04 et J01DC07) | 0.5 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 4.4 |
| cefoxitine | 0.4 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 4.4 |
| cefuroxime | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 |
| cefamandole | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| C3G (dont J01DC07 et J01DE) | 72.6 | 42.1 | 122.6 | 15.4 | 199.6 |
| C3G Orales (dont J01DC07) | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 10.0 |
| cefixime | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 10.0 |
| cefpodoxime | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| cefotiam | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| C3G Injectables | 72.2 | 42.1 | 122.6 | 15.4 | 198.7 |
| C3G Inj. inactives sur P. aeruginosa | 29.7 | 17.8 | 58.2 | 8.4 | 122.6 |
| cefotaxime | 16.2 | 6.2 | 44.3 | 4.8 | 66.0 |
| ceftriaxone | 4.7 | 2.6 | 9.1 | 1.9 | 56.6 |
| C3G Inj. actives sur P. aeruginosa | 22.2 | 10.9 | 58.3 | 0.0 | 152.0 |
| ceftazidime | 4.4 | 1.3 | 8.8 | 0.0 | 13.7 |
| cefepime | 20.3 | 6.5 | 49.3 | 0.0 | 142.4 |
| ceftazidimeavibactam | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 4.0 |
| ceftolozanetazobactam | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Autres céphalosporines | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ceftobiprole | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ceftaroline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ceftobiprole+ceftaroline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Penèmes | 77.9 | 32.1 | 106.7 | 0.0 | 121.5 |
| ertapenem | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 1.0 |
| Penèmes actives sur P. aeruginosa | 77.9 | 31.8 | 106.5 | 0.0 | 121.5 |
| imipenem | 6.7 | 1.4 | 26.1 | 0.0 | 52.6 |
| meropenem | 25.3 | 10.5 | 99.7 | 0.0 | 120.1 |
| Monobactams (aztreonam) | 2.0 | 0.8 | 3.8 | 0.0 | 16.3 |
| Tetracyclines | 2.7 | 0.0 | 4.5 | 0.0 | 12.5 |
| demeccycline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| doxycycline | 2.7 | 0.0 | 4.5 | 0.0 | 12.5 |
| lymecycline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| metacycline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| minocycline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| tigecycline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

| Molécule | Médiane | P25 | P75 | Minimum | Maximum |
|---|---------|------|-------|---------|---------|
| Sulfamides | 93.3 | 57.5 | 122.6 | 26.3 | 176.6 |
| cotrimoxazole | 93.3 | 57.5 | 122.6 | 26.3 | 176.6 |
| trimethoprime | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| sulfadiazine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| sulfamethizole | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| sulfafurazole (erythromycine+sulfafurazole) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| MLS | 23.1 | 11.9 | 24.3 | 8.9 | 74.3 |
| Macrolides | 12.7 | 6.3 | 16.3 | 3.3 | 27.1 |
| erythromycine seule | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 |
| erythromycine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 |
| spiramycine seule | 3.1 | 1.6 | 7.2 | 0.4 | 17.7 |
| spiramycine (spiramycine+ métronidazole) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| spiramycine | 3.1 | 1.6 | 7.2 | 0.4 | 17.7 |
| roxithromycine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.9 |
| josamycine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| clarithromycine | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 9.4 |
| azithromycine | 5.1 | 0.0 | 5.9 | 0.0 | 10.8 |
| Lincosamides | 5.0 | 4.2 | 5.9 | 2.4 | 18.9 |
| clindamycine | 5.0 | 4.2 | 5.9 | 2.4 | 18.9 |
| Streptogramines | 1.9 | 0.0 | 5.2 | 0.0 | 28.3 |
| pristinamycine | 1.9 | 0.0 | 5.2 | 0.0 | 28.3 |
| Aminosides | 9.4 | 8.4 | 10.9 | 6.9 | 198.1 |
| amikacine | 8.4 | 7.7 | 10.8 | 5.6 | 198.1 |
| gentamicine | 0.5 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 2.7 |
| tobramycine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| streptomycine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Quinolones | 35.2 | 32.6 | 54.3 | 16.6 | 78.2 |
| Fluoroquinolones | 35.2 | 32.6 | 54.3 | 16.6 | 78.2 |
| Fluoroquinolones orales | 28.8 | 24.9 | 44.6 | 9.1 | 66.0 |
| Fluoroquinolones injectables | 6.5 | 2.1 | 8.4 | 0.0 | 36.0 |
| norfloxacine | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.1 |
| ofloxacine | 6.1 | 4.9 | 11.1 | 0.7 | 66.0 |
| ciprofloxacine | 12.2 | 8.7 | 15.7 | 0.0 | 32.4 |
| levofloxacine | 12.4 | 3.8 | 18.9 | 0.0 | 33.2 |
| moxifloxacine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |

| Molécule | Médiane | P25 | P75 | Minimum | Maximum |
|---|---------|-------|-------|---------|---------|
| lomefloxacine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Phénicoles (thiamphenicol) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Glycopeptides | 37.7 | 26.3 | 76.1 | 12.8 | 121.5 |
| vancomycine | 35.3 | 24.1 | 76.1 | 10.9 | 108.4 |
| teicoplanine | 1.9 | 0.0 | 2.9 | 0.0 | 13.1 |
| dalbavancine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Imidazoles | 12.5 | 7.7 | 21.0 | 4.9 | 37.7 |
| Imidazolés O | 3.0 | 0.0 | 4.6 | 0.0 | 8.1 |
| Imidazolés I | 8.3 | 5.1 | 15.0 | 3.3 | 37.7 |
| metronidazole seul | 12.5 | 5.8 | 20.1 | 4.9 | 37.7 |
| metronidazole (spiramycine+ metronidazole) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| metronidazole | 12.5 | 5.8 | 20.1 | 4.9 | 37.7 |
| ornidazole | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 |
| tinidazole | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| "Autres ATB" (J01X + imidazoles oraux: P01AB) | 75.5 | 52.6 | 137.0 | 40.3 | 185.8 |
| J01X | 75.5 | 45.9 | 137.0 | 36.0 | 182.9 |
| acide fusidique | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 |
| fosfomycine | 0.6 | 0.1 | 3.8 | 0.0 | 4.1 |
| linezolide | 2.4 | 0.4 | 20.0 | 0.0 | 34.0 |
| colistine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9 |
| nitrofurantoïne | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 14.7 |
| daptomycine | 11.3 | 2.8 | 26.8 | 0.0 | 106.5 |
| Antistaphylococciques | 60.1 | 30.4 | 129.2 | 17.8 | 158.2 |
| rifampicine | 3.0 | 0.0 | 5.6 | 0.0 | 26.6 |
| fidaxomicine | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 0.0 | 4.5 |
| Consommation antibactériens à usage systémique (J01) | 756.2 | 697.6 | 911.6 | 603.4 | 1086.3 |
| CONSOMMATION TOTALE | 756.2 | 705.8 | 917.2 | 612.1 | 1096.7 |

*Antistaphylococcique: glycopeptides, daptomycine, linezolide, tedizolide, dalbavancine, ceftaroline, ceftriaxone.

Consommations d'antibiotiques - Services de maladies infectieuses (N=11)
(Réseau de surveillance des consommations 2021)

| Molécule | Médiane | P25 | P75 | Minimum | Maximum |
|--|---------|-------|-------|---------|---------|
| B-lactamines | 484.3 | 359.0 | 609.3 | 46.0 | 677.1 |
| Penicillines | 330.4 | 258.9 | 396.9 | 11.7 | 459.1 |
| Penicillines G | 2.8 | 0.0 | 6.8 | 0.0 | 14.8 |
| benzylpenicilline | 2.7 | 0.0 | 5.4 | 0.0 | 7.9 |
| benzathine benzylpenicilline | 0.2 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 6.8 |
| Penicilline V (phenoxyethylpenicilline) | 1.0 | 0.0 | 2.4 | 0.0 | 5.3 |
| Penicillines M | 36.8 | 5.4 | 69.6 | 0.0 | 121.6 |
| cloxacilline | 31.8 | 5.4 | 69.6 | 0.0 | 121.6 |
| oxacilline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.9 |
| Penicillines A | 162.7 | 80.1 | 208.3 | 0.1 | 259.2 |
| ampicilline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| amoxicilline | 162.7 | 80.1 | 208.3 | 0.1 | 259.2 |
| Penicillines + inhibiteur | 124.2 | 18.2 | 151.0 | 5.8 | 219.0 |
| penicillines A + inh. | 96.9 | 14.3 | 123.2 | 0.0 | 190.9 |
| amoxicilline ac clavulanique | 96.9 | 14.3 | 123.2 | 0.0 | 190.9 |
| Ratio amoxicilline/amoxicilline ac clavulanique | 1.6 | 1.1 | 2.0 | 0.4 | 60.3 |
| ampicilline sulbactam | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ureido-penicilline + inh. (piperacilline tazobactam) | 16.8 | 5.7 | 28.2 | 1.6 | 31.6 |
| carboxypenicillines + inh. (ticarcilline ac clavulanique) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Aminido-penicilline (pivmecillinam) | 0.4 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 1.8 |
| Ureidopenicillines | 1.3 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 5.8 |
| piperacilline | 1.3 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 5.8 |
| Carboxypenicillines | 3.4 | 0.0 | 4.1 | 0.0 | 5.7 |
| ticarcilline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| temocilline | 3.4 | 0.0 | 4.1 | 0.0 | 5.7 |
| Cephalosporines, Penemes, Monobactams | 154.0 | 95.0 | 212.4 | 9.9 | 218.0 |
| Cephalosporines | 114.9 | 55.6 | 167.1 | 7.8 | 179.3 |
| C1G+C2G | 17.1 | 0.6 | 32.2 | 0.0 | 58.8 |
| C1G (dont J01DC04) | 17.1 | 0.0 | 30.5 | 0.0 | 58.5 |
| cefalexine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
| cefazoline | 17.1 | 0.0 | 30.5 | 0.0 | 58.5 |
| cefadroxil | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| cefaclor | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

| Molécule | Médiane | P25 | P75 | Minimum | Maximum |
|---|---------|------|-------|---------|---------|
| C2G (sauf J01DC04 et J01DC07) | 0.4 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 2.4 |
| cefoxitine | 0.4 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 2.4 |
| cefuroxime | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| cefamandole | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| C3G (dont J01DC07 et J01DE) | 100.0 | 32.1 | 138.0 | 7.0 | 153.8 |
| C3G Orales (dont J01DC07) | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 1.1 |
| cefixime | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 1.1 |
| cefpodoxime | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| cefotiam | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| C3G Injectables | 100.0 | 32.1 | 138.0 | 6.1 | 152.6 |
| C3G Inj. inactives sur P. aeruginosa | 62.1 | 21.6 | 95.3 | 0.0 | 147.8 |
| cefotaxime | 19.2 | 3.0 | 72.6 | 0.0 | 88.4 |
| ceftriaxone | 24.6 | 3.7 | 41.3 | 0.0 | 69.6 |
| C3G Inj. actives sur P. aeruginosa | 25.3 | 10.5 | 37.6 | 2.0 | 69.9 |
| ceftazidime | 7.0 | 1.5 | 14.7 | 0.0 | 69.9 |
| cefepime | 12.4 | 1.2 | 21.9 | 0.0 | 26.0 |
| ceftazidimeavibactam | 0.7 | 0.0 | 2.3 | 0.0 | 7.6 |
| ceftolozanetazobactam | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Autres céphalosporines | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 1.2 |
| ceftobiprole | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 |
| ceftaroline | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 1.2 |
| ceftobiprole+ceftaroline | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 3.8 |
| Penèmes | 33.3 | 7.6 | 41.8 | 0.0 | 61.5 |
| ertapenem | 1.4 | 0.6 | 4.7 | 0.0 | 9.3 |
| Penèmes actives sur P. aeruginosa | 31.9 | 7.2 | 37.5 | 0.0 | 52.4 |
| imipenem | 4.4 | 1.2 | 14.8 | 0.0 | 21.4 |
| meropenem | 11.8 | 0.0 | 30.3 | 0.0 | 36.8 |
| Monobactams (aztreonam) | 0.9 | 0.0 | 3.6 | 0.0 | 9.1 |
| Tetracyclines | 10.4 | 3.3 | 21.7 | 0.0 | 40.6 |
| demeccycline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| doxycycline | 8.9 | 3.3 | 21.7 | 0.0 | 39.6 |
| lymecycline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| metacycline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| minocycline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
| tigecycline | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 5.7 |

| Molécule | Médiane | P25 | P75 | Minimum | Maximum |
|---|---------|------|-------|---------|---------|
| Sulfamides | 62.2 | 46.2 | 120.3 | 2.3 | 169.7 |
| cotrimoxazole | 55.6 | 41.6 | 90.7 | 2.3 | 155.8 |
| trimethoprime | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| sulfadiazine | 6.3 | 0.0 | 32.0 | 0.0 | 39.7 |
| sulfamethizole | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| sulfafurazole (erythromycine+sulfafurazole) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| MLS | 57.5 | 27.2 | 73.6 | 3.6 | 96.9 |
| Macrolides | 31.9 | 6.0 | 37.6 | 2.5 | 70.1 |
| erythromycine seule | 0.4 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 7.5 |
| erythromycine | 0.4 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 7.5 |
| spiramycine seule | 3.3 | 1.5 | 5.5 | 0.0 | 22.0 |
| spiramycine (spiramycine+ métronidazole) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
| spiramycine | 3.3 | 2.0 | 5.5 | 0.0 | 22.0 |
| roxithromycine | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 0.0 | 6.6 |
| josamycine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| clarithromycine | 8.7 | 0.0 | 24.9 | 0.0 | 49.6 |
| azithromycine | 5.0 | 1.9 | 13.3 | 0.0 | 19.0 |
| Lincosamides | 20.7 | 5.0 | 39.2 | 1.2 | 54.2 |
| clindamycine | 20.7 | 5.0 | 39.2 | 1.2 | 54.2 |
| Streptogramines | 1.6 | 0.8 | 1.9 | 0.0 | 3.0 |
| pristinamycine | 1.6 | 0.8 | 1.9 | 0.0 | 3.0 |
| Aminosides | 7.7 | 3.5 | 10.2 | 0.0 | 23.4 |
| amikacine | 4.4 | 1.2 | 5.4 | 0.0 | 9.4 |
| gentamicine | 3.4 | 1.2 | 5.3 | 0.0 | 13.4 |
| tobramycine | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 1.8 |
| streptomycine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Quinolones | 82.3 | 65.5 | 97.4 | 6.4 | 143.0 |
| Fluoroquinolones | 82.3 | 65.5 | 97.4 | 6.4 | 143.0 |
| Fluoroquinolones orales | 70.5 | 64.3 | 92.4 | 3.7 | 142.4 |
| Fluoroquinolones injectables | 2.7 | 1.1 | 6.6 | 0.6 | 26.6 |
| norfloxacine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 |
| ofloxacine | 5.3 | 2.3 | 13.1 | 0.0 | 50.7 |
| ciprofloxacine | 11.5 | 1.8 | 27.4 | 0.0 | 92.3 |
| levofloxacine | 57.0 | 23.3 | 65.5 | 0.0 | 73.6 |
| moxifloxacine | 1.0 | 0.0 | 5.5 | 0.0 | 31.5 |

| Molécule | Médiane | P25 | P75 | Minimum | Maximum |
|---|---------|-------|-------|---------|---------|
| lomefloxacine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Phénicoles (thiamphenicol) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Glycopeptides | 10.4 | 2.8 | 13.4 | 0.0 | 24.4 |
| vancomycine | 9.1 | 2.8 | 13.3 | 0.0 | 24.4 |
| teicoplanine | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 3.4 |
| dalbavancine | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.3 |
| Imidazoles | 15.2 | 1.3 | 19.4 | 0.0 | 30.4 |
| Imidazolés O | 4.7 | 0.0 | 7.8 | 0.0 | 15.6 |
| Imidazolés I | 8.6 | 1.3 | 14.7 | 0.0 | 20.7 |
| metronidazole seul | 14.6 | 1.3 | 19.4 | 0.0 | 30.4 |
| metronidazole (spiramycine+ metronidazole) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| metronidazole | 14.6 | 1.3 | 19.4 | 0.0 | 30.4 |
| ornidazole | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 |
| tinidazole | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| "Autres ATB" (J01X + imidazoles oraux: P01AB) | 57.4 | 20.5 | 76.6 | 1.3 | 171.9 |
| J01X | 47.9 | 20.5 | 72.1 | 1.3 | 166.0 |
| acide fusidique | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.4 |
| fosfomycine | 1.3 | 0.5 | 2.2 | 0.0 | 6.0 |
| linezolide | 2.9 | 0.1 | 4.6 | 0.0 | 11.4 |
| colistine | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 5.1 |
| nitrofurantoïne | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 2.2 |
| daptomycine | 12.9 | 7.2 | 31.3 | 0.0 | 132.5 |
| Antistaphylococciques | 38.3 | 20.5 | 53.3 | 0.0 | 144.9 |
| rifampicine | 32.9 | 9.7 | 68.5 | 0.0 | 130.2 |
| fidaxomicine | 0.0 | 0.0 | 4.1 | 0.0 | 9.2 |
| Consommation antibactériens à usage systémique (J01) | 805.2 | 729.0 | 870.7 | 69.7 | 1115.4 |
| CONSOMMATION TOTALE | 902.8 | 729.0 | 953.0 | 69.7 | 1170.6 |

*Antistaphylococcique: glycopeptides, daptomycine, linezolide, tedizolide, dalbavancine, ceftaroline, ceftriaxone.